



تأثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران

اسماء شعبانی^{۱*} - غلامحسین حق نیا^۲ - علیرضا کریمی^۳ - ملک مسعود احمدی^۴

تاریخ دریافت: ۹۰/۵/۱۵

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۲/۷

چکیده

ویژگی‌های پستی و بلندی اراضی بهدلیل تاثیر بر توزیع آب در بخش‌های گوناگون زمین‌نما و همچنین اثر بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، از عوامل مهم موثر بر رشد و عملکرد محصول در کشاورزی دیم هستند. با وجود این که استان خراسان شمالی، یکی از مناطق مهم دیم‌کاری گندم می‌باشد، اطلاعاتی درباره ارتباط ویژگی‌های خاک و پستی و بلندی با رشد گندم دیم در این استان وجود ندارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب استان خراسان شمالی انجام شد. داده‌های عملکرد گندم و نمونه‌های خاک سطحی از ۱۰۰ پلات 1×1 متر در منطقه‌ای به وسعت ۸۰۰ هکتار به گونه‌ای جمع‌آوری شد که گوناگونی موقعیت‌های شیب را دربرگیرد. سنگریزه، رس، کربنات کلسیم معادل، ماده آلی، pH، EC، نیتروژن کل، پتاسیم و فسفر قابل دسترس اندازه‌گیری شدند. مشتقات اولیه و شانوی پستی و بلندی دربرگیرنده ارتفاع، شیب، جهت شیب، انحنای سطح، شاخص خیسی، انتقال رسوب و قدرت جریان با استفاده از مدل رقومی ارتفاع به ابعاد 30×30 متر محاسبه شدند. بین ویژگی‌های خاک و پستی و بلندی با مولفه‌های عملکرد، مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برقرار و سپس به وسیله نقاط کمکی (۲۰ نقطه از ۱۰۰ نقطه) پیش‌بینی مدل‌های بدست آمده انتشارسنجی شد. ضرایب ماتریس همبستگی نشان دادند که ارتفاع و درصد کربنات کلسیم معادل، بیشترین میزان همبستگی را با مولفه‌های عملکرد گندم دارند. در میان فاکتورهای بررسی شده خاک در این مطالعه، درصد آهک و ماده آلی و از میان شاخص‌های پستی و بلندی، ارتفاع، شیب و شاخص خیسی وارد مدل‌ها گردیدند. بهدلیل وجود رابطه‌های غیرخطی و پیچیده، مدل‌های رگرسیونی، فقط درصد از تغییرات عملکرد کل و 40% درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. نتایج این پژوهش نشان داد آگرچه سیساب در مز اقلیمی خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، ویژگی‌های توپوگرافی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم دیم موثر هستند.

واژه‌های کلیدی: برآورد عملکرد، مشتقات مدل رقومی ارتفاع، گندم دیم

محدودیت‌های موجود بر سر راه تولید در دیمزارها و افزایش عملکرد

مقدمه

این محصول مهم و استراتژیک صورت گیرد. در مقیاس محلی که تغییرات اقلیم اندک است، ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک، عوامل تعیین‌کننده موقوفیت دیم‌کاری هستند. پستی و بلندی به صورت مستقیم، از طریق تاثیر بر فراهمی آب در بخش‌های گوناگون زمین‌نما و به صورت غیرمستقیم، از طریق اثر بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک مانند مقدار ماده آلی، درصد اشباع بازی، دمای خاک و توزیع اندازه ذرات، بر رشد و عملکرد محصول موثر است (۲۴). یانگ و همکاران (۴۶) در مطالعات خود دریافتند که بیش از 60% درصد تغییرات عملکرد، متأثر از ترکیبی از ویژگی‌های خاک و مشخصه‌های پستی و بلندی است. جیانگ و تلن (۲۴) در مطالعه عملکرد ذرت و سویا در میشیگان، شیب و مقدار شن خیلی ریز را دو عامل عمدۀ محدود کننده عملکرد شناختند. آن‌ها گزارش کردند که خاک و پستی و بلندی، 28 تا 85 درصد تغییرات

در مناطق نیمه‌خشک مانند بخش‌هایی از ایران، گیاهانی که بتوانند بدون آبیاری کشت شوند نسبتاً محدود بوده و هیچ کدام از این گیاهان نتوانسته‌اند بر گندم برتری پیدا کنند و این محصول از نظر مقدار تولید و سطح زیر کشت، مهم‌ترین محصول کشاورزی در ایران نیز می‌باشد (۴). بخش گسترده‌ای از زمین‌های زیر کشت گندم در کشور ما، به کشت دیم اختصاص دارد که متاسفانه به علت عدم رعایت اصول دیم‌کاری، کمبود و پراکنش نامناسب بارندگی، عملکرد کمی دارند. بنابراین، لازم است تلاش همه‌جانبه‌ای در جهت شناسایی

۱- به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد و استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
۲- نویسنده مسئول: Email: shabani_362@yahoo.com
۳- مریب پژوهشی، مرکز تحقیقات دیم شیروان


می‌توانند ۲۱ تا ۵۳ درصد از تغییرات عملکرد در منطقه را توجیه کنند. گندم یکی از محصولات مهم استان خراسان شمالی است. در این استان ۴۴ درصد اراضی آبی و ۶۵ درصد اراضی دیم، به کشت گندم اختصاص دارد که در مجموع نزدیک ۳۳ درصد از کل تولید محصولات زراعی استان را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده میزان اهمیت تولید گندم در اقتصاد کشاورزی و نیز تنابع زراعی استان می‌باشد^(۱). با وجود اهمیت گندم در این استان، تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی در راستای شناسایی عوامل موثر بر میزان عملکرد گندم دیم و پیش‌بینی آن در این استان صورت نگرفته است. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم و مدل‌سازی عملکرد با استفاده از روش‌های رگرسیونی در منطقه سیسab استان خراسان شمالی انجام شد.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه با مساحت حدود ۸۰۰ هکتار، بخشی از زمین‌های زیر کشت گندم دیم در منطقه سیسab استان خراسان شمالی می‌باشد که در محدوده $36^{\circ} ۳۶' - ۴۰^{\circ} ۵۷'$ طول شرقی و $۲۳^{\circ} ۲۳' - ۲۷^{\circ} ۳۷'$ عرض شمالی واقع شده است (شکل ۱). میانگین ارتفاع از سطح دریا حدود ۱۲۸۰ متر، میانگین دمای سالانه منطقه 12.2°C و میانگین بارندگی سالیانه حدود ۲۵۰ میلیمتر است. بر اساس نقشه زمین‌شناسی^(۲) و بازدید صحراوی، مواد مادری خاک‌های منطقه، از نوع سنگ‌های آهکی کرتاسه می‌باشند.

مشاهده شده عملکرد را توجیه می‌کنند.

مدل‌سازی، یکی از راههای درک بهتر روابط موجود بین ویژگی‌های خاک، اقلیم و پستی و بلندی با کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی است و به کمک آن می‌توان مدیریت گیاه و خاک و ریسک عملیات مدیریتی را ارزیابی کرد. برای ساخت یک مدل، روش‌های گوناگونی وجود دارد که پژوهشگر براساس نوع مساله و ویژگی‌های موضوع مورد مطالعه، به انتخاب یکی از آن‌ها می‌پردازد؛ یکی از رایج‌ترین و در عین حال ساده‌ترین آن‌ها، مدل‌های تجربی رگرسیونی است. کاکس و همکاران^(۳) در مطالعه‌ای با انجام شیوه تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، سه مؤلفه PC_1 , PC_2 و PC_3 را معنی دار تشخیص دادند که هر کدام از این مؤلفه‌ها از ترکیب متغیرهای خاک و پستی و بلندی دربرگیرنده کلسیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر، pH، مقدار رس، ارتفاع و شب زمین به دست آمده بودند. آن‌ها بین این ویژگی‌ها و عملکرد سویا با انجام رگرسیون چند متغیره، معادله‌ای با $R^2=0.54$ بدست آورندند. اقبال و همکاران^(۴) در مطالعه‌ای به کمک رگرسیون خطی گام به گام نشان دادند که ویژگی‌های خاک ۵۸ درصد، ویژگی‌های پستی و بلندی-هیدرولوژی ۲۱ درصد و همچنین اثر ترکیبی آن‌ها (خاک-پستی و بلندی-هیدرولوژی) ۷۲ درصد از تغییر پذیری عملکرد پنبه را می‌توانند توصیف نمایند. در مطالعه گفته شده، ارتفاع، جهت جریان، شاخص انتقال رسوب و درصد شن، بیانگر بیشتر تغییرات عملکرد بودند. نوروزی^(۵) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه رگرسیونی میان پارامترهای خاک و پستی و بلندی زمین با مؤلفه‌های عملکرد گندم دیم در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری پرداخت. نتایج وی نشان داد که معادله‌های رگرسیون به دست آمده،



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی منطقه و پرائکنیش نقاط مورد مطالعه

موفقیت آمیزی برای پیش‌بینی بخش‌های اشباع شده سطحی خاک و نیز بخش‌هایی که دچار کمبود آب هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد (۲۱ و ۲۷). این شاخص که نسبت سطح ویژه حوزه^۵ به گرادیان شبی است، به عنوان شاخصی از توزیع مکانی رطوبت خاک در طول زمین نما می‌باشد. شاخص SPI، نمایشی از قدرت فرسایندگی جریان‌های سطحی است و به گونه‌ای تنگاتنگ با TWI ارتباط دارد. شاخص‌های TWI و SPI، به ترتیب با معادله‌های ۱ و ۲ محاسبه می‌شوند که در این معادله‌ها^۶ سطح ویژه حوزه بر حسب (m²/m) و β درجه شبی می‌باشند.

$$TWI = \left(\frac{A_s}{\tan \beta} \right) \quad (1)$$

$$SPI = A_s \tan \beta \quad (2)$$

شاخص STI که معادل فاکتور طول شبی در معادله جهانی فرسایش خاک می‌باشد و نشان‌دهنده فرآیندهای فرسایشی خاک است، به طور عمده، تأثیر شبی بر فرسایش را نشان می‌دهد و از معادله ۳ محاسبه می‌شود. در این معادله،^۷ A_s و β ، همان پارامترهای قبلی و $m=0.6$ و $n=13$ پارامترهای ثابت هستند (۴۴).

$$STI = \left(\frac{A_s}{22.13} \right)^m \left(\frac{A_s}{0.0896} \right)^n \quad (3)$$

مدل آماری و اعتبارسنجی

بعد از محاسبه شاخص‌های خاک و پستی و بلندی در نقاط مورد مطالعه، بین این پارامترها و مؤلفه‌های عملکرد گندم دیم، ماتریس همبستگی پیرسون برقرار شد. سپس، به منظور تعیین ارتباط خطی صفات مورد مطالعه با مؤلفه‌های عملکرد، آنالیز رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام، با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. ویژگی‌های خاک و پستی و بلندی به عنوان متغیرهای مستقل و مؤلفه‌های عملکرد گندم، به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. قبل از انجام مدل سازی رگرسیونی، آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها به روش کولموگراف-اسمیرنوف انجام و پارامترهایی که دارای توزیع نرمال نبودند نرمال شده و سپس با مقادیر نرمال شده آن‌ها، مدل سازی انجام گردید. ۸۰ درصد داده‌ها به منظور مدل سازی و ۲۰ درصد، برای اعتبارسنجی گزینش شدند. در انجام فرآیند اعتبارسنجی مدل‌ها، از معیارهای میانگین خطای^۸ (ME) و ریشه میانگین مربع‌های خطای^۹ (RMSE) استفاده شد. این معیارها، دقت مدل را بر اساس تفاضل بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده ارزیابی می‌کنند. هر چه مقدار ME به صفر نزدیک‌تر و مقدار

مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی

برای انجام این پژوهش، نمونه برداری در تیرماه ۱۳۸۹ در ۱۰۰ نقطه به طریق تصادفی در پلات‌هایی به اندازه ۱×۱ متر به گونه‌ای انجام گردید که توزیع پستی و بلندی‌های مختلف را پوشش دهد. برای اندازه‌گیری مؤلفه‌های عملکرد گندم دیم (رقم آذر)، بوته‌های واقع در هر پلات برداشت شد. از هر پلات، یک نمونه ترکیبی خاک برای تجزیه‌های آزمایشگاهی تهیه گردید. عملکرد کل، با توزیع همه آنچه از سطح پلات برداشت شده بود به دست آمد و عملکرد دانه پس از کوپیدن و جدا کردن کاه و کلش به کمک دستگاه بوجاری در مرکز تحقیقات دیم شیروان اندازه‌گیری شد.

به منظور تجزیه نمونه‌های خاک، ابتدا درصد سنگریزه در هر نمونه تعیین و pH و سپس pH و هدایت الکتریکی نمونه‌ها در نسبت ۲ به ۱ آب به خاک اندازه‌گیری شد. کربن آلی به روش تیتراسیون با آمونیوم فرو سولفات نیم نرمال، نیتروژن کل به روش کجلال، پتانسیم قابل دسترس از روش عصاره گیری با استات آمونیوم و قرائت با دستگاه فلیم فوتومتر، فسفر فراهم خاک به روش اولسن، آهک به روش تیتراسیون اسید اضافی با سود و بافت نمونه‌های خاک به روش هیدرومتری تعیین گردید (۴۰).

محاسبه شاخص‌های پستی و بلندی

برای محاسبه شاخص‌های پستی و بلندی، از مدل رقومی ارتفاع^۱ منطقه با دقت ۳۰ متر استفاده شد. مشتقات اولیه شامل ارتفاع، درجه شبی، جهت شبی و انحنای سطح زمین، با استفاده از نرم افزارهای ILWIS و ArcGIS ذکر است که با استفاده ازتابع مثبتانی Sin به عنوان یک نگاشت، زوایای جهت شبی در بازه -۱ تا +۱ ارزش‌گذاری و به طور قراردادی +1 جهت شمال و -1 جهت جنوب در نظر گرفته شد و از آن پس نتایج بر این مبنای تفسیر گردید. مشتقات ثانویه شامل شاخص خیسی^۲ (TWI)، شاخص قدرت جریان^۳ (SPI) و شاخص انتقال رسوب^۴ (STI) از ترکیب شاخص‌های اولیه محاسبه شدند.

روطوبت یک ویژگی بسیار پویا و دینامیک خاک است که در طول فصل رشد و بعد از هر بارندگی، تغییرات زیادی دارد و اندازه‌گیری آن مشکل و وقت‌گیر است. به همین دلیل، تأثیر رطوبت خاک به صورت غیرمستقیم توسط شاخص TWI لاحظ شد که توزیع مکانی رطوبت خاک در سطح زمین نما را نشان می‌دهد. این شاخص، به صورت

1- Digital Elevation Model

2- Topographic Wetness Index

3- Stream Power Index

4- Sediment Transport Index

5- Specific Catchment Area

6- Mean Error

7- Root Mean Square Error

نگهداری آب و حاصلخیزی خاک همراه است. انحنای سطحی نیز با درصد رس ($r = -0.27^{**}$), ماده آلی ($r = -0.30^{**}$), EC ($r = -0.32^{**}$), پتاسیم ($r = -0.24^{**}$) و شاخص خیسی ($r = -0.45^{**}$) همبستگی منفی معنی دار دارد که بیانگر تجمع رس، ماده آلی و املال محول در مکان های پست است. همچنین، بین جهت شبیب با ماده آلی همبستگی مثبت معنی دار ($r = 0.21^{*}$) یافت شد، که بیانگر مقادیر بیشتر ماده آلی در شبیب های شمالی است. کراوچنکو و بالوک (۲۵) گزارش کردند که در بیش از نیمی از منطقه مورد مطالعه آنها، شبیب با CEC، ماده آلی، P، K، همبستگی منفی داشته است. سیبرت و همکاران (۳۳) اثر پستی و بلندی بر ویژگی های خاک را در خاک های جنگلی سوئد بررسی کردند و چند همبستگی معنی دار بین شاخص های پستی و بلندی و ویژگی های خاک یافتند. به عنوان نمونه، ضخامت لایه ماده آلی با شاخص خیسی (TWI) و ضخامت افق آلبیک (E) با مساحت بالادست شبیب، افزایش یافته است.

مولفه های عملکرد کل و دانه درمنطقه مورد مطالعه، به ترتیب در محدوده $2/33$ تا $10/55$ و $0/43$ تا $10/17$ (تن در هکتار) متغیر بوده و در گروه متغیرهای متوسط، دسته بندی می شوند. عملکردهای زیاد، به تعداد نقاط کمی با تغیر بالا به دست آمده است که فراهمی مطلوب رطوبت و املال محول در این مکان ها می تواند دلیل اصلی زیاد بودن عملکرد در این نقاط باشد و نماینده ای از عملکرد کل منطقه نیستند. عملکرد دانه گندم، دارای ضریب تغییرات بیشتری نسبت به عملکرد کل می باشد و مقادیر ضریب تغییرات، برای عملکرد دانه و کل به ترتیب برابر 35 و 29 درصد است (جدول ۳).

از دلایل تغییرپذیری عملکرد در این منطقه، می تواند تاثیر زیاد پستی و بلندی بر جایگایی و انتقال آب در موقعیت های مختلف زمین نما باشد که به دنبال این فرآیند، ویژگی های خاک در موقعیت های مختلف زمین نما متفاوت می شود.

RMSE کوچکتر باشد، نمایانگر دقت بالاتر تخمین خواهد بود. بیان ریاضی این آماره ها بصورت زیر می باشد (۱۷):

$$ME = \sum_{i=1}^n (Z^* - Z) / n \quad (4)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Z^* - Z)^2} \quad (5)$$

Z^* و Z به ترتیب مقدار برآورد شده و مقدار واقعی مؤلفه های عملکرد گندم و n تعداد نقاط مطالعاتی است.

نتایج و بحث

توصیف آماری پارامترهای پستی و بلندی، خاک و مؤلفه های عملکرد گندم دیم به ترتیب در جدول های ۱، ۲ و ۳ خلاصه شده است. ضریب تغییرات برای توصیف مقدار تغییرات هر یک از پارامترهای خاک و عملکرد مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس سیستم پیشنهادی وبلینگ (۴۳)، ضریب تغییرات بیش از 5 تا 15 و کمتر از 15 درصد، به ترتیب در سه کلاس زیاد، متوسط و کم، طبقه بندی می شوند. در بین متغیرهای اندازه گیری شده خاک، ضریب تغییرات درصد سنگریزه از همه بالاتر و برابر 57 درصد است. در میان ویژگی های خاک مورد بررسی در این مطالعه ضریب تغییرات درصد سنگریزه، فسفر و پتاسیم فراهم در کلاس زیاد، pH در کلاس کم و بقیه ویژگی ها در کلاس متوسط گروه بندی می شوند.

تغییرات ویژگی های خاک در یک منطقه با اقلیم ثابت را ناشی از غیر یکنواختی پستی و بلندی می دانند (۱۶). در منطقه مورد مطالعه تغییرپذیری ویژگی های خاک تا حد زیادی متأثر از تغییرات پستی و بلندی است. از این جمله می توان به همبستگی منفی شبیب با درصد رس ($r = -0.20^{*}$ ، فسفر $r = -0.24^{*}$ ، ماده آلی ($r = -0.21^{*}$) و شاخص خیسی ($r = -0.21^{*}$) اشاره کرد. این همبستگی ها نشان از فراسایش بیشتر در موقعیت های تند شبیب دارد که با کاهش ظرفیت

جدول ۱- توصیف آماری پارامترهای پستی و بلندی

حداقل	حداکثر	میانگین	
۱۲۸۹	۱۴۲۹/۰۰	۱۱۱۴/۰۰	ارتفاع (m)
۲/۳۶	۶/۲۵	۰/۰۲	راستای شبیب (rad)
-۰/۰۵	۰/۶۷	-۱/۳۳	میانگین انحنا (1/m)
۱۰/۲	۲۶/۴	۲/۵	شبیب (%)
۱۹۴۰	۲۷۷۳	۱۸	SPI
۸۴	۴۹۳	۱/۳	STI
۱۰/۳	۱۷	۶/۵	TWI

SPI: شاخص قدرت جریان ، STI: شاخص انتقال رسوب و TWI: شاخص رطوبتی.

جدول ۲- توصیف آماری پارامترهای خاک

حداقل	حداکثر	میانگین	درصد ضریب تغییرات	
۵۷	۱۸/۴۰	۲۹	۹	سنگریزه (%)
۲۰	۱۳	۲۱	۸	رس (%)
۲۲	۲۸	۴۹	۱۳	کربنات کلسیم معادل (%)
۲۲	۱/۲۷	۲/۷۰	۰/۶۷	ماده آلی (%)
۲۲	۰/۰۶	۰/۱۲	۰/۰۳	نیتروژن کل (%)
۲۴	۶/۹	۲۲/۷	۲/۶	فسفر فراهم (mg kg^{-1})
۳۸	۲۰۳	۷۱۲	۱۰۸	پتاسیم فراهم (mg kg^{-1})
۲۴	۰/۲۵	۰/۶	۰/۲	هدایت الکتریکی (dSm^{-1})
۲	۷/۸	۸/۱	۷/۵	pH

جدول ۳- توصیف آماری مولفه های عملکرد گندم دیم

حداقل	حداکثر	میانگین	ضریب تغییرات	
۲۹	۵/۹۸	۱۰/۵۵	۲/۳۲	عملکرد کل (tha^{-1})
۳۵	۱/۸۲	۳/۱۷	۰/۴۳	عملکرد دانه (tha^{-1})

شدن توده خاک با افزایش مقدار سنگریزه و به دنبال آن کاهش ظرفیت نگهداشت آب و مواد غذایی خاک، نسبت دادند. ماسونی و همکاران (۲۸) و بامری (۳) نیز نتایج مشابهی را ارائه کردند. دیگر ویژگی خاک که با مولفه های عملکرد منطقه همبستگی منفی دارد pH است. مهم ترین اثر pH خاک بر روی رشد گیاهان، تاثیر آن بر فراهمی عناصر غذایی می باشد و عموماً با افزایش pH حلالیت عناصر غذایی بجز مولیبدن کاهش می یابد. افزون بر این، تاثیر بر فعالیت موجودات ذره بینی خاک نیز از اثرات مهم pH می باشد (۸). منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، دارای pH قلیایی (بیش از ۷) می باشد که احتمالاً ناشی از مقادیر نسبتاً بالای کربنات کلسیم در این منطقه است (جدول ۳). ایوبی و همکاران (۱۱) در بررسی تاثیر ویژگی های خاک بر عملکرد گندم در شمال ایران بین pH و عملکرد جو گزارش کردند.

نیتروژن، مهم ترین عنصر غذایی است که بر عملکرد دانه گندم و مقدار پروتئین آن مؤثر است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کاربرد کودهای نیتروژن و افزایش نیتروژن موجود در خاک در مناطق خشک و نیمه خشک، به منظور تولید گندم دیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است (۲۰ و ۳۴). موداش و همکاران (۲۹) نیز با به کار بردن کود نیتروژنه، افزایش معنی داری در عملکرد دانه گندم مشاهده نمودند. شاید، دلیل عدم تطابق نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج سایرین، بالا بودن نسبی مقدار ماده آلی خاک در منطقه مورد مطالعه (جدول ۲) و وابستگی نسبی نیتروژن کل خاک در این منطقه به میزان مواد آلی موجود در آن باشد ($=0/۶۴^{**}$). به عبارتی، نیتروژن کل اندازه گیری شده بیشتر به شکل آلی است و شاخص خوبی از

همچنین، مقدار تغییرپذیری مولفه های عملکرد ممکن است به وسیله عملیات مدیریتی تحت تاثیر قرار گیرد. ولن و مک برتنی (۴۲) مشاهده نمودند که ضریب تغییرات عملکرد گندم تحت تاثیر مدیریت، از ۱۳ تا ۸۳ درصد تغییر نموده است. نوروزی (۱۰) ضریب تغییرات مولفه های عملکرد گندم را در رابطه با عملکرد کل (۲۹ درصد)، عملکرد دانه (۳۶ درصد)، وزن هزار دانه (۱۳ درصد) و پروتئین دانه گندم (۱۸ درصد) گزارش کرد.

ضرایب همبستگی بین مولفه های عملکرد گندم برداشت شده با ویژگی های خاک در جدول ۴ ارائه شده است. در میان ویژگی های خاک، درصد کربنات کلسیم معادل (آهک) و سنگریزه، به ترتیب، بالاترین میزان همبستگی منفی را با مولفه های عملکرد نشان دادند. اگرچه آهک از طریق تاثیر بر خاکدانه سازی و بهبود ساختمن خاک، می تواند بر نگهداری رطوبت در خاک، موثر باشد (۷)، لیکن افزایش کربنات ها در خاک، در روند جذب عناصر غذایی به ویژه عناصر کم مصرف، ایجاد اختلال می کند؛ زیرا این عناصر در مجاورت آهک، به صورت ترکیبات نامحلول در می آیند (۸). بنابراین، می توان همبستگی منفی آهک با مولفه های عملکرد را به بالا بودن نسبی مقدار آهک در منطقه مورد مطالعه و اثرات منفی آن در فراهمی عناصر غذایی نسبت داد.

همستگی منفی درصد سنگریزه با عملکرد، به دلیل اثرات منفی آن بر ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی در خاک می باشد (۲)؛ زیرا سنگریزه، حجمی از خاک را اشغال می کند بدون آن که در نگهداری آب و مواد غذایی، شرکت کند. گریوال و همکاران (۲۲) اثر منفی میزان سنگریزه خاک بر عملکرد گیاهان دیم در هندوستان را به رقيق

عملکرد را توجیه کند. از سوی دیگر، این همیستگی‌های کم و غیرمعنی‌دار می‌تواند خاک از وجود روابط غیرخطی و پیچیده بین این پارامترها و مولفه‌های عملکرد باشد که ضریب همیستگی خطی قادر به تبیین آن نیست. پیرس و همکاران (۳۱) و کراوچنکو و بالوک (۲۵) نیز در مطالعات خود همیستگی اندکی بین پارامترهای حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول گزارش کرده‌اند. کراوچنکو و بالوک (۲۵) همیستگی اندک بین عملکرد و مقدار فسفر و پتاسیم را به مقادیر نسبتاً بالای این دو عنصر نسبت داده و این‌گونه بیان کردند که احتمالاً اثر این دو ماده، عامل محدودکننده رشد گیاه نبوده و به همین دلیل در تغییرات عملکرد نقش اندکی داشته‌اند. پیرس و همکاران (۳۱) در مطالعه‌ای که بر روی تغییرپذیری عملکرد ذرت و عناصر غذایی در سه نوع خاک در میشیگان انجام دادند، دریافتند که عملکرد ذرت، بسیار متغیر است ولی همیستگی کمی بین عملکرد و حاصلخیزی خاک دیده می‌شود که دلیل آن را تاثیر عوامل دیگر بر عملکرد دانستند.

ضرایب همیستگی خطی بین مؤلفه‌های عملکرد گندم برداشت شده با شاخص‌های پستی و بلندی، در جدول ۵ ارائه شده است. در میان شاخص‌های پستی و بلندی، ارتفاع، بیشترین میزان همیستگی را با مؤلفه‌های عملکرد منطقه دارد. اختلاف در ارتفاع سبب تفاوت در هیدرولوژی و رژیم حرارتی در مناطق کوهستانی شده که منجر به ایجاد تغییر در تشکیل خاک و میزان تجزیه ماده آلی می‌شود (۶). کراوچنکو و بالوک (۲۵) دریافتند که ارتفاع، مهم‌ترین عامل پستی و بلندی در مطالعه آن‌هاست که یک رابطه منفی نسبتاً پایدار با عملکرد محصول دارد و در اکثر موارد، اثر ارتفاع بر عملکرد از طریق فراهمی آب نمود می‌یابد. جیانگ و تلن (۲۶) در مطالعه عملکرد ذرت و سویا در میشیگان در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، بیان کردند که مناطق با ارتفاع کمتر، خاک حاصلخیزتر و در نتیجه عملکرد بیشتری دارند. کراوچنکو و بالوک (۲۵)، وندروس و همکاران (۴۱)، کومهالووا (۲۶) و سوزا و همکاران (۳۷) نیز بین ارتفاع و عملکرد محصول همیستگی منفی مشاهده نمودند.

وضعیت نیتروژن قابل استفاده برای گیاه نمی‌باشد.

همیستگی مثبت ماده آلی با مولفه‌های عملکرد منطقه از یک سو بهدلیل نقش مثبت ماده آلی در بهبود ویژگی‌های فیزیکی خاک و از سوی دیگر، اثر آن به عنوان منع غذایی می‌باشد. از جمله برتری حضور ماده آلی در خاک، تجمع بهتر ذرات و ثبات و پایداری خاکدانه، چرخه طولانی تر مواد غذایی، افزایش فعالیت میکروبی، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی، کاهش جرم مخصوص ظاهری و کاهش پتانسیل فرسایش خاک می‌باشد (۵). اورندلیک و همکاران (۱۹) اثر ماده آلی بر ویژگی‌های فیزیکی خاک را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که ماده آلی، اثری مثبت بر تخلخل خاک و ظرفیت آب قابل استفاده گیاه دارد.

در صد رس، دیگر شاخص خاک است که دارای همیستگی مثبت معنی دار با مولفه‌های عملکرد منطقه می‌باشد. مقدار رس، به شدت بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک اثرگذار است. در کشاورزی مناطق خشک، رس می‌تواند تغییرات عملکرد را با افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک، افزایش CEC و کاهش آبشویی مواد غذایی بهبود بخشد (۳۲). کاس و همکاران (۱۵) دریافتند آب بیشتری در طول دوره‌های خشک سال برای رشد گیاه نگه دارند.

از میان ویژگی‌های خاک، دو پارامتر فسفر و پتاسیم فراهم، کمترین همیستگی را با مؤلفه‌های عملکرد گندم نشان دادند (جدول ۴). در منابع مختلف، حد بحرانی پتاسیم در خاک، ۱۵۰-۲۰۰ و فسفر ۱۰-۱۵ میلی گرم بر کیلوگرم گزارش شده است (۸). در درصد از نمونه‌های مورد مطالعه در این پژوهش، مقدار فسفر نیز باید گفت که برخلاف پتاسیم، میزان فسفر ۹۰ درصد از نمونه‌ها کمتر از حد بحرانی است. بنابراین، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که یکنواختی نسبتاً زیاد نمونه‌ها از نظر مقدار پتاسیم و فسفر، دلیلی برای همیستگی‌های غیرمعنی‌دار این عناصر با مؤلفه‌های عملکرد است. به عبارت دیگر، دامنه تغییرات اندک این عناصر نمی‌تواند به طور معنی‌دار، تغییرات

جدول ۴- ضرایب همیستگی بین مؤلفه‌های عملکرد گندم دیم و ویژگی‌های خاک

pH	نیتروژن کل	فسفر	پتاسیم	هدایت الکتریکی	سنگریزه رس	کربنات کلسیم	ماده آلی	عملکرد کل	عملکرد دانه
-۰/۲۴*	۰/۱۲	۰/۱۷	۰/۰۹	-۰/۲۰*	۰/۲۷*	-۰/۴۵**	۰/۲۸*	-۰/۳۶**	-۰/۳۶**
-۰/۲۶*	۰/۱۹	۰/۱۴	۰/۱۰	-۰/۲۱*	۰/۲۰*	-۰/۴۲**	۰/۲۴*	-۰/۳۵**	-۰/۳۵**

**: معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد و *: معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد

جدول ۵- ضرایب همیستگی بین مؤلفه‌های عملکرد گندم دیم و شاخص‌های پستی و بلندی

ارتفاع	جهت شیب	میانگین انحصار	TWI	STI	SPI	شیب
۰/۳۳***	-۰/۰۸	-۰/۱۵	-۰/۲۳*	-۰/۰۸	-۰/۰۶	-۰/۰۲۶*
۰/۳۶***	-۰/۰۶	-۰/۱۸	-۰/۰۱۹	-۰/۰۱۸	-۰/۰۱۹	-۰/۰۲۴*

**: معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد و *: معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد

کرده و آن را برای مدت زمان طولانی‌تری نسبت به خاک‌های بالای شیب نگاه می‌دارند. دلیل این امر وجود رس بیشتر در خاک‌های پایین شیب است که توسط فرسایش تامین شده است (۱۵). بسیاری از مطالعات گذشته، رابطه منفی بین شیب و عملکرد محصول را گزارش کرده‌اند (۱۳، ۲۵ و ۴۶).

معادله‌های آنالیز رگرسیون و نتایج اعتبارسنجی مدل‌های بدست آمده برای مؤلفه‌های عملکرد گندم و ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی خاک و پستی و بلندی در جدول ۶ ارائه شده است. همچنین، مقادیر مؤلفه‌های عملکرد گندم دیم برای ۲۰ درصد از داده‌ها که به صورت تصادفی قبل از انجام تجزیه و تحلیل‌ها کنار گذاشته شده بودند، به وسیله مدل‌های رگرسیونی، پیش‌بینی شده و در مقابل مقادیر مشاهده‌ای ترسیم و بهترین خط عبوری از میان داده‌ها برآش گردید (شکل ۲).

همان‌گونه که در جدول ۶ مشاهده می‌شود از میان فاکتورهای بررسی شده مربوط به خاک، درصد آهک و ماده آلی و از میان شاخص‌های پستی و بلندی، ارتفاع، شیب و شاخص خیسی وارد مدل‌ها گردیدند. بر این اساس، می‌توان گفت تغییرپذیری مؤلفه‌های عملکرد در این منطقه بیشتر در کنترل این پارامترها می‌باشد. معادله‌های رگرسیون بدست آمده در این پژوهش، ۴۳ درصد از تغییرات عملکرد کل و ۴۰ درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه می‌کنند (شکل ۲). پارک و همکاران (۳۰) در مطالعه‌ای در جنوب اوگاندا به ارزیابی پتانسیل پیش‌بینی عملکرد ذرت در شرایط مختلف خاک و مدیریت زمین پرداختند. بر اساس یافته‌های آن‌ها، مدل‌های خطی، ضعیف‌ترین نتایج را در مرحله صحت مدل‌سازی و پیش‌بینی نشان دادند که ممکن است بیانگر عدم توانایی مدل‌کردن روابط غیرخطی در برهمکنش‌های پیچیده خاک، گیاه و مدیریت باشد. به‌طور کلی، می‌توان گفت عملکرد، یک پدیده غیرخطی و پیچیده است زیرا، به عوامل مختلفی وابسته است و از سویی، این عوامل بر یکی‌گر نیز تاثیر می‌گذارند. همبستگی و رگرسیون‌های چند متغیره، به طور عمومی برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در اغلب موارد نتایج ضعیفی دارند (۱۸ و ۲۵).

انحنا، دیگر ویژگی پستی و بلندی است که همبستگی منفی معنی‌داری با مؤلفه‌های عملکرد نشان داد. در مناطقی که زراعت دیم رایج است، رطوبت خاک یکی از مهم‌ترین فاکتورهای محدود کننده تولید محصول است و فرآیندهایی که توزیع رطوبت خاک را کنترل می‌کنند، تولید محصول را نیز تحت کنترل خود دارند. انحنای سطح زمین، تمرکز یا پخشیدگی جریان آب سطحی را تعیین می‌کند، به‌گونه‌ای که در سطوح معمولی، جریان آب، متراکم شده و نفوذ افزایش می‌یابد در حالی که در وضعیت‌های محدب، جریان آب پخشیده شده و نفوذ کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، انحنای سطح زمین به‌طور غیرمستقیم ذخیره رطوبتی خاک برای رشد محصول را بیان می‌کند (۱۶). تیمیلین و همکاران (۳۹) بین انحنا و عملکرد ذرت، یک همبستگی مکانی قوی یافتند و عنوان نمودند که انحنای بیشتر (مثبت یا منفی) بیانگر مکان‌هایی است که خاک، تجمع یا فرسایش یافته است و عملکرد بیشتر یا کمتر در یک فصل خشک، با این مناطق در ارتباط است. سینایی و همکاران (۳۶) بیان کردند که در مناطق در خشک، مقدار رطوبت با انحنای سطحی، همبستگی بالای دارد.


بین شاخص خیسی (TWI) و مؤلفه‌های عملکرد منطقه، همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد. شاخص خیسی در یک نقطه بیان کننده تمایل زمین به انباشت آب در آن نقطه می‌باشد و برای مناطق با سطح ویژه حوزه مشابه، هر چه شیب منطقه کمتر باشد، این شاخص از مقدار بالاتری برخوردار است (۴۴). سی و فارل (۳۵) دریافتند که شاخص خیسی به‌نهایی ۴۶ درصد از تغییرات عملکرد دانه گندم را توجیه می‌کند. اقبال و همکاران (۲۳) در مطالعه‌ای در شرق می‌سی‌سی پی دریافتند که بین عملکرد پنبه و شاخص خیسی یک همبستگی مثبت وجود دارد.

شیب زمین یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در زراعت دیم و همچنین منطقه مورد مطالعه در این پژوهش می‌باشد که با عملکرد کل، همبستگی منفی معنی‌دار نشان داد. به‌طور کلی، موقعیت‌های تند شیب منجر به فرسایش شدید می‌شود، که با افق سطحی نازک‌تر، سرعت نفوذ کمتر و رواناب بیشتر، مشخص می‌گردد و به ذخیره رطوبتی و حاصلخیزی کمتر خاک می‌انجامد (۴۵). در زمین‌های با توپوگرافی گوناگون، خاک‌های پایین شیب رطوبت بیشتری دریافت

جدول ۶- مدل‌های رگرسیونی مؤلفه‌های عملکرد گندم دیم

مدل رگرسیون	R^2	ME	RMSE
$(CCE) = 18/0.33 - 0.008 \text{ (elev)} + 3/557 \text{ (OM)} - 0.008 \text{ (slope)}$ (t/ha) عملکرد کل	۰/۴۳**	۱/۱۴	۱/۸۴
$(TWI) = 5/321 - 0.003 \text{ (elev)} + 1/588 \text{ (OM)} + 0.008 \text{ (slope)}$ (t/ha) عملکرد دانه	۰/۴**	۰/۳۳	۰/۵۶

CCE: کربنات کلسیم معادل، elev: ارتفاع، OM: ماده آلی، slope: شیب، SPI: شاخص قدرت جریان



شکل ۲- مقادیر مشاهده و پیش بینی شده گندم دیم (الف) عملکرد کل، (ب) عملکرد دانه به روش رگرسیون چند متغیره

مطالعه، تنها ۴۰-۴۳ درصد آن توسط تعییرات مربوط به متغیرهای موجود در مدل‌ها توجیه می‌شود که این توجیه از نظر آماری در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار است. به عبارت دیگر، ۵۷-۶۰ درصد از تعییرات عملکرد (ضریب عدم تبیین) مربوط به تعییرات عواملی بوده که در این پژوهش و انتخاب مدل‌های رگرسیون حاظ نشده است. باخسی از این موضوع را نیز می‌توان به وجود روابط غیر خطی بین مؤلفه‌های عملکرد گندم و پارامترهای خاک و پستی و بلندی زمین نسبت داد که روش رگرسیون چند متغیره قادر به در نظر گرفتن این روابط نمی‌باشد. از این‌رو، در راستای ایجاد مدلی معتبرتر که تعییری‌بزیری بیشتری از مؤلفه‌های عملکرد گندم در این منطقه را پیش‌بینی نماید نیاز به استفاده از روش‌های غیرخطی مدل‌سازی که قادر به در نظر گرفتن روابط پیچیده بین پدیده‌ها باشند احساس می‌شود. همچنین استفاده از دیگر ویژگی‌های موثر بر عملکرد در مدل‌سازی، همانند عوامل مدیریتی برای رسیدن به نتیجه بهتر لازم به نظر می‌رسد.

سیاستگذاری

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، برای تأمین باخسی از هزینه انجام این پژوهش و همکاری صمیمانه مدیریت و کارکنان ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی دیم شیروان و سیساب، تشکر و قدردانی می‌گردد.

سودوت و همکاران (۳۸) از شیوه‌های خطی در یک مجموعه داده، شامل چندین سال اطلاعات پستی و بلندی، خاک و عملکرد استفاده کردند و دریافتند که روش‌های خطی معمولاً در تقریب تعییرات مکانی عملکرد، حتی در مقیاس مزرعه که به نظر می‌رسد همگن باشد، دچار شکست می‌شوند. در موند و همکاران (۱۸) از چندین روش رگرسیون خطی چند متغیره برای مدل‌سازی رابطه بین عملکرد ذرت یا سویا و ویژگی‌های خاک بهره گرفتند و هر یک از عوامل که ماتریس‌های همبستگی، رابطه خطی عملکرد و عنوان نمودند موثر بر آن را بیان می‌کند. بنابراین، بهدلیل وجود روابط غیرخطی و پیچیده بین عملکرد و عوامل زیاد تاثیرگذار برآن، همبستگی می‌تواند منجر به اطلاعات نادرست و حتی گمراه کننده درباره این روابط شود.

نتیجه‌گیری

مطابق نتایج بدست آمده در این پژوهش، از میان فاکتورهای خاک و شاخص‌های پستی و بلندی بررسی شده، درصد ماده آلی از اهمیت بیشتری در مدل‌های رگرسیونی انتخابی برخوردار است. به عبارت دیگر، در میان متغیرهای وارد شده به مدل‌ها، سهم ماده آلی در توجیه تعییرات بیش از سایرین است و این موضوع، نقش مثبت افزایش ماده آلی در بهبود عملکرد گندم منطقه را مشخص می‌کند. ضریب تبیین مناسبترین مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که از ۱۰۰ درصد تعییرات مربوط به مؤلفه‌های عملکرد در منطقه مورد

منابع

- آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۷-۸۸. سازمان جهاد کشاورزی و دفتر آمار و فناوری اطلاعات.
- ایوبی ش.، و جلالیان ا. ۱۳۸۵. ارزیابی اراضی (کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی). انتشارات مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.
- بامری م.، بهرامی ح.، و مسیح آبادی م. ح. ۱۳۸۲. ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت چاه شور ایرانشهر برای کشت آبی گندم، جو و یونجه. مجله

علوم خاک و آب. ۱۷: ۲۰۵-۱۹۴.

- ۴- صفائی خانی س. ۱۳۸۶. بررسی روند ده ساله افزایش سطح تولید و عملکرد گندم در کشور. ماهنامه دام کشت و صنعت، ۵۸ تا ۹۴.
- ۵- طباطبایی فر ا، ندرلو ل، جوادی کیا پ، و شیرکوند، ح. ۱۳۸۷. سیستم‌های خاکورزی حفاظتی و داشت محصول. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان.
- ۶- فقیه ا. ۱۳۸۸. بررسی تثبیت کربن در شرایط متفاوت فیزیوگرافی و اقلیم در حوزه شمالی رودخانه کرج با استفاده از RS و GIS. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
- ۷- مطلوبی ا، همایی م، زارعی ق، و محمودی ش. ۱۳۸۹. بررسی تاثیر آهک بر ویژگی‌های رطوبتی خاک‌های سری گرم‌ساز با استفاده از توابع انتقالی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. ۳: ۴۳۹-۴۲۶.
- ۸- ملکوتی م، ج، کشاورز پ، و کریمیان ن. ۱۳۸۷. روش جامع تشخیص و توصیه بهینه کود برای کشاورزی پایدار. انتشارات دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- ۹- ندیم م، هفتلنگ ه، و جعفریان م.ب. ۱۳۸۳. نقشه ۱/۱۰۰۰۰۰ شیروان. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
- ۱۰- نوروزی م. ۱۳۸۷. پیش‌بینی تولید گندم دیم به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی در منطقه اردل استان چهارمحال بختیاری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان.
- 11- Ayoubi S., Khormali F., and Sahrawat K.L. 2009. Relationships of barley biomass and grain yields to soil properties within a field in the arid region: Use of factor analysis. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B- Soil and Plant Science*, 59:107-117.
- 12- Bardossy A., and Lehmann W. 1998. Spatial distribution of soil moisture in a small catchment. Part 1: Geostatistical analysis. *Journal of Hydrology*, 206:1-15.
- 13- Changere A., and Lal R. 1997. Slope position and erosional effects on soil properties and corn production on a Miamian soils in central Ohio. *Journal of Sustainable Agriculture*, 11:5-21.
- 14- Chen Z.S., Hsieh C.F., Jiang F.Y., Hsieh T.H., and Sun I.F. 1997. Relations of soil properties to topography and vegetation in a subtropical rain forest in southern Taiwan. *Plant Ecology*, 132:229-241.
- 15- Cox M.S., Gerard P.D., Wardlaw M.C., and Abshire M.J. 2003. Variability of Selected Soil Properties and Their Relationships with Soybean Yield. *Soil Science Society of America Journal*, 67:1296-1302.
- 16- Daniels R.B., Gilliam J.W., Cassel D.K., and Nelson L.A. 1987. Quantifying the effect of past soil erosion on present soil productivity. *Journal of Soil and Water Conservation*, 42:183-187.
- 17- Degroot M. 1986. Probability and Statistics. 2nd Ed., Reading, Massachsette, Addison-Wesley Press.
- 18- Drummond S.T., Sudduth K.A., and Birrell S.J. 1995. Analysis and correlation methods from spatial data. ASAE paper 95-1335. ASAE, St. Joseph, MI, USA.
- 19- Evrendliek F., Celik I., and Kilic S. 2004. Changes in soil organic carbon and other physical soil properties along adjacent Mediterranean forests, grassland and cropland ecosystems. *Journal of Arid Environments*, 59:743-752.
- 20- Fatima M., Bedhiaf M., and Rhomari Y. 1992. Fertilization of cereals: Soil-nitrogen test calibration in Morocco's Gharb Area. P. 212-224. In: Ryan J. and Matar A. (Eds.), Fertilizer use efficiency under rain-fed agriculture in West Asia and North Africa. ICARDA, Aleppo, Syria.
- 21- Grayson R., and Bloschl G. 2000. Spatial Patterns in Catchment Hydrology: Observations and modeling. Cambridge University Press.Cambridge, UK.
- 22- Grewal S.S., Singh K., and Dyal S. 1984. Soil profile gravel concentration and its effect on rainfed crop yields. *Plant and soil*, 81:75-83.
- 23- Iqbal J., Read J.J., Thomasson A.J., and Jenkins J.N. 2005. Relationships between soil-landscape and dryland cotton lint yield. *Soil Science Society of America Journal*, 69:1-11.
- 24- Jiang P., and Thelen K.D. 2004. Effect of soil and topographic properties on crop yield in a North-central corn-soybean cropping system. *Agronomy Journal*, 96:252-258.
- 25- Kravchenko A.N., and Bullock D.G. 2000. Correlation of corn and soybean grain yield with topography and soil properties. *Agronomy Journal*, 92:75-83.
- 26- Kumhálová J., Matějková S., Fifernová M., Lipavský J., and Kumhála F. 2008. Topography impact on nutrition content in soil and yield. *Plant, Soil and Environment*, 54:255-261.
- 27- Marques da Silva J.R., and Silva L.L. 2008. Evaluation of the relationship between maize yield spatial land temporal variability and different topographic attributes. *Biosystems Engineering*, 101:183-190.
- 28- Masoni A., Ercoli L., Mariotti M., and Pampana S. 2008. Nitrogen and phosphorus accumulation and remobilization of durum wheat as affected by soil gravel content. *Cereal Research Communications*. 36:157-166.
- 29- Modaihsh A.S., Al-Romian F.M., and Mahjoub M.O. 1996. Nitrogen management and nitrappyrin effects on yield and N recovery of wheat. *Journal of King Saud University*, 8:159-172.

- 30- Park S.J., Hwang C.S., and Vlek P.L.G. 2005. Comparison of adaptive techniques to predict crop yield response under varying soil and land management conditions. *Agricultural Systems*, 85:59-81.
- 31- Pierce F.S., Warncke D.D., and Everett M.W. 1994. Yield and nutrient variability in glacial soils of Michigan. P. 133-150, In: Roberts P.C., Rust R.H., and Larson W.E. (Eds.), Proceeding of 2nd International Conference on Site-Specific Management for Agricultural Systems, Minneapolis, MN. March 27-30, ASA, SSSA, and CSSA, Madison, WI.
- 32- Plante A.F., Conant R.T., Stewart C.E., Paustian K., and Six J. 2006. Impact of soil texture on the distribution of soil organic matter in physical and chemical fractions. *Soil Science Society of America Journal*, 70:287-296.
- 33- Seibert J., Stendahl J., and Sorensen R. 2007. Topographical influences on soil properties in boreal forests. *Geoderma*, 141:139-148.
- 34- Shukla M.K., Lal R., and Ebinger M. 2004. Principal component analysis for predicting corn biomass and grain yields. *Soil Science*, 169:215-224.
- 35- Si B.C., and Farrell R.E. 2004. Scale-dependent relationship between wheat yield and topographic indices: A wavelet approach. *Soil Science Society American Journal*, 68:577-587.
- 36- Sinai G., Zaslavsky D., and Golany P. 1981. The effect of soil surface curvature on moisture and yield-beer Sheba Observation. *Soil Science*, 132:367-375.
- 37- Souza Z.M., Cerri D.G.P., Magalhães P.S.G., and Siqueira D.S. 2010. Spatial variability of soil attributes and sugarcane yield in relation to topographic location. *Engenharia Agrícola e Ambiental*, 14:1250-1256.
- 38- Sudduth K.A., Drummond S.T., Birrell S.J., and Kitchen N.R. 1996. Analysis of spatial factors influencing crop yield. P. 129-149, In: Robert P. C., Rust R.H. and Larson W.E., (Eds.), Proceeding of 3rd International Conference on Site-Specific Management for Agricultural Systems, June 23-26, Madison, WI., ASA-CSSA-SSSA.
- 39- Timlin D.Y., Pachebsky Y., Snyder V.A., and Bryant R.B. 1998. Spatial and temporal variability of corn yield on a hillslope. *Soil Science Society America Journal*, 62:746-773.
- 40-USDA-NRCS, 1996. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report, No. 42. Version 3.0. Nebraska.
- 41- Wendroth O., Reuter H.I., and Kersebaum K.C. 2003. Predicting yield of barley across a landscape : a state-space modeling approach. *Journal of Hydrology*, 272:250-263.
- 42- Whelan B.M., and McBratney A.B. 2000. The 'null hypothesis' of precision agriculture management. *Precision Agriculture*, 2:265-279.
- 43-Wilding L.P. 1985. Spatial variability: Its documentation, accommodation, and implication to soil surveys. In: Nielsen, D.R., and Bouma J. (Eds.), *Soil Spatial Variability*. Pudoc, Wageningen, The Netherlands.
- 44- Wilson J.P., and Gallant J.C. 2000. *Terrain Analysis*. Wiley and Sons. New York.
- 45- Wright R.J., Boyer D.G., Winant W.M., and Perry H.D. 1990. The influence of soil factors on yield differences among landscape positions in an Appalachian corn field. *Soil Science*, 149:375-382.
- 46- Yang C., Peterson C.L., Shropshire G.J., and Otawa T. 1998. Spatial variability of field topography and wheat yield in the Palouse region of the Pacific Northwest. *Transaction of the ASAE*, 41:17-27.

Influence of Topography and Soil Characteristics on the Rainfed Wheat Yield in Sisab Region, Northeastern Iran

A. Shabani^{1*}- Gh. Haghnia²- A. Karimi³- M.M. Ahmadi⁴

Received: 6-8-2011

Accepted: 25-2-2012

Abstract

Topographic characteristics are considered as important factors for growth and yield of rainfed crops because of the impact on the water distribution and consequently effects on soil physical and chemical properties. No information is available on this subject for North Khorasan province of Iran. The purpose of this study was to investigate the effect of soil and topographic characteristics on the rainfed wheat yield in Sisab region of North Khorasan province. Surface soil samples and wheat yield data were taken from 100, 1×1 m² plots on different slope positions from 800 ha of rainfed farms. Sand, silt, clay, gravel, calcium carbonate equivalent, soil organic matter, pH, EC, total nitrogen, available potassium and phosphorus were measured. Primary and secondary topographic derivatives including elevation, slope, aspect, plan curvature, topographic wetness index, sediment transport index and stream power index were calculated from a 30m grid cell size digital elevation model. Multiple regression models were developed between soil and topographic characteristics and yield components. 20 out of 100 samples were used to validate the model prediction. Coefficients of correlation matrix showed that elevation and calcium carbonate equivalent have the strongest correlation with wheat yield components. Soil factors including calcium carbonate percentage and organic matter and topographic indices such as elevation, slope and stream power index were entered into the regression models. Because of non-linear and complex interrelation, the regression models explained only 43% and 40% of total and grain yield variations, respectively. The results of this study showed that although Sisab is located on the border of arid and semiarid climate, the topographic characteristics could affect soil properties and wheat yield components.

Keywords: Yield prediction, Digital elevation model derivations, Rainfed wheat

1,2,3- MSc Student, Professor and Assistant Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Respectively

(*- Corresponding Author Email: shabani_362@yahoo.com

4- Lecture of Rainfed Research Center of Shirvan