



ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کودآبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

صادم اسفندیاری^{۱*} - حسین دهقانی سانیج^۲ - امین علیزاده^۳ - کامران داوری^۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۱/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۷/۲

چکیده

مطلوب زیادی در ارتباط با عملکرد بیولوژیک و اقتصادی ذرت دانه‌ای به رشتۀ تحریر در آمده است، اما اطلاعات در مورد عوامل موثر بر رشد و مرفولوژی ریشه بسیار اندک است. لذا به منظور مطالعه اثر روش‌های آبیاری قطره‌ای (سطحی و زیرسطحی) و کود نیتروژن بر توسعه ریشه ذرت و بررسی مدل‌های حرکت عمقی ریشه، آزمایشی در قالب اسپلیت پلات بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با تیمار اصلی روش آبیاری در دو سطح (قطره‌ای سطحی و زیرسطحی) و تیمار فرعی میزان کود نیتروژن در دو سطح (۵۰ و ۱۰۰٪ نیاز کودی گیاه) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقاتی مهندسی کشاورزی کرج بر روی گیاه ذرت رقم دابل کراس ۳۷۰ انجام شد. پایش عمق ریشه با روش حفر تراشه و مشاهده نیمیرخ خاک انجام شد. نمونه‌گیری در طول دوره رشد در هشت نوبت، با فواصل ۱۰ روزه و اندازه گیری وزن ریشه در لایه‌های خاک نیز از روش برداشت مونولیت‌های خاک و شستشو در صافی‌های پلاستیکی با فشار آب انجام گرفت. نتایج نشان داد عمق توسعه ریشه بعد از مرحله ۲۰ روزگی گیاه ذرت به طور معنی‌داری بیشتر از روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی است، بعد از مرحله ۳۰ تا ۸۰ روزگی تفاوت معنی‌داری در سطح ۵٪ با هم نشان ندادند. اثر کود آبیاری نیتروژن در هیچ مرحله‌ای از دوره رشد روی عمق توسعه ریشه در سطح ۵٪ معنی‌دار نبود. اثر متقابل آنها (روش آبیاری در سطح کود) بر عمقد توسعه ریشه در مراحل مختلف رشد در سطح ۵٪ معنی‌دار نبود. اثر تیمارهای مختلف روش توسعه ریشه گیاه ذرت در کلیه مراحل رشد معنی‌دار نبودند. بیشترین درصد تجمع ریشه در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در لایه ۲۰ تا ۴۰ سانتی‌متری خاک اتفاق افتاد، در حالی که در روش سطحی در لایه ۰ تا ۲۰ سانتی‌متری خاک بود، همچنین ریشه‌ها در روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نسبت به آبیاری قطره‌ای سطحی به طور یکنواخت‌تر در داخل خاک توزیع شده بودند. کمترین تراکم ریشه در هر دو روش مربوط به لایه ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متری خاک بود. بیشترین دقت تخمین حرکت عمقد ریشه در مدل‌ها به ترتیب مربوط به مدل خطی، بورگ و گریمز و کراب وات بود.

واژه‌های کلیدی: مدل توسعه ریشه، قطره‌ای سطحی، قطره‌ای زیرسطحی، کودآبیاری، ذرت

مقدمه

گیاه توجه گردد. عوامل مختلفی نظریه ژنتیک، رطوبت، دما، مواد سمی، روش خاک‌ورزی و روش آبیاری تاثیرات گوناگونی بر رشد و نمو ریشه ذرت دارند. پلرین و تاردیو (۱۸) با ارائه یک مدل مفهومی برای سیستم ریشه ذرت گزارش کردند به علت تغییرات فراوان در پارامترهای موثر بر رشد ریشه، پیشگویی روند دقیق توسعه ریشه بسیار مشکل است. نیکل و همکاران (۱۶) و لانگلی (۱۳) معتقدند ساخت یک مدل کامل برای رشد ریشه به دلیل وجود عوامل متغیر و تاثیرات متقابل این عوامل بر یکدیگر بسیار پیچیده و پرسخت است. تحقیقات راسل (۲۰) نشان داد که تحت شرایط مزرعه‌ای، تغییر در مقدار آب خاک عمده‌ترین دلیل توزیع متفاوت ریشه‌هاست. لاپوسکی و همکاران (۱۲) بیان کردند وقتی توزیع ریشه‌ها توسط عوامل دیگر محدود نشود، مقدار رطوبت خاک عمقد ریشه‌دانی را کنترل می‌کند. ضیائیان و ملکوتی (۳) نیز بیان کردند که زمان، روش و مقدار آب آبیاری کاربردی روی چگونگی رشد و توزیع ریشه موثر است. عده‌ای

ذرت (Zea mays) گیاهی یکساله، دارای سیستم ریشه‌ای افشار که در بیشتر نقاط دنیا به ویژه مناطق گرم و معتدل قابل کشت و بهره‌برداری است. رشد و توسعه ریشه گیاهان و مرفولوژی آن در جذب آب و دیگر عناصر غذایی بسیار موثر است. روش‌های آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رشد و توسعه عمقد و عرض ریشه و در نهایت بر جذب آب و عناصر غذایی گیاه و عملکرد آن تاثیر دارند (۳ و ۱۰). علیزاده (۴) معتقد است که در بررسی روابط آب و خاک و گیاه باید به سیستم ریشه‌ای گیاهان و نقش آن در جذب آب و نمو

۱، ۳ و ۴- به ترتیب دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، استاد و دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
۲- استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
۳- نویسنده مسئول: (Email: esfandiari_samad@yahoo.com)

قرار نگرفت. باربر (۵) گزارش نمود که کوددهی باعث افزایش فتوستندر گیاه و رشد و نمو اندامهای هوایی و عملکرد گیاه گردید ولی ممکن است بر رشد ریشه تاثیر معنی داری نداشته باشد و یا حتی موجب کاهش رشد ریشه نیز گردد. شیرانی و همکاران (۲) طی تحقیقی گزارش نمودند که مصرف مقادیر مختلف کود دامی تاثیر معنی داری بر مرفوولوژی ریشه نداشت، اما عملکرد بیولوژیک گیاه ذرت را افزایش داد. پاندا و همکاران (۱۷) اعلام نمودند که عمق مؤثر ریشه گیاه ذرت در ۳۰ تا ۴۰ روزگی ۴۵ سانتیمتر، در ۴۰ تا ۵۵ روزگی ۶۰ سانتیمتر و از آن پس تا بلوغ کامل ۹۰ سانتیمتر می گردد. فولت و همکاران (۸) در بررسی وضعیت رشد ریشه گیاه ذرت، در شرایط بالا بودن سطح آب زیرزمینی (۱/۳ تا ۲/۶ متر)، عمق نهایی ریشه گیاه ذرت را در شرایط آزمایش، ۹۱ سانتیمتر و در خاک شنی بیش از ۱۰۰ سانتیمتر گزارش کردند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر سامانه های آبیاری قطره ای و کودآبیاری نیتروژن بر رشد و توسعه ریشه ذرت در شرایط مزرعه بود.

مواد و روش ها

این مطالعه در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی واقع در کرج (۳۵) درجه و ۲۱ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۳۸ دقیقه طول شرقی) انجام شد. برخی از ویژگی های شیمیایی خاک و آب آبیاری به ترتیب در جداول ۱ و ۲ آمده است. گیاه ذرت (رقم دابل کراس ۳۷۰) با فواصل ۲۰ در ۷۵ سانتیمتر به ترتیب در روی و بین ردیفها و با عمق ۳ تا ۵ سانتیمتر در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۹ کاشته شد. ابعاد کرت های آزمایشی ۱۵ در ۲۰ متر بود و آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی که عامل اصلی در دو سطح (آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی) و عامل فرعی در دو سطح (تامین ۵۰ و ۱۰۰٪ نیاز کودی گیاه) در سه تکرار انجام شد.

از محققان معتقدند که تحت شرایط خشکی، ریشه ها معمولاً به قسمت های مرطوب تر پروفیل خاک رشد کرده و توده های بزرگ تری از شاخه های منشعب ایجاد می کنند. در حالی که عده ای دیگر مخالف نظریه هیدروروپیسم هستند (۱۱). لیس و بارنز (۷) گزارش نمودند اگر خاک به مدت طولانی مرطوب باشد رشد طولی ریشه کندر می شود و هرچه خاک خشک تر باشد وزن ریشه نیز کمتر می شود، بنابراین دور آبیاری کوتاه باعث می شود که فقط خاک منطقه تعذیب آب مرطوب شده و رشد ریشه گیاه نیز محدود به آن منطقه شود. هاکت (۹) با مطالعه پنج گیاه زراعی از جمله ذرت گزارش کرد که وزن و توزیع ریشه ذرت در خاک بستگی به رقم ذرت و خواص خاک دارد، اما معمولاً وزن ریشه با افزایش عمق و فاصله گرفتن از ردیف کشت کاهش می یابد. رمو و دیاز (۱۹) در آزمایشی با هدف مقایسه روش های آبیاری قطره ای و غرقابی بر توسعه ریشه درختان دریافتند در آبیاری قطره ای، ریشه ها در سطح تجمع بیشتری دارند و در اعماق خاک تراکم آنها کاهش می یابد. مادسن (۱۴) با مطالعه چگونگی توسعه ریشه گیاه جو در شرایط مختلف اقلیمی، اعلام کرد تراکم ریشه ها با افزایش عمق خاک به صورت لگاریتمی کاهش می یابد. باری و میلر (۶) گزارش نمودند محدودیت هایی که باعث کاهش عمق ریشه گیاه می شوند، رشد اندامهای هوایی را به طور چشمگیری کاهش نمی دهند. هرناندز و همکاران (۱۰) تجمع ریشه گیاه ذرت در لایه های مختلف خاک را در روش های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی تا عمق ۷۰ سانتیمتری بررسی و اعلام کردند وزن خشک ریشه گیاه در روش آبیاری قطره ای زیرسطحی نسبت به سطحی به طور معنی داری افزایش نشان داد، همچنین بیشترین تجمع ریشه گیاه ذرت در روش های آبیاری سطحی و زیرسطحی به ترتیب در لایه های ۰-۱۰ و ۲۰-۳۰ سانتیمتری خاک توسط آنها گزارش شد. ابراهیم زاده و حسن لی (۱) دریافتند که بیشترین و کمترین عمق توسعه ریشه گیاه ذرت به ترتیب مربوط به آبیاری قطره ای زیرسطحی و جویچه ای است، اما عمق نهایی ریشه به طور معنی داری تحت تاثیر روش های آبیاری (قطره ای زیرسطحی، قطره ای سطحی و جویچه ای)

جدول ۱- مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

عمق خاک (cm)	جرم مخصوص ظاهری خاک (g/cm ³)	رطوبت وزنی در حد ظرفیت زراعی (%)	رطوبت وزنی در حد ظرفیت	هدایت الکتریکی (dS/m)	pH	بافت خاک
۰-۲۰	۱/۴۲	۲۲/۵	۹/۸	۱/۴۳	۷/۶۲	لوم
۲۰-۴۰	۱/۴۲	۲۲/۴	۹/۶	۱/۷۱	۷/۷۹	لوم
۴۰-۶۰	۱/۴۲	۲۲/۴	۹/۵	۱/۸۱	۷/۵۹	لوم
۶۰-۸۰	۱/۴۲	۲۲/۱	۹/۴	۲/۷۶	۷/۵۴	لوم

جدول ۲- مشخصات شیمیایی آب آبیاری محل آزمایش

چاه	.۸	۷/۸	۳	pH	هدايت الکتریکی (dS/m)	منبع آب	سدیم منزیم کلیم سولفات بی کربنات (meq/lit)	۲/۴	۱/۸	۲/۴	۲/۴	۲/۴	۱/۸	۲/۴
-----	----	-----	---	----	-----------------------	---------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

داخل خاک کوبیده شد و برای مشخص شدن مرفولوژی ریشه ذرت در تیمارهای مختلف در سن ۸۰ روزگی گیاه از دیواره ترانشه، لایه به لایه مونولیت‌هایی تهیه و خارج شدند. هر مونولیت به ابعاد ۲۰×۲۰×۲۰ سانتیمتر، در جهت‌های عمق و عرض ریشه سه مونولیت هر کدام با طول و عرض ۲۰ سانتیمتر جمما ۹ مونولیت خاک و ریشه برای هر گیاه برداشت شد. سپس خاک محتوای ریشه‌ها به آزمایشگاه منتقل و مونولیت‌های خاک به مدت ۲۴ ساعت در تشتهای پلاستیکی خیسانده شدند تا هنگام شستشو، ریشه‌ها با کمک فشار آب در داخل صافی‌های پلاستیکی به راحتی از خاک جدا شوند. پس از شستشو، ریشه‌های خیس وزن و بعد از چند ساعت قرار گرفتن در هوای آزاد به داخل آون منتقل و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۷۵ درجه سانتی‌گراد خشک شدند. ریشه‌های خشک شده با ترازوی دیجیتالی با دقیق ۰/۱ گرم توزین شدند. حجم ریشه‌ها مستقیماً از روی جابه‌جا شدن آب در استوانه‌های مدرج پس از وارد کردن ریشه‌های شسته شده به داخل آن اندازه‌گیری شد. در نهایت داده‌های اندازه‌گیری شده به کمک نرمافزار MSTATC و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج و بحث

عمق و عرض توسعه ریشه

جدول ۳ نتایج تجزیه واریانس در طول دوره رشد را نشان می‌دهد. بر اساس آن عمق توسعه ریشه‌ها فقط تحت تاثیر روش‌های آبیاری قطره‌ای در دو مرحله از دوره رشد، ۱۰ و ۲۰ روز بعد از کشت قرار گرفت که اختلافات در سطح ۵٪ معنی‌دار بود و تاثیر سایر تیمارها در کلیه مراحل برداشت از دوره رشد بر روی عمق و عرض توسعه ریشه در سطح ۰/۵٪ معنی‌دار نبود (جدول ۳).

مقایسه میانگین‌های عرض و عمق توسعه ریشه گیاه ذرت در جدول ۴ آمده است. نتایج جدول نشان می‌دهد که عمق توسعه ریشه در روش آبیاری قطره‌ای سطحی در طی ۱۰ و ۲۰ روز اول از دوره رشد به طور معنی‌داری (سطح ۰/۵٪) بیشتر از روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی است. دلیل این امر احتمالاً به نحوه خیس شدن خاک توسط روش‌های آبیاری برمی‌گردد. زیرا در روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی سطح خاک رطوبت کمتری نسبت به روش آبیاری قطره‌ای سطحی دریافت می‌کند که عامل سیار مهم در توسعه و رشد ریشه گیاه است. ولی بعد از ۲۰ روزگی اثر تیمارها بر میانگین رشد

برای آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی از لوله‌های ۱۶ میلیمتری مجهز به قطره چکان در داخل لوله با فاصله ۳۰ سانتیمتر از هم، استفاده شد. لوله‌های آبیاری قطره‌ای زیرسطحی توسط نیروی کارگری در عمق ۳۰ سانتیمتر از سطح خاک در زیر ردیف کشت کار گذاشته شدند. کود نیتروژن به روش کودآبیاری و به صورت تقسیطی با سامانه آبیاری قطره‌ای در اختیار گیاه ذرت قرار گرفت. برنامه آبیاری ۲ بار در هفت‌های ریشه‌ها یکشنبه و چهارشنبه انجام شد. مقدار آب آبیاری بر اساس اطلاعات هواشناسی ثبت شده توسط ایستگاه Ref-ET هواشناسی خودکار نصب شده در سطح مزرعه به کمک نرمافزار ET محاسبه و در اختیار گیاه قرار گرفت. همزمان با کشت، ترانشه‌هایی با عمق و عرض ۸۰ سانتیمتر به موازات خطوط کشت در داخل کرت‌های آزمایشی حفاری شد. اندازه‌گیری عمق و عرض ریشه در هشت نوبت، با فواصل ۱۰ روز در طول دوره رشد برای هر تیمار انجام و عمق توسعه ریشه در سه تکرار و از هر تکرار پنج گیاه اندازه‌گیری شد. در هر نوبت ریشه‌های در محل ترانشه‌ها با بیلچه حفاری و عمق و عرض آنها با خط‌کش اندازه‌گیری شدند. متوسط عمق و عرض‌های ریشه در هر تیمار به عنوان معیار برای ارزیابی انتخاب شدند. بهمنظور مقایسه نتایج حاصله از معادله درجه دو بدست آمده از این مطالعه با مدل‌های مختلف تخمین عمق ریشه از سه مدل استفاده شد که عبارتند از مدل خطی مارتین و همکاران (Martin et al., 1990) که به صورت $Rd=Rd_{min}+(Rd_{max}-Rd_{min})Rf$ می‌باشد. Rd : عمق ریشه در روز اندازه‌گیری (سانتیمتر)، Rd_{min} : حداقل عمق ریشه، Rd_{max} : عمق نهایی ریشه و Rf : ضریب رشد ریشه است. در این مدل حداقل عمق ریشه با توجه به دیر یا زود رس بودن گیاه بین ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر و عمق نهایی ریشه گیاه ذرت بین ۱ تا ۲ متر گزارش شده است. ضریب رشد از رابطه $Rf=Dag/Dtm$ محاسبه می‌شود. Dag : فاصله زمان سبز شدن تا روز اندازه‌گیری (روز) و Dtm : زمان سبز شدن تا رسیدن به عمق نهایی ریشه است. مدل کراپوات، فقط حداقل عمق ریشه را در مدل فوق ۳۰ سانتیمتر فرض می‌کند. مدل سینوسی بورگ و گریمز (Borg & Grimes., 1986) به صورت $Rd=Rd_{max}[0.5+0.5\sin\{3.03*(Dag/Dtm)-1.47\}]$ است. برای اندازه‌گیری وزن ریشه در لایه‌های مختلف خاک از روش مونولیت استفاده شد (۳)، در این روش ستونهایی از خاک (مونولیت) به همراه ریشه گیاه برداشت شدند. برای مطالعه دقیق‌تر از مونولیت‌های مکعبی با ضلع ۲۰ سانتیمتر استفاده شد به طوری که ابتدا گیاه ذرت کفبر و سپس مکعب به طور عمودی از روی ریشه‌ها به

آنها مدل رگرسیونی پلی‌نومیال بیشترین ضریب همبستگی را با داده‌های مذکور نشان داد (شکل ۱). این منحنی نشان می‌دهد روند توسعه عمقی ریشه گیاه ذرت در منطقه آزمایش به صورت معادله درجه دو به شکل محدب تغییر می‌کند. بر اساس این نمودار رشد ریشه با شیب تند شروع، اما به تدریج شیب آن بعد از ۵۰ روزگی کاهش می‌یابد. سرعت طولی شدن ریشه‌ها پس از ۵۰ روزگی (مرحله تولید ابریشم) کاهش یافته.

ریشه ذرت از نظر آماری در سطح ۵٪ معنی دار نیست. مطالعات متعدد نشان داده که مصرف مقادیر مختلف کود بر رشد و توزیع ریشه گیاهان در خاک اثر معنی دار ندارد (۲ و ۵).

ارزیابی مدل‌های توسعه ریشه

روند توسعه ریشه گیاه ذرت در شرایط آزمایش در برنامه اکسل رسماً و مدل‌های رگرسیونی مختلف داده‌ها، برازش گردید که از بین

جدول ۳- نتایج تجزیه واریانس عرض و عمق توسعه ریشه گیاه ذرت در طول دوره رشد

میانگین مربعات										پارامتر
۸۰ روزگی	۷۰ روزگی	۶۰ روزگی	۵۰ روزگی	۴۰ روزگی	۳۰ روزگی	۲۰ روزگی	۱۰ روزگی	منابع تغییر		
۱/۰۸ ns	۳/۵۸ ns	۲/۷۷ ns	۲/۳۳ ns	۰/۵۸ ns	۵/۰۸ ns	۰/۱۵ ns	۰/۹۰ ns	تکرار		
۰/۷۵ ns	۰/۳۳ ns	۰/۰۲ ns	۳/۰۰ ns	۱۲/۰۰ ns	۰/۳۳ ns	۸/۳۳*	۱۵/۱۹*	روش آبیاری		
۰/۲۵	۱/۰۸	۱/۲۷	۱/۰۰	۲/۰۰	۰/۵۸	۰/۲۷	۰/۸۱	خطای اول		
۴/۰۸ ns	۰/۰۰ ns	۰/۵۲ ns	۳/۰۰ ns	۱۲/۰۰ ns	۵/۳۳ ns	۰/۳۳ ns	۰/۵۲ ns	عمق	سطح کود	
۰/۰۸ ns	۵/۳۳ ns	۰/۵۲ ns	۵/۳۳ ns	۳/۰۰ ns	۱/۳۳ ns	۰/۷۵ ns	۰/۱۹ ns	ریشه	روش در سطح	
۱/۸۳	۲/۱۷	۱/۲۷	۱/۶۷	۳/۰۰	۳/۳۳	۰/۱۷	۰/۱۰	خطای دوم		
۱/۸۵٪	۲/۰ ٪	۱/۷۶٪	۲/۱۴٪	۳/۲۴٪	۴/۲۶٪	۱/۶۰٪	۲/۰۸٪	ضریب تغییرات		
۰/۲۵ ns	۱/۳۳ ns	۶/۴۴ ns	۲/۰۳ ns	۱/۳۱ ns	۱/۳۳ ns	۱/۰۰ ns	۰/۴۰ ns	تکرار		
۱/۳۳ ns	۰/۷۵ ns	۰/۰۲ ns	۰/۰۲ ns	۳/۰۰ ns	۰/۷۵ ns	۴/۰۸ ns	۲/۰۸ ns	روش آبیاری		
۰/۵۸	۳/۰۰	۱/۲۷	۱/۰۲	۰/۶۷	۱/۰۰	۲/۲۳	۰/۱۵	خطای اول		
۱/۳۳ ns	۲/۰۸ ns	۰/۱۹ ns	۰/۰۲ ns	۱/۳۳ ns	۰/۷۵ ns	۴/۰۸ ns	۰/۳۳ ns	عرض	سطح کود	
۱/۳۳ ns	۴/۰۸ ns	۱/۶۹ ns	۰/۱۹ ns	۰/۳۳ ns	۰/۰۸ ns	۶/۷۵ ns	۰/۰۰ ns	ریشه	روش در سطح	
۱/۵۸	۱/۳۳	۰/۴۴	۰/۶۰	۰/۳۳	۰/۶۷	۴/۶۷	۰/۱۰	خطای دوم		
۱/۷۷٪	۱/۶۴٪	۱/۰۸٪	۱/۳۴٪	۱/۱۲٪	۲/۰۰٪	۷/۰۳٪	۴/۶۷٪	ضریب تغییرات		

*: معنی دار در سطح ۵٪ ns: غیر معنی دار

جدول ۴- مقایسه میانگین‌های عرض و عمق توسعه ریشه گیاه ذرت

تیمار										پارامتر
۸۰ روزگی	۷۰ روزگی	۶۰ روزگی	۵۰ روزگی	۴۰ روزگی	۳۰ روزگی	۲۰ روزگی	۱۰ روزگی			
۷۳/۲۳a	۷۳/۰۰a	۶۴/۰۰a	۵۹/۸۳a	۵۴/۵۰a	۴۲/۶۷a	۲۶/۴۲a	۱۶/۶۷a	قطراهای سطحی		
۷۲/۸۳ a	۷۳/۳۳ a	۶۳/۹۲ a	۶۰/۸۳ a	۵۲/۵۰ a	۴۳/۰۰ a	۲۴/۷۵b	۱۴/۴۲b	قطراهای زیرسطحی		
۷۳/۶۷a	۷۳/۱۷a	۶۳/۷۵a	۶۰/۸۳a	۵۴/۵۰a	۴۲/۱۷a	۲۵/۷۵a	۱۵/۷۵a	۰/۵۰٪ نیاز کودی گیاه	(cm)	
۷۲/۵۰a	۷۳/۱۷a	۶۴/۱۷a	۵۹/۸۳ a	۵۲/۵۰a	۴۳/۵۰a	۲۵/۴۲a	۱۵/۳۳a	۱/۰۰٪ نیاز کودی گیاه		
۷۰/۶۷a	۷۰/۳۳a	۶۱/۰۸a	۵۸/۱۷a	۵۱/۸۳a	۴۱/۱۷a	۳۱/۳۳a	۷/۳۳a	قطراهای سطحی		
۷۱/۳۳ a	۷۰/۸۳ a	۶۱/۱۷ a	۵۸/۲۵ a	۵۰/۸۳ a	۴۰/۶۷ a	۳۰/۱۷a	۶/۵۰ a	قطراهای زیرسطحی		
۷۱/۳۳a	۷۱/۰۰a	۶۱/۰۰a	۵۸/۲۵a	۵۱/۶۷A	۴۱/۱۷a	۳۰/۱۷a	۷/۰۸a	۰/۵۰٪ نیاز کودی گیاه	(cm)	
۷۰/۶۷A	۷۰/۱۷a	۶۱/۲۵a	۵۸/۱۷a	۵۱/۰۰A	۴۰/۶۷a	۳۱/۳۳ a	۶/۷۵a	۱/۰۰٪ نیاز کودی گیاه		

*: در هر ستون برای هر صفت میانگین‌هایی که دارای حروف مشابه می‌باشند، اختلاف معنی دار ندارند (دانکن٪).


عمق ریشه در مدلها به ترتیب مربوط به مدل خطی، بورگ و گریمز و کراب وات است. این نتیجه با یافته‌های ابراهیمی‌زاده و حسن‌لی (۱) همخوانی دارد. نتایج روند توسعه عرض ریشه گیاه ذرت در این مطالعه، کاملاً مشابه نتایج عمق توسعه ریشه است (شکل ۳).

توزیع درصد وزن ریشه در خاک


شکل ۴ نشان می‌دهد که بیشترین تجمع وزن خشک ریشه در روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در عمق ۲۰-۴۰ سانتیمتری خاک اتفاق افتاده است. اما در روش آبیاری قطره‌ای سطحی تجمع وزن خشک ریشه‌ها در عمق ۰-۲۰ سانتیمتری خاک است. تجمع زیاد ریشه‌ها در لایه سطحی خاک در تحقیقات هرناندز و همکاران (۱۰) و رمو و دیاز (۱۹) نیز گزارش شده است.

به نظر می‌رسد این امر به دلیل نیاز بیشتر قسمت‌های زایشی گیاه به آب و مواد غذایی پس از مرحله تولید ابریشم باشد. این امر سبب انتقال بیشتر آب و مواد غذایی از ریشه قسمت‌های هوایی و اندام‌های زایشی گیاه گردیده است و نتیجه آن کاهش سرعت رشد ریشه‌ها بوده است. این کاهش در سرعت رشد پس از مرحله تولید ابریشم، توسط زیو و همکاران (۲۱) نیز گزارش شده است.


نتایج حاصله از مدل‌های مختلف برآورد عمق ریشه با معادله درجه دو بدست آمده از این مطالعه در شکل ۲ نشان می‌دهد که هر دو مدل خطی و کراب‌وات عرض ریشه گیاه ذرت را به میزان قابل توجهی بیشتر از مدل بورگ و گریمز و معادله درجه دو حاصله از این مطالعه تخمین می‌زنند. این در حالی است که مدل بورگ و گریمز هم برآورد دقیقی از عمق ریشه گیاه ذرت ندارد. به گونه‌ایکه در ابتدای دوره رشد عمق ریشه را کمتر و در انتهای دوره رشد بیشتر از مقدار واقعی ریشه تخمین می‌زند (شکل ۲). بیشترین دقت تخمین حرکت



شکل ۱- توسعه عمق ریشه در روزهای بعد از کشت



شکل ۳- توسعه عرض ریشه در روزهای بعد از کشت



شکل ۲- مقایسه مدل‌های برآورد عمق ریشه گیاه ذرت

ذرت تا مرحله ۲۰ روزگی از دوره رشد به طور معنی‌داری تحت تاثیر روش آبیاری قرار گرفت. اما بعد از مرحله ۳۰ روزگی عکس العمل معنی‌داری به روش آبیاری، کود نیتروژن و اثر متقابل آنها نشان نداد. بیشترین یکنواختی توزیع ریشه در لایه‌های خاک در روش زیرسطحی مشاهده شد. یکنواختی توزیع ریشه در ستونهای جانبی گیاه در هر دو روش تقریباً مشابه هم بودند. مدل برتر برای تخمین عمق توسعه ریشه در بین مدلها، مدل خطی است.


قدرتانی

بدینوسیله از زحمات بی‌شایسته جناب آقای مهندس صمد حسین‌زاده به دلیل همکاری صمیمانه ایشان در طی مراحل اجرای پروژه، تقدیر و تشکر می‌نمایم.

بر اساس شکل ۴ درصد وزن خشک ریشه‌ها در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی به طور یکنواختی در لایه‌های مورد مطالعه (۰-۲۰، ۲۰-۴۰ و ۴۰-۶۰ سانتیمتر) نسبت به آبیاری قطره‌ای سطحی توزیع شده است. کمترین میزان وزنی ریشه در هر دو روش مربوط به لایه سوم (۴۰-۶۰ سانتیمتر) است. این نتیجه با دستاوردهای ابراهیمی‌زاده و حسن‌لی (۱)، هرناندز و همکاران (۱۰) و مادسن (۱۴) مطابقت دارد. توزیع وزنی ریشه نسبت به محل استقرار گیاه (طرفین گیاه) در شکل ۵ آمده است. ریشه‌ها به صورت نسبتاً یکنواختی در ستونهای خاک طرفین گیاه توزیع شده‌اند، اما بیشترین تجمع ریشه در ستون میانی خاک در هر دو روش است. این یافته توسط هاکت (۹) نیز گزارش شده است.

نتیجه‌گیری


به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که توسعه عمق ریشه گیاه



شکل ۴- مقدار درصد وزن ریشه در نیمیرخ خاک در دو روش آبیاری قطره‌ای

آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

آبیاری قطره‌ای سطحی



شکل ۵- میزان درصد وزنی ریشه در ستونهای جانبی خاک

▼ محل استقرار گیاه ذرت

منابع

- ۱- ابراهیمی‌زاده م.ع.، و حسن‌لی ع.م.، ۱۳۸۷. بررسی توسعه ریشههای ذرت و تاثیر آن بر کاهش مصرف آب در روش‌های مختلف آبیاری با پسآب در

- دشت نیمه‌خشک کربال در استان فارس. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد ۴۴، صفحات ۸۲-۶۹.
- ۲- شیرانی ح، حاج عباسی م.ع، افیونی م. و همت ع. اثر سیستم‌های خاک‌ورزی و کود دامی بر مرغولوژی ریشه‌ذرت. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد ۲۳، شماره ۱، صفحات ۱۰۷ تا ۱۰۱.
- ۳- ضیائیان ع، و ملکوتی م.ج. ضرورت اعمال بهینه کود در راستای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت ذرت. نشریه فنی شماره ۲۰۲ ایران، موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران. صفحات ۲۱.
- ۴- علیزاده الف. رابطه آب و خاک و گیاه. چاپ ششم. انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد. صفحات ۴۷۲.
- 5- Barber S. A. 1984. Soil Nutrient Bioavailability A mechanistic approach. John Wiley and sons, New York, p. 114-134.
- 6- Barry D. A. J. and Miller M. H. 1986. Corn response to restricted nodal root growth with relevance to zero tillage, An. J. Soil Sci, 55(4): 689-699.
- 7- Ellis F. B. and Barnes. 1980. Growth and development of root system of winter cereals grown after different tillage methods including direct drilling, Plant Soil, 55: 283-288.
- 8- Follett R. F., Allmaras R. R. and Reichman G. A. 1978. Distribution of corn roots in study soil with a declining water table, Agron. J, 66: 288-292.
- 9- Hackett C. 1969. A study of the root system of barley, II. Relationship between root dimension and nutrient uptake. New Phytol. 68: 1023-1029.
- 10- Hernandez J. J. M., Bar-Yosef B. and Kafkafi U. 1990. Effect of surface and subsurface drip irrigation on sweet corn rooting, uptake, dry mater production and yield, Irrig. Sci, 12: 153-159.
- 11- Jodari-Karimi F. 1981. Root distribution of alfalfa (*Medicago Sativa L.*) as influenced by varying depths of irrigation. Dissertation, Mississippi State University.
- 12- Laboski C. A. M., Dowdy R. H., Allmars R. R. and Lamb J. A. 1998. Soil strength and water content influences on corn root distribution in a sandy soil. Plant and Soil, 203:239-247.
- 13- Lungley D. R. 1973. The growth of root system – a numerical computer simulation model, Plant Soil, 38: 145-151.
- 14- Madsen H. B. 1985. Distribution of spring barley roots in Danish soil of different texture and under different climatic conditions. Plant Soil, 88: 31-40.
- 15- Martin D. L., Stegman E. C. and Fereres E. 1990. Irrigation scheduling principle, p. 155-203. In J. Hoffman et al (Ed.) Management of farm irrigation systems. ASAE.
- 16- Nickel S. E., Kent Crookston R. and Russele M. P. 1995. Root growth and distribution are affected by corn soybean cropping sequence. Agron. J, 87: 895-902.
- 17- Panda R. K., Behera S. K. and Kashyap P. S. 2004. Effective management of irrigation water for maize under stressed conditions. Agric. Water Manag, 66: 181-203.
- 18- Pellerin S., and Tardieu F. 1999. Distribution of maize root system. Some results obtained for elaboration of the concept of the three dimensional model. Zesz. Probl. Postepow Nauk Roln. PP. 385-394.
- 19- Romo R. and Diaz D. H. 1985. Root system and nutritional status of peaches under drip or flood irrigation in warm climate, Acta Hortic, 173: 167-171.
- 20- Russel R. S. 1977. Plant root systems (the function and interaction with soil). McGraw-Hill. New York. London. p298.
- 21- Xue Q., Zhu Z., Musick J. T., Stewart B. A. and Dusek D. A. 2003. Root growth and water uptake in winter wheat under deficit irrigation. Plant and soil, 257: 151-161.

Evaluation of Maize Root Morphology under Fertigation Method with Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems

S. Esfandyari¹ - H. Dehghanisani² - A. Alizadeh³ - K. Davary⁴

Received: 06-04-2011

Accepted: 23-09-2012

Abstract

The present study was aimed to determine the effect of drip irrigation methods and nitrogen levels and their interaction on corn root development and study of the root movement model. For this purpose, a split plot field experiment based on randomized complete block with irrigation method in two levels (surface and subsurface drip) as main treatment and Nitrogen fertilization in two levels (50 and 100% of fertilizer requirement) as sub main treatment at 3 replications was conducted at Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Iran using corn variety 370 double-cross. Monitoring of root depth was performed by digging trenches and observation of soil profile. The samples were collected during the growing season with 10 day intervals (8 times totally) and root weight in different soil layers was measured by harvesting of soil monoliths and washing in plastic filters under water pressure. Results showed that the depth of root development up to 20 days after planting was significantly more in surface irrigation method compare to subsurface drip irrigation method; but it was not significant in 30 to 80 days after planting at 5% level. The depth of root development was not significantly different in different nitrogen levels in fertigation method at 5% level. Interaction of irrigation methods and nitrogen levels also didn't show significant effect on depth of root development at different corn stages growth at 5% level. Root width development was not significantly different in all treatments. The most root distribution observed at 20 to 40 cm and 0 to 20 cm of soil layer in subsurface drip irrigation and subsurface drip irrigation methods, respectively. The lowest root density was observed at 40 to 60 cm soil layer in both studied irrigation methods. Also the roots were more uniformly distributed in soil in subsurface drip irrigation method compare to surface drip irrigation method. The most accurate root depth estimation was achieved by the linear, Borg & Grims and Cropwat models, respectively.

Keywords: Root development model, Surface drip, Subsurface drip, Fertigation, Corn

1,3,4- PhD Student of Irrigation and Drainage, Professor and Associate Professor, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, respectively

(* - Corresponding Author E-mail: esfandiari_samad@yahoo.com)

2-Assistant Professor of Agricultural Engineering Research Institute, karaj