

Investigation of the Effect of Biochar on the Physical and Chemical Properties of Soil under Quinoa Cultivation under Water and Salinity Stress Conditions

O. Tourajzadeh¹, H. Piri^{2*}, A. Naserin³, M.M. Chari²

1 and 2- Ph.D. Graduate and Assosiat Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Water and Soil, University of Zabol, Zabol, Iran, respectively.

(*- Corresponding Author Email: H_piri2880@uoz.ac.ir)

3- Assistant Professor, Department of Water Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Khuzestan, Mollasani, Iran

Received: 10-08-2023
Revised: 18-12-2023
Accepted: 15-01-2024
Available Online: 15-01-2024

How to cite this article:

Tourajzadeh, O., Piri, H., Naserin, A., & Chari, M.M. (2024). Investigation of the effect of biochar on the physical and chemical properties of soil under quinoa cultivation under water and salinity stress conditions. *Journal of Water and Soil*, 38(1), 69-85. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22067/jsw.2024.83859.1322>

Introduction

Appropriate and practical use of agricultural waste reduce the pressure on the environment. Recently, there has been significant promotion of biochar utilization in agricultural lands. It serves as a valuable source of organic material for enhancing plant growth and as an effective soil amendment to improve soil properties. Due to its unique chemical and physical properties, biochar can be used as a soil conditioner and has many benefits for optimal agricultural and environmental management. Studies have shown that biochar is a useful amendment for improving the physical and chemical properties of soil and effective in maintaining organic matter and soil moisture.

Materials and Methods

This research was conducted with the aim of investigating the effects of biochar on the physical and chemical properties of soil under conditions of water stress and irrigation using saline water. The experiment was carried out in a factorial based on a completely randomized design with three replications in greenhouse conditions. The treatments include three irrigation water treatments (60, 80, and 100 percent water requirement of the plant, respectively, I1, I2, and I3), three treatments of biochar prepared from northern forest trees at a temperature of 300 degrees Celsius (0, 2, and 4 percent by weight of potting soil, respectively, B1, B2, and B3) and three water quality treatments (with electrical conductivity 1, 4 and 7 dS/m, respectively, S1, S2 and S3). The pots were weighed every other day and at each level of biochar and salinity, the water deficit up to the agricultural moisture level was calculated based on the changes in the pot's weight. After harvesting (in the first half of April 2022), in order to investigate the effect of biochar on the amount of soil nutrients and some physical and chemical parameters of the soil under the conditions of water stress and irrigation water salinity, sampling was done from the soil of each pot. The samples were taken to the laboratory and parameters of apparent and actual specific gravity, acidity and salinity of the soil, percentage of nitrogen, phosphorus and potassium absorbable of the soil were measured in the laboratory. Referring to the yield to irrigation water ratio, water productivity is obtained by the following relation (Payero et al., 2009): $WP=Y/IR$, where, WP represents water productivity (kg/m^3), Y denotes the yield (kg/ha), and IR shows the amount of irrigation water (m^3/ha). Analysis of variance for the results obtained from different



©2024 The author(s). This is an open access article distributed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

<https://doi.org/10.22067/jsw.2024.83859.1322>

treatments was conducted using SAS software (SAS 9.1, SAS Institute, Cary, NC, USA). The mean values of the main factors and interactive effects were compared using the Duncan method at the 1% and 5% levels of significance.

Results and Discussion

The results showed that the amount of biochar, irrigation water and water salinity and their mutual effects had a significant effect on the measured parameters at the probability level of one and five percent. Adding 2 and 4 mass percent biochar to the soil increased the amount of phosphorus (35 and 60%, respectively), potassium (57% and 61%), nitrogen (83% and 91%), pH (13% and 13%) and electrical conductivity (EC) (13% and 57%) of the soil. By adding 2% and 4% of biochar to the soil, the actual specific gravity of the soil decreased by 13% and 21%, respectively, and the apparent specific gravity decreased by 11% and 22%, respectively. The actual and apparent specific gravity of the soil decreased by adding biochar to the soil. Decreasing the depth of irrigation water and increasing water salinity increased the amount of phosphorus, potassium, nitrogen, pH and EC of the soil. The amount of irrigation water had no significant effect on the apparent and actual specific gravity, however, the salinity of the irrigation water caused a significant increase in the apparent and actual specific gravity of the soil. Although the addition of biochar to the soil increased the nutrients required by plants in the soil, high amounts of biochar in the soil should be used careful, because the addition of this organic matter to the soil at high levels increased soil EC significantly. Based on the findings derived from the research, the utilization of biochar is recommended as a viable approach for enhancing both the chemical quality and productivity of nutrient-poor and sandy soils.

Keywords: Apparent specific gravity, Electrical conductivity, Nitrogen, Phosphorus, Potassium

مقاله پژوهشی

جلد ۳۸، شماره ۱، فروردین-اردیبهشت ۱۴۰۳، ص. ۸۵-۶۹

بررسی تأثیر بیوجار بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش آبی و شوری

ام البنین توراجزاده^۱ - حلیمه پیری^{۲*} - امیر ناصرین^۳ - محمد مهدی چاری^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۵/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

چکیده

استفاده مناسب و کاربردی از ضایعات کشاورزی موجب کاهش فشار بر محیط‌زیست خواهد شد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات بیوجار در شرایط تنش آبی و شوری آب آبیاری بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شد. آزمایش در شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل آب آبیاری (۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه به ترتیب، I₁، I₂ و I₃)، بیوجار تهیه شده از درختان جنگلی شمال در دمای ۳۰ درجه سلسیوس (صفر، ۲ و ۴ درصد جرمی خاک گلدان به ترتیب B1، B2 و B3) و کیفیت آب (با قابلیت هدایت الکتریکی ۱، ۴ و ۷ دسی‌زیمنس بر متر به ترتیب S1، S2 و S3) بود. گلدان‌ها به صورت یک روز در میان توزین شده و کمبود آب تا حد رطوبت زراعی براساس تغییرات جرم گلدان محاسبه شد. بعد از پایان فصل کشت کینوا (برداشت نیمه اول فروردین ۱۴۰۱)، برای بررسی اثر بیوجار بر میزان عناصر غذایی خاک و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط تنش آبی و شوری آب آبیاری، نمونه‌برداری از خاک هر گلدان انجام شد. نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل و ویژگی‌های جرم مخصوص ظاهری و حقیقی، pH و شوری خاک، درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل جذب در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد مقدار بیوجار، آب آبیاری و شوری آب و اثرات متقابل آن‌ها در سطح احتمال یک و پنج درصد بر ویژگی‌های اندازه‌گیری شده تأثیر معنی‌داری داشت. افزودن ۲ و ۴ درصد جرمی بیوجار به خاک سبب افزایش مقدار فسفر (به ترتیب ۳۵ و ۶۰ درصد)، پتاسیم (۵۷ و ۶۱ درصد)، نیتروژن (۸۳ و ۹۱ درصد)، pH (۱۳ و ۱۳ درصد) و قابلیت هدایت الکتریکی خاک (EC) (۱۳ و ۵۷ درصد) شد. جرم مخصوص حقیقی خاک با افزودن ۲ و ۴ درصد جرمی بیوجار به خاک به ترتیب ۱۳ و ۲۱ درصد و جرم مخصوص ظاهری به ترتیب ۱۱ و ۲۲ درصد کاهش یافت. کاهش عمق آب آبیاری و افزایش شوری آب باعث افزایش مقدار فسفر، پتاسیم، نیتروژن، pH و EC خاک شد. مقدار آب آبیاری تأثیر معنی‌داری بر جرم مخصوص ظاهری و حقیقی نداشت اما شوری آب آبیاری سبب افزایش معنی‌دار جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک شد. اگر چه افزایش بیوجار به خاک باعث افزایش عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک شد اما با توجه به این که افزودن این ماده آلی به خاک در سطوح زیاد سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک می‌شود لذا استفاده از مقادیر زیاد بیوجار در خاک باید با احتیاط انجام شود.

واژه‌های کلیدی: پتاسیم، جرم مخصوص ظاهری، فسفر، قابلیت هدایت الکتریکی، نیتروژن

مقدمه

تن غذا و محصولات کشاورزی مورد نیاز است (Bhupindar, 2014)، اما بر اثر عواملی همچون تغییرات آب و هوا، محدود شدن منابع آب و خاک و افزایش آلودگی محیط‌زیست مشکلاتی در کشاورزی و تولید مواد غذایی کافی به وجود می‌آید. در شرایط تنش خشکی و شوری، جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه محدود می‌شود (Waraich et

با افزایش جمعیت جهان، نیاز به غذا و تولیدات کشاورزی به شدت در حال افزایش است به طوری که سازمان خوار و بار جهانی پیش‌بینی کرده است با افزایش جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰، سالانه ۲۰۰ میلیون

۱ و ۲- به ترتیب دانش‌آموخته دکتری و دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران
* - نویسنده مسئول: (Email: H_piri2880@uoz.ac.ir)

۳- استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ملاتانی، اهواز، ایران

غذایی، سبب افزایش بهبود بهره‌وری کودها شده و با بهبود ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و کاهش مقاومت کششی خاک، موجب نفوذ و رشد بهتر ریشه گیاه می‌شود (Knowles et al., 2011). نجفی قیری (Najafi Ghairi, 2014) تأثیر کاربرد بیوپچار را بر ویژگی‌های خاک و قابلیت جذب عناصر غذایی مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش نشان داد مصرف بیوپچار سبب افزایش معنی‌دار ماده آلی و قابلیت هدایت الکتریکی و پتاسیم محلول و تبدلی شد در حالی که قابلیت دسترسی نیتروژن، فسفر، روی و مس تحت تأثیر مصرف بیوپچار قرار نگرفت. نتایج مطالعه دیوبند هفشجانی و همکاران (Deoband Hafeshjani et al., 2016) نشان داد افزودن بیوپچار باگاس نیشکر تهیه شده در ۳۰۰ درجه سلسیوس و در سطوح ۰/۲، ۰/۵ و ۱ درصد جرمی، سبب افزایش معنی‌دار کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل آنیونی، قابلیت هدایت الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک شد.

منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطق مهم و استراتژیک استان است. کمبود آب در دشت سیستان، یک مسئله جدی و دارای اهمیت است. تنها منبع آب منطقه، رودخانه هیرمند است که از کوه‌های بابا یغمای افغانستان سرچشمه می‌گیرد و بحران آب منطقه، ناشی از کمبود آب در این رودخانه است به گونه‌ای که عدم تأمین آب هیرمند منجر به نابودی کشاورزی منطقه گردیده است. در این منطقه اراضی زیادی وجود دارد که قابل زرع می‌باشد اما به دلیل کمبود منابع آب به صورت بایر رها شده‌اند. بنابراین باید دنبال راهکاری بود که با حفظ شرایط پایدار در منابع آب و خاک منطقه از لحاظ اقتصادی موجب توسعه کشاورزی شود. تدوین برنامه آبیاری و اعمال مدیریت صحیح آبیاری در این منطقه می‌تواند از زیان‌های ناشی از کمبود منابع آب در منطقه بکاهد. برخی از کشاورزان منطقه برای آبیاری اراضی کشاورزی از چاهک‌های سطحی که در مزارع آن‌ها حفر شده است، استفاده می‌کنند. آب این چاهک‌ها معمولاً از نظر کیفی نامطلوب و شور می‌باشد. استفاده از این آب‌ها سبب کاهش عملکرد گیاهان و در نهایت شوری خاک می‌شود. از طرف دیگر درصد ماده آلی و عناصر غذایی در خاک اراضی سیستان کم می‌باشد. استفاده از بیوپچار به عنوان منبع تأمین کننده ماده آلی برای تأمین مواد غذایی گیاهان و همچنین اصلاح خاک در این منطقه می‌تواند مفید باشد. لذا هدف از این پژوهش بررسی و تعیین سطوح مناسب کاربرد بیوپچار برای خاک‌های اراضی دشت سیستان در شرایط کم‌آبی و شوری آب آبیاری می‌باشد.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه دشت سیستان بود. این منطقه در محدوده طول جغرافیایی ۶۱ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۶۱ درجه و ۴۹ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۵۵ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۰ دقیقه شمالی واقع

al., 2013). بنابراین در این شرایط خاک باید بستر مناسبی را برای تأمین نیازهای گیاه به عنوان محیط رشد و نمو فراهم کند. کاربرد کودهای آلی، زیستی و همچنین مواد معدنی طبیعی می‌تواند موجب اصلاح ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک شوند (Dabhi et al., 2013). عدم مدیریت صحیح خاک موجب شده است تا خاک به تدریج کیفیت و حاصل‌خیزی خود را از دست داده و به خاک نامرغوب تبدیل شود. بنابراین استفاده از اصلاح‌کننده‌هایی که بتواند این شرایط را بهبود بخشد و از تخریب خاک جلوگیری کند، امری ضروری می‌باشد. مصرف صحیح و مناسب انواع اصلاح‌کننده‌ها مهمترین راه حفظ و اصلاح شرایط حاصل‌خیزی خاک و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی می‌باشد (Karmaka et al., 2007). افزودن اصلاح‌کننده های آلی به خاک در شرایط کمبود آب بسیار مؤثر هستند (Hirich et al., 2013). اخیراً استفاده از بیوپچار در زمین‌های کشاورزی به عنوان منبع تأمین کننده مواد آلی برای رشد گیاه و اصلاح کننده‌ای برای بهبود ویژگی‌های خاک رونق زیادی یافته است (Domene et al., 2014). بیوپچار به دلیل ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی منحصر به فرد خود، می‌تواند به عنوان اصلاح‌کننده خاک مورد استفاده قرار گرفته و فواید بسیاری برای مدیریت بهینه کشاورزی و محیط‌زیست داشته باشد. بیوپچار ماده جامد سیاه‌رنگ غنی از کربن پایدار می‌باشد که در نتیجه سوزاندن مواد آلی در شرایط بدون اکسیژن و یا اکسیژن کم، در دمای کمتر از 700 درجه سلسیوس تولید می‌شود (Lehmann & Joseph, 2009). مطالعات نشان داده است که بیوپچار یک ماده اصلاح‌کننده مفید برای بهبود ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، مؤثر در حفظ ماده آلی و رطوبت خاک می‌باشد (Van Zwieten et al., 2013). بیوپچار ویژگی‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر بیوپچار بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک توسط محققان مختلف طی دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص شده است که افزودن بیوپچار به خاک کیفیت آن را تغییر می‌دهد و اغلب سبب افزایش و بهبود کیفیت خاک می‌شود (Lehmann & Joseph, 2009).

با توجه به پایداری بیوپچار در مقابل تجزیه میکروبی و زمان ماندگاری طولانی آن در خاک، مصرف بیوپچار سبب افزایش سطح مواد آلی خاک به مدت طولانی و در نتیجه بهبود ویژگی‌های خاک، مخصوصاً در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌شود. همچنین، افزودن بیوپچار به عنوان یک ماده اصلاحی به خاک موجب افزایش بازه‌های تبدلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و قابلیت دسترسی عناصر غذایی، کاهش جرم مخصوص ظاهری و بهبود ظرفیت نگهداری آب می‌شود (Liang et al., 2006). بیوپچار به دلیل سطح ویژه زیاد و تراکم بار سطحی بالا، توانایی خاک برای نگهداری عناصر غذایی و آب قابل استفاده گیاه را افزایش و شستشوی عناصر غذایی و کودها را کاهش می‌دهد (Laird et al., 2010). بیوپچار با کاهش آبشویی عناصر

ترتیب B1، B2 و B3) بود. انتخاب سطوح شوری آب آبیاری براساس وجود چاهک‌های آب شور در منطقه مورد مطالعه بود که کشاورزان منطقه از آب این چاهک‌ها برای کشاورزی استفاده می‌کنند. مقادیر بیوپچار نیز براساس مطالعات انجام شده توسط محققین در منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است (Mir et al., 2021). گلدان‌های مورد استفاده در تحقیق گلدان پلاستیکی با قطر و ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر بود. گلدان‌ها با ۵ کیلو خاک عبور داده شده از الک ۲ میلی‌متری و سطوح مختلف بیوپچار پر شد. ابتدا گلدان‌ها به صورت کامل اشباع شد. روی گلدان‌ها برای جلوگیری از تبخیر آب پوشانده شد. جرم گلدان بعد از زمانی که آب ثقلی از انتهای گلدان خارج شد، اندازه‌گیری و به‌عنوان جرم در حالت ظرفیت زراعی در نظر گرفته شد (Mir et al., 2021). در هر گلدان تعداد هشت عدد بذر کینوا رقم Titicaca در نیمه دوم آبان ۱۴۰۰ در عمق ۲ سانتی‌متری از سطح خاک کاشته شد. پس از استقرار گیاه در مرحله چهاربرگی به سه گیاه در گلدان تقلیل یافت. از زمان کاشت تا زمان استقرار گیاهچه، تمام گلدان‌ها به صورت کامل و با آب شیرین و تا حد ظرفیت زراعی آبیاری شد. سپس تیمارهای شوری و کم‌آبایی اعمال شد. گلدان‌ها به صورت یک روز در میان توزین شده و در هر سطح بیوپچار و شوری، کمبود آب تا حد رطوبت براساس تغییرات جرم گلدان محاسبه شد و سپس براساس سطح تیمار آبیاری، آبیاری انجام شد.

شده است. این منطقه با اقلیم گرم و خشک دارای متوسط بارندگی سالیانه منطقه ۵۵ میلی‌متر و میزان تبخیر سالیانه ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میلی‌متر و ارتفاع از سطح دریا ۴۸۹/۲ متر می‌باشد. غالب بافت خاک منطقه لوم شن می‌باشد (Negaresh & Latifi, 2018). ابتدا، خاک با بافت لوم شنی از اعماق ۰ تا ۳۰ سانتی‌متری خاک منطقه تهیه شده، هوا خشک شده و سپس از الک ۲ میلی‌متر عبور داده شد. همچنین از آب مورد استفاده نیز جهت تعیین کیفیت آن نمونه‌برداری شد. بیوپچار مورد استفاده در تحقیق از شرکت کربن اکتیو بشل واقع در قائمشهر مازندران خریداری شد. شرکت مورد نظر برای تهیه بیوپچار از شاخ و برگ خشک شده درختان جنگلی استان مازندران استفاده کرده است. ابتدا شاخ و برگ‌های خشک شده بسته‌بندی شده و سپس در دمای ۳۰۰ درجه سلسیوس و در شرایط بدون اکسیژن حرارت داده شده است. نتایج تجزیه آب و خاک و بیوپچار مورد استفاده در جدول ۱ آورده شده است. برای اندازه‌گیری pH و هدایت الکتریکی بیوپچار از نسبت یک به ۱۰ بیوپچار با آب مقطر استفاده شد (Guvili et al., 2016).

پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی و به روش فاکتوریل و به صورت گلدانی با سه تکرار در آبان ماه ۱۴۰۰ در گلخانه در شهر بنجار با موقعیت جغرافیایی ۶۱ درجه و ۲۹ دقیقه طول شرقی و ۳۱ درجه و یک دقیقه عرض شمالی اجرا شد. فاکتورها شامل آب آبیاری در سه سطح (۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد مقدار آب آبیاری به ترتیب، I₁، I₂ و I₃)، سه سطح شوری آب آبیاری (۱، ۴ و ۷ دسی‌زیمنس بر متر به ترتیب S₁، S₂ و S₃) و سه سطح بیوپچار (۰، ۲ و ۴ درصد جرمی خاک گلدان به

جدول ۱- برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، آب و بیوپچار

Table 1- Some physical and chemical characteristics of soil, water and biochar

ویژگی‌های اندازه‌گیری شده Measured characteristics	روش اندازه‌گیری Measured method	بیوپچار Biochar	آب Water			خاک Soil
			S3	S2	S1	
pH	عصاره‌گیری گل اشباع و pH متر و EC سنج	7.3	7.12	7.42	7.81	8.30
قابلیت هدایت الکتریکی EC (dS/m)	Saturated paste extraction and, pH and EC meter	6.1	7	4	1	0.6
کربن آلی Organic carbon (%)	به روش والکی بلک (۱۹۳۴) Walkly Black (1934) method	57.50	-	-	-	1.36
فسفر Phosphorus (mg/kg)	به روش اولسن (اولسن و سومر، ۱۹۹۰) Olsen method (Olsen and Sommer, 1990)	398.65	0.39	0.34	0.26	10.45
پتاسیم Potassium (mg/kg)	عصاره‌گیری گل اشباع و روش وستمن (۱۹۹۰) Saturated paste extraction and Westman method (1990)	2375.48	0.74	0.65	0.41	110.63
کلسیم محلول Dissolved calcium (meq/L)	عصاره‌گیری گل اشباع و دستگاه فلیم فتومتر (پیچ، ۱۹۸۲)	17.5	14.64	8.25	2.05	0.42
منیزیم محلول Dissolved magnesium (meq/L)	Saturated paste extraction and flame photometer spectroscopy (Page, 1982)	11.60	10.16	5.74	2.95	0.75
سدیم محلول Dissolved sodium (meq/L)		3.70	18.95	9.87	4.20	0.63
نیتروژن Nitrogen (%)	به روش کج‌دال (برنر، ۱۹۹۶) Kjeldahl method (Bremner, 1996)	19.50	-	-	-	0.02

نتایج تجزیه واریانس برخی ویژگی‌های اندازه‌گیری شده خاک در جدول ۲ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌گردد اثر مقدار آب آبیاری، شوری و بیوپچار و اثرات متقابل آن‌ها بر ویژگی‌ها در سطح احتمال یک و یا پنج درصد معنی‌دار بوده است. جدول ۳ تا ۶ مقایسه میانگین اثرات ساده و متقابل ویژگی‌های اندازه‌گیری شده را نشان می‌دهند. بیوپچار ویژگی‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر بیوپچار بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک توسط محققان مختلف طی دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص شده که افزودن بیوپچار به خاک کیفیت آن را تغییر می‌دهد و اغلب بهبود کیفیت خاک را به همراه دارد (Lehmann & Joseph, 2009).

عملکرد: مطابق جدول ۳ کاهش عمق آب آبیاری باعث کاهش ۱۱/۹ و ۲۸/۹۶ درصدی عملکرد دانه شد اما این کاهش بین تیمار I3 و I2 معنی‌دار نبود. افزایش تنش آبی منجر به کوچک شدن سطح برگ، کاهش شاخص سطح برگ، کاهش وزن سنبله و کوچک شدن دانه و به دنبال آن کاهش عملکرد دانه شد.

بعد از پایان فصل کشت (برداشت نیمه اول فروردین ۱۴۰۱)، برای بررسی اثر بیوپچار بر میزان عناصر غذایی قابل جذب خاک و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط تنش آبی و شوری آب آبیاری، نمونه‌برداری از خاک هر گلدان انجام شد. نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شد. ویژگی‌های جرم مخصوص ظاهری و حقیقی، اسیدبته و شوری خاک، درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. فسفر قابل جذب خاک به روش اولسن (Olsen & Sommers, 1990) و پتاسیم قابل استفاده به وسیله اسات آمونیوم عصاره‌گیری شد (Westeman, 1990). غلظت فسفر و پتاسیم به ترتیب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و فلیم فتومتر تعیین شد. درصد نیتروژن کل به روش کجلدال اندازه‌گیری شد (Bremner, 1996). تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SAS و مقایسه میانگین‌ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام شد. با توجه به این که تحقیق حاضر بعد از کشت کینوا بوده است برای بررسی بهتر نتایج، تأثیر تیمارها بر عملکرد کینوا نیز در جدول ۲ تا ۶ آورده شده است.

نتایج و بحث

جدول ۲- نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات و درجه آزادی) و ویژگی‌های خاک و عملکرد محصول

Table 2- Results of analysis of variance (mean square and degree of freedom) of soil property and crop yield

منابع تغییرات MS	درجه آزادی DF	جرم مخصوص ظاهری Bulk density	جرم مخصوص حقیقی Actual density	اسیدبته pH	قابلیت هدایت الکتریکی EC	نیتروژن Nitrogen	پتاسیم Potassium	فسفر Phosphorus	عملکرد Yield
بیوپچار (B) Biochar	2	0.002*	0.106*	0.056**	39.69**	0.005**	6345.52**	8.42**	1151.43**
مقدار آب آبیاری (I) irrigation	2	0.000 ns	0.828 ns	0.02*	11.98*	0.002*	5716.69**	11.35*	291.82**
شوری آب آبیاری Salinity of irrigation Water (S)	2	0.003*	1.187*	0.002*	27.179**	0.004**	3825.32**	10.26*	625.84**
I*B	4	0.014ns	3.226ns	0.03*	4.466*	0.003*	3196.27*	9.78*	48.14*
I*S	4	0.002*	0.589*	0.013*	1.751*	0.006**	2873.49*	5.62*	16.42*
B*S	4	0.004*	1.153*	0.018*	11.078*	0.003**	2597.55*	8.54*	85.29**
I*B*S	8	0.002 ns	2.194 ns	0.023*	23.543**	0.002*	2358.41*	6.39*	124.69**
خطا Error	12	0.003	0.965	0.008	5.136	0.001	19.41	1.32	12.18
ضریب تغییرات Coefficient of variation (CV)	-	10.549	22.668	1.280	19.283	20.510	14.26	16.27	

* و ** معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد، ns عدم معنی‌داری.

* and ** significance at the probability level of five percent and one percent, ns non-significance.

تیمار I1B3 کمترین (۵۴۰/۱۲) کیلوگرم در هکتار) مقدار عملکرد دانه را داشت. می‌توان بیان داشت استفاده از بیوپچار با به‌کار بردن آب آبیاری مناسب، باعث فراهم شدن آب و مواد غذایی و در نتیجه رشد بهینه گیاه گردیده است. ابراهیم و همکاران (Ibrahim et al., 2015) به افزایش بیشتر عملکرد کاه و کلش در تیمارهای حاوی بیوپچار و آبیاری براساس ۸۰ درصد نیاز آبی گیاه در مقایسه با تیمارهای بدون بیوپچار و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه اشاره کردند که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. در تحقیق حاضر نیز عملکرد دانه (۱۱۸۶/۶۱) کیلوگرم در هکتار) در تیمار I2B2 (۸۰ درصد نیاز آبی گیاه و استفاده ۲ درصد وزنی بیوپچار) بیشتر از عملکرد دانه (۹۸۶/۲۷) کیلوگرم در هکتار) در تیمار I3B1 (۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم استفاده از بیوپچار) بود. اثر متقابل آب آبیاری و شوری (جدول ۶) نشان داد با افزایش شوری آب آبیاری و کاهش عمق آب مصرفی عملکرد دانه کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه (۱۳۳۴/۵۷) کیلوگرم در هکتار) از تیمار I3S1 مشاهده شد. تیمار I2S1 با مقدار (۱۳۲۶/۸۵) کیلوگرم در هکتار در رتبه بعدی قرار گرفت که تفاوت معنی‌دار با تیمار I3S1 نداشت. در تنش‌های آبی بالا استفاده از آب با کیفیت پایین باعث کاهش شدیدتر عملکرد شد. یکی از دلایل کاهش عملکرد را می‌توان به کاهش فتوسنتز در نتیجه تنش حاصل از تجمع نمک در محدوده ریشه نسبت داد که این مسأله می‌تواند در نتیجه کاهش ورود دی‌اکسیدکربن به دلیل کاهش هدایت روزنه و همچنین کاهش سطح برگ باشد (Netondo et al., 2004). از سوی دیگر، افزایش پتانسیل اسمزی در نتیجه‌ی حضور نمک در محدوده ریشه و کاهش آن در سلول‌های گیاهی، موجب تغییر در مسیر انتقال فرآورده‌های فتوسنتزی و تجمع آن در سلول‌های ریشه برای مقابله با تنش حاصله خواهد شد. به‌عبارت دیگر، کاهش انرژی آزاد آب در خاک گیاه را وادار خواهد کرد تا برای جذب آب انرژی بیشتری صرف کند که این امر مستلزم افزایش پتانسیل اسمزی در سلول‌های گیاهی با تجمع مواد قندی در آن است. تجمع مواد آلی ساخته شده در سلول‌های ریشه به منظور تنظیم اسمزی و مقابله با اثرات مخرب شوری در جذب آب، انتقال آن به سایر اندام‌های هوایی و متعاقباً رشد رویشی را محدود ساخته و در نهایت منتج به کاهش عملکرد خواهد شد (Piri et al., 2022). اثر متقابل بیوپچار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد با کاربرد آب شور (تیمار S2 و S3) و افزایش بیوپچار مصرفی عملکرد دانه کاهش یافت. تیمار B2S1 (آب غیرشور و ۲ درصد وزنی بیوپچار) عملکرد دانه (۱۳۰۲/۵۳) کیلوگرم در هکتار) بالاتری نسبت به تیمار B1S1 (آب غیرشور و عدم مصرف بیوپچار) داشت. بنابراین می‌توان گفت در شرایط استفاده از آب شیرین بیوپچار می‌تواند عملکرد دانه را افزایش دهد. در شرایط استفاده از آب شور با شوری S2 و S3 عملکرد دانه در تیمارهای عدم استفاده بیوپچار (تیمارهای B1S2 و B1S3) بیشتر از تیمار ۲ و ۴ درصد وزنی بیوپچار بود اما از این نظر با عملکرد دانه تیمارهایی که ۲ درصد وزنی بیوپچار داشتند (تیمارهای B2S2 و B2S3) تفاوت معنی‌دار

گزارشات مختلف بیانگر کاهش عملکرد دانه با افزایش تنش خشکی می‌باشد (Telahigue et al., 2017; Elewa et al., 2017). اولین نشانه تنش خشکی در گیاهان کاهش فشار تورگور و در ادامه کاهش رشد سلول‌ها می‌باشد. کاهش رشد سلول منجر به کاهش ارتفاع گیاه و کاهش تولید ماده خشک می‌شود. با کاهش رشد سلول، رشد برگ، میزان جذب نور خورشید، فتوسنتز و تولید ماده خشک کاهش می‌یابد (Mohkami et al., 2022). کاربرد ۲ درصد وزنی بیوپچار عملکرد دانه را افزایش داد. استفاده بیشتر بیوپچار (تیمار B3) عملکرد دانه را افزایش داد اما با تیمار عدم مصرف بیوپچار تأثیر معنی‌دار نداشت که به دلیل افزایش شوری حاصل از کاربرد مقادیر زیاد بیوپچار می‌باشد. نتایج بررسی تأثیر بیوپچار بر شوری خاک که در ادامه به آن پرداخته شده است، مؤید این موضوع است. سان و همکاران (Sun et al., 2019) هفت سطح بیوپچار را بر روی گیاه گندم مورد ارزیابی قرار دادند. نتیجه مطالعه آن‌ها نشان داد کاربرد ۵ تا ۲۰ تن در هکتار بیوپچار باعث افزایش عملکرد گندم شد اما کاربرد بیشتر از آن موجب کاهش عملکرد گندم شد (Sun et al., 2019). محققین بیان داشتند افزایش عملکرد در اثر کاربرد بیوپچار در خاک می‌تواند به دلیل اثرات مستقیم (عناصر غذایی موجود در زیست‌توده که طی فرایند تجزیه حرارتی به بیوپچار تبدیل شده) و غیرمستقیم (بهبود ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک) آن باشد (Major et al., 2010). تیمار B2 با ۱۳۸۶/۴۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار B1 با ۹۶۷/۸۶ کیلوگرم در هکتار کمترین مقادیر عملکرد دانه را داشتند. جرم مخصوص ظاهری کم، تخلخل زیاد، ظرفیت تبادل کاتیونی بالا و ظرفیت نگهداری رطوبت قابل ملاحظه‌ی بیوپچار باعث افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و حاصلخیزی خاک، افزایش رشد گیاه و عملکرد می‌شود (Fathi & Mirseyed, 2015). محکمی و همکاران (Mohkami et al., 2022) به نتایج مشابهی دست یافتند و بیان کردند استفاده از بیوپچار باعث افزایش عملکرد کینوا در شرایط تنش خشکی شد. شوری آب آبیاری باعث کاهش معنی‌دار مقدار عملکرد دانه شد (جدول ۳). آب با کیفیت ۴ دسی‌زیمنس بر متر (تیمار S2) منجر به کاهش ۱۴/۱ درصدی عملکرد دانه شد اما با تیمار S1 تفاوت معنی‌دار نداشت. بنابراین می‌توان گفت کینوا از نظر تحمل شوری آب آبیاری گیاهی نسبتاً مقاوم می‌باشد. تنش شوری باعث افزایش فشار اسمزی، اختلال در جذب آب توسط ریشه، کاهش فتوسنتز گیاه، کاهش مواد فتوسنتزی و در نتیجه کاهش عملکرد دانه می‌شود. القصبی و همکاران (Algoziabi et al., 2015) نشان دادند در شوری‌های بالای ۴ دسی‌زیمنس بر متر عملکرد دانه کینوا کاهش یافت. اثرات متقابل آب آبیاری و بیوپچار (جدول ۴) نشان داد در تمام سطوح آب آبیاری با افزایش مصرف بیوپچار تا ۲ درصد وزنی عملکرد دانه افزایش یافت. افزایش بیشتر بیوپچار (تیمار ۴ درصد وزنی) باعث کاهش عملکرد دانه شد. در سطوح تنش آبی شدید تیمار عدم مصرف بیوپچار (B1) عملکرد دانه بیشتری نسبت به تیمار ۴ درصد وزنی بیوپچار (B3) داشت.

نداشت.

فسفر: مطابق **جدول ۳** اثرات مقدار بیوجار بر قابلیت استفاده فسفر در خاک در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. با کاربرد بیوجار مقدار فسفر قابل جذب افزایش یافت. بیشترین مقدار فسفر (۲۴/۸۴ میلی گرم در کیلوگرم خاک) در تیمار مصرف ۴ درصد جرمی بیوجار به دست آمد. مصرف ۲ درصد جرمی بیوجار با مصرف ۴ درصد جرمی تفاوت معنی دار با هم نداشتند. افزایش فسفر قابل جذب در تیمارهای حاوی بیوجار می تواند به دلیل تجزیه بیوجار و تشکیل کمپلکس های آلی قویتری با کلسیم، آهن و آلومینیوم در مقایسه با فسفر ایجاد کنند و موجب کاهش سرعت رسوب فسفر تغییر شکل آن شوند. به علاوه، ایجاد پوشش محافظ در سطح ذرات توسط هوموس ظرفیت تثبیت فسفر این ذرات را کاهش می دهد (Kang et al., 2008). بیوجار می تواند قابلیت استفاده فسفر را از طریق جذب سطحی و افزایش ظرفیت تبادل آنیونی خاک، افزایش دهد (Chintala et al., 2014) و از طرفی بیوجار به دلیل اندوخته زیاد فسفر، به طور مستقیم نیز فسفر آزاد می کند و سبب افزایش فسفر خاک می شود (Zahoor et al., 2017). شیرمردی و توفیقی (Shirmardi & Tofighi, 2014) بیان کردند افزودن ماده آلی به خاک موجب افزایش بازایی فسفر اضافه شده به خاک می شود. حسن پور و همکاران (Hasanpour et al., 2022) بیان کردند اضافه کردن بیوجار در خاک های لوم شنی سبب افزایش معنی دار فسفر قابل جذب خاک نسبت به تیمار شاهد شد که به دلیل وجود ذخیره فسفر در بیوجار کاربردی است. فروهر و همکاران (Ferohar et al., 2017) در تحقیق خود بیان داشتند استفاده از بیوجار کود گاوی در خاک های آهکی مقدار فسفر خاک را از ۶/۴ میلی گرم در کیلوگرم خاک به مقدار ۴۰/۷ میلی گرم در کیلوگرم خاک افزایش داد و علت آن را بالا بودن مقدار فسفر موجود در بیوجار کود گاوی (۸۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک) بیان کردند. ثقفی و همکاران (Thaghafi et al., 2021) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که افزودن بیوجار خرما به خاک شور بر مقدار فسفر خاک تأثیر معنی دار نداشت که با نتایج این تحقیق و تحقیقات قبلی که افزایش فسفر خاک را گزارش کردند (He et al., 2017; Lou et al., 2018)، مطابقت نداشت. ایشان بیان کردند احتمالاً این اختلاف نتیجه نوع بیوجار متفاوتی است که در پژوهش استفاده شده است. همچنین محتوای فسفر بیوجار مورد استفاده در تحقیق کمتر از مقدار فسفر خاک شاهد بود و بنابراین نمی توانسته است مقدار فسفر خاک را افزایش دهد. زانگ و همکاران (Zhang et al., 2015) در پژوهش خود نشان دادند که افزودن بیوجار کاه و کلش برنج در سطح ۵ درصد منجر به افزایش معنی دار و ۱۳/۸ درصدی فسفر قابل استفاده نسبت به تیمار بدون بیوجار شد. مطالعات نشان داده است افزودن اصلاح کننده های آلی به خاک مانند بیوجار سبب افزایش عناصر غذایی خاک، بهبود حاصلخیزی و افزایش تولید محصولات می شود (Zhang et al., 2015). با افزایش سطوح خشکی از تنش ملایم به شدید مقدار فسفر

قابل جذب خاک افزایش یافت. با افزایش عمق آب آبیاری از ۶۰ درصد (تیمار I1) به ۱۰۰ درصد (تیمار I3) مقدار فسفر ۱۸/۴۳ درصد کاهش یافت. بین تیمارهای ۶۰ و ۸۰ درصد آب آبیاری (I2 و I1) از نظر مقدار فسفر تفاوت معنی دار مشاهده نشد. آب آبیاری باعث شستشوی مواد غذایی و کودها و کاهش مقدار فسفر شد. مطابق **جدول ۳** با افزایش شوری مقدار فسفر افزایش یافت. تیمار آب با کیفیت ۷ دسی زیمنس بر متر (تیمار S3) بیشترین مقدار فسفر (۲۴/۸۴ میلی گرم در کیلوگرم خاک) را داشت. دلیل آن را می توان زیادتر بودن نسبت عناصر موجود در آب شور دانست. اثر متقابل آب آبیاری و بیوجار (**جدول ۴**) نشان داد با افزایش مقدار بیوجار کاربردی و کاهش عمق آب آبیاری مقدار فسفر افزایش یافت. مطابق **جدول ۴** در هر کدام از سطوح آب آبیاری تیمارهایی که بیوجار در آن ها به کار رفته بود، مقادیر فسفر بیشتری داشتند. به عنوان نمونه مقدار فسفر (۲۱/۷۱ میلی گرم در کیلوگرم خاک) در تیمار ۱۰۰ درصد نیاز آبی و کاربرد ۴ درصد جرمی بیوجار (تیمار I3B3) بیشتر از تیمار ۱۰۰ درصد نیاز آبی و عدم مصرف بیوجار (تیمار I3B1) (۱۷/۵۵ میلی گرم در کیلوگرم خاک) بود. کودهای آلی با افزایش قدرت نگهداری آب مانع شستشوی عناصر غذایی از خاک می شوند و در نتیجه ماندگاری عناصر غذایی در خاک افزایش می یابد، همچنین مواد آلی با افزایش فعالیت میکروبی سبب افزایش حلالیت عناصری مانند فسفر در خاک می شوند (Agegnehu et al., 2016). یائو و همکاران (Yao et al., 2009) نشان دادند با افزودن بیوجار تولید شده از کود حیوانی به خاک فرسول، فسفر قابل جذب گیاه در خاک افزایش یافت. اثر متقابل بیوجار و شوری آب آبیاری (**جدول ۵**) نشان داد با افزایش شوری آب آبیاری و بیوجار مصرفی مقدار فسفر افزایش یافت. بیشترین مقدار فسفر (۲۴/۹۹ میلی گرم بر کیلوگرم خاک) از تیمار A3C3 (۴ درصد جرمی بیوجار و شوری ۷ دسی زیمنس بر متر) به دست آمد که با تیمار A2C3 (۲ درصد جرمی بیوجار و شوری ۷ دسی زیمنس بر متر) تفاوت معنی دار نداشت. اثر متقابل آب آبیاری و شوری (**جدول ۶**) نشان داد در هر یک از سطوح شوری آب آبیاری با کاهش عمق آب آبیاری مقدار فسفر افزایش یافت. دلیل این موضوع را می توان شستشوی مواد غذایی خاک در اثر کاربرد سطوح زیادتر آب دانست. بیشترین مقدار فسفر (۲۴/۶۹ میلی گرم در کیلوگرم خاک) از تیمار B1C3 (۶۰ درصد آب آبیاری و ۷ دسی زیمنس بر متر شوری آب) به دست آمد که با تیمار B2C3 تفاوت معنی دار نداشت.

پتاسیم: مطابق **جدول ۲** اثرات آب آبیاری، بیوجار و شوری آب آبیاری و اثرات متقابل آن ها در سطح احتمال یک و پنج درصد بر مقدار پتاسیم خاک تأثیر معنی دار داشت. با افزایش بیوجار مصرفی مقدار پتاسیم افزایش یافت. افزودن ۲ و ۴ درصد جرمی بیوجار به خاک به ترتیب سبب افزایش ۶۸/۹۲ و ۷۷/۹۹ درصد پتاسیم نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد بیوجار) شد. تفاوت معنی داری بین مقدار پتاسیم در تیمار ۲ و ۴ درصد جرمی بیوجار مشاهده نشد. با کاربرد بیوجار در خاک،

پتاسیم موجود در آن وارد فاز محلول و به دلیل تعادل بین پتاسیم محلول و تبادل مقداری نیز وارد از تبادلی می‌شود و در نتیجه هر دو شکل محلول و تبدلی پتاسیم افزایش می‌یابد (Rahimi-Alashti *et al.*, 2021). ابریشمکش و همکاران (Abrishamkesh *et al.*, 2015) بیان کردند بیوجار شلتوک برنج اضافه شده با خاک با بافت لوم رسی، سبب افزایش پتاسیم قابل جذب نسبت به تیمار شاهد شد. فروهر و همکاران (Ferohar *et al.*, 2017) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند کاربرد بیوجار کود گاوی در خاک آهکی مقدار پتاسیم خاک را از ۷۵ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک به ۳۹۰ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک افزایش داد. ایشان بیان داشتند این امر می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر بیوجار کود گاوی بر فرایندهای جذب و رهاسازی پتاسیم و هدایت این واکنش‌ها به سمت رهاسازی بیشتر پتاسیم از منابع خاکی آن باشد. وانگ و همکاران (Wang *et al.*, 2018) در پژوهش خود نشان دادند که مصرف بیوجار در خاک سبب افزایش رشد باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم در خاک شده و میزان پتاسیم قابل جذب در خاک را افزایش می‌دهد. در مطالعه دیگر ژانگ و همکاران (Zhang *et al.*, 2020) به این نتیجه رسیدند که با کاربرد دو درصد بیوجار، میزان مصرف کود پتاسه به اندازه ۴۰ درصد کاهش یافته است زیرا بیوجار با تغییر ساختار کانی‌های رسی و افزایش جمعیت میکروبی خاک، تبدیل پتاسیم کندرها را به پتاسیم قابل دسترس تسریع می‌بخشد (Zhang *et al.*, 2020). وجود مقدار زیادی پتاسیم در بیوجار آن را به‌عنوان یک منبع پتاسیم آلی خیلی مفید برای گیاه معرفی کرده که می‌تواند رشد و عملکرد گیاه را افزایش دهد (Gopal *et al.*, 2020). پتاسیم یکی از عناصر پرمصرف گیاهی است و کمبود آن در خاک‌های ایران رو به گسترش است (Najafi-Ghiri *et al.*, 2011). بیوجار می‌تواند به‌عنوان ماده اصلاح‌کننده برای بهبود وضعیت حاصل‌خیزی پتاسیم خاک‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. موخرجی و همکاران (Mukherjee *et al.*, 2013) بیان داشتند که بیوجار دارای دامنه‌ای از شکل‌های عناصر غذایی می‌باشد که با سرعت‌های متفاوتی آزاد شده و تأثیرات متفاوتی را بر حاصلخیزی خاک دارند. پژوهشگران گزارش کردند بیوجار حاصل از سبوس برنج می‌تواند میزان پتاسیم قابل تبادل خاک را افزایش دهد (Mensah *et al.*, 2018). نجفی‌قیری و همکاران (Najafi-Ghiri *et al.*, 2011) نیز در پژوهشی دریافتند که کاربرد بقایای گیاهی و بیوجار آنها می‌تواند علاوه بر افزایش مقدار ماده آلی خاک، وضعیت پتاسیم خاک را بهبود بخشد. ایشان بیان کردند که کاربرد برگ آتریپلکس، برگ کنار و بقایای نی و بیوجار آنها تأثیر زیادی بر پتاسیم خاک داشته و مقدار همه شکل‌های پتاسیم را افزایش می‌دهد. ثقفی و همکاران (Thaghafi *et al.*, 2021) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که افزودن ۱/۵ و ۲ درصد وزنی بیوجار خرما به خاک شور موجب افزایش به‌ترتیب ۱۲/۳۳ و ۱۸/۷۹ درصدی پتاسیم خاک نسبت به تیمار شاهد شد. ایشان بیان داشتند تفاوت در روند افزایش پتاسیم در سطوح مختلف بیوجار احتمالاً مربوط به تثبیت

پتاسیم در سطوح پایین کاربرد بیوجار و کاهش یافتن میزان تثبیت در سطوح با نظیر ۲٪ باشد. به بیان ساده‌تر، در سطوح پایین کاربرد بیوجار، اکثر پتاسیم آزاد شده از بیوجار به درون خاک وارد فازهای غیر از محلول شده (فازهایی از قبیل تبدلی و حتی تثبیت در فضای بین لایه‌های رس‌ها) و در نتیجه افزایش پتاسیم محلول کمتر نمود داشته است. اما در سطوح بالای کاربرد بیوجار احتمالاً با کاهش میزان تثبیت پتاسیم، بیشتر پتاسیم محلول خاک را متأثر کرده و در نتیجه افزایش‌های قابل توجهی در سطوح بالای کاربرد بیوجار مشاهده شد. افزایش عمق آب آبیاری به دلیل شستشوی مواد غذایی سبب کاهش مقدار پتاسیم خاک شد. بیشترین مقدار پتاسیم (۱۷۵/۳۴ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) از تیمار ۶۰ درصد آب آبیاری مشاهده شد که با تیمار ۸۰ درصد آب آبیاری تفاوت معنی‌دار نداشت. با افزایش رطوبت، گیاه میزان پتاسیم زیادی جذب کرده و به این دلیل خاک میزان پتاسیم کمتری را نشان داده است. این مطلب با نتایج حسینی و همکاران که گزارش نمودند با افزایش رشد و توسعه ریشه گیاه، میزان جذب پتاسیم به وسیله گیاه افزایش می‌یابد که در نتیجه میزان پتاسیم قابل جذب در خاک کاهش می‌یابد، مطابقت دارد (Hosseini *et al.*, 2015). افزایش شوری آب آبیاری نیز سبب افزایش مقدار پتاسیم شد. اثرات متقابل بیوجار و آب آبیاری (جدول ۴) نشان داد با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش بیوجار مصرفی مقدار پتاسیم افزایش یافت. بیشترین مقدار پتاسیم (۲۱۸/۱۳ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) از تیمار B3I1 و کمترین آن (۱۲۸/۹۱ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) از تیمار B1I3 به‌دست آمد. ساختار متخلخل بیوجار سبب سطح ویژه زیاد آن و در خاک سبب افزایش ظرفیت نگهداری مواد مغذی خاک می‌گردد. علاوه بر این بیوجار، ظرفیت ماندگاری مواد مغذی را در خاک بهبود می‌بخشد و از آبشویی آنها در محیط خاک جلوگیری می‌کند. این موضوع می‌تواند به دو دلیل باشد؛ اول این که مواد مغذی در منافذ کربنی شده به دام می‌افتد و دوم این که اکسیداسیون زیستی آهسته سبب تولید گروه‌های کربوکسیل در حاشیه بیوجار می‌شود که ظرفیت نگهداری مواد مغذی را افزایش می‌دهد (Robbiani, 2013). تغییرات و پایداری بیوجار در خاک، تحت تأثیر وضعیت رطوبت خاک قرار می‌گیرد و وضعیت رطوبت خاک ممکن است معدنی شدن و تصاعد کربن بیوجار را در شرایط مختلف خاک تحت تأثیر قرار دهد که در این رابطه نیاز به پژوهش‌های بیشتری می‌باشد (Cheng *et al.*, 2008). اثرات متقابل بیوجار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد با افزایش شوری و افزایش بیوجار مصرفی مقدار پتاسیم افزایش یافت. در تمامی سطوح شوری تفاوت معنی‌داری بین مقادیر پتاسیم با کاربرد ۲ و ۴ درصد جرمی بیوجار مشاهده نشد. بیوجار اثرات تنش شوری را با جذب سدیم از محلول خاک کاهش می‌دهد (Akhtar *et al.*, 2015). پژوهش‌ها نشان داده است سدیم و پتاسیم با یکدیگر حالت رقابتی دارند. بیوجار سبب کاهش جذب سدیم و افزایش پتاسیم شده و مقاومت به شوری را

سديم و پتاسيم بيشتري داراي pH زيادترى مى‌باشند (Sing et al., 2010). بنا بر اين مى‌توان گفت اضافه كردن بيوچار با pH زياد، سبب افزايش pH خاك مى‌شود. چينتالا و همكاران (Chintala et al., 2013) در پژوهش خود مشاهده كردند كه افزودن بيوچار توليد شده از علوفه ذرت به خاك اسيدى، سبب افزايش pH خاك شد. زلفى باوريانى و همكاران (Zolfi Bavariani et al., 2015) نشان دادند افزودن بيوچار كود مرعى باعث افزايش معنى دار pH، قابليت هدايت الكترىكى، ماده آلى خاك، پتاسيم و فسفر قابل دسترس شد و بيشتري ميزان عناصر قابل جذب در بيوچار تهيه شده در ۳۰۰ درجه سلسيوس مشاهده شد. با توجه به اين كه خاك‌هاى منطقه سيستان آهكى و قليايى مى‌باشند و بيوچار سبب افزايش pH خاك مى‌شود بنا بر اين استفاده از بيوچار در اين مناطق داراي محدوديت است. افزايش عمق آب آبيارى سبب کاهش pH خاك شد. اما از اين نظر تفاوت معنى دارى بين تيمارها حاصل نشد. افزايش شورى آب آبيارى سبب افزايش pH خاك شد. احتمالاً افزايش املاح ناشى از افزايش شورى آب آبيارى سبب افزايش pH خاك شد. اثر متقابل بيوچار و مقدار آب آبيارى (جدول ۴) نشان داد در تمام سطوح آبيارى افزودن بيوچار به خاك سبب افزايش pH خاك شد. تيمار B3I1 با ۹/۳۶ بيشتري و تيمار B1I3 با مقدار ۷/۶۸ كمتري مقادير pH خاك را داشتند. اثرات متقابل بيوچار و شورى آب آبيارى (جدول ۵) نشان داد با افزايش شورى آب آبيارى و افزودن بيوچار به خاك مقدار pH خاك افزايش يافت. بيشتري مقدار pH خاك (۹/۹۴) از تيمار B3S3 و كمتري آن (۸/۱۱) از تيمار B1S1 به دست آمد. دليل اين امر افزايش املاح خاك در اثر استفاده از بيوچار و آب شور مى‌باشد. اثرات متقابل آب آبيارى و شورى (جدول ۶) نشان داد با کاهش عمق آب آبيارى و افزايش شورى آب مقدار pH خاك افزايش يافت. تيمار I1S3 بيشتري مقدار pH خاك (۸/۹۸) را داشت كه با تيمار I2S3 (۸/۲۶) تفاوت معنى دار نداشت. افزايش شورى سبب افزايش املاح خاك و کاهش عمق آب آبيارى از آبشويى املاح جلوگيرى مى‌كند. املاح در خاك تجمع مى‌يابد و بنا بر اين pH خاك افزايش يافت. محمودآبادى (Mahmoodabadi, 2018) بيان كرد استفاده از آب حاوى سديم سبب افزايش pH و ESP خاك مى‌شود. با افزايش سديم SAR خاك افزايش يافته و pH زياد مى‌شود.

EC: افزودن ۴ درصد جرمى بيوچار به خاك سبب افزايش ۲/۳۵ برابري شورى خاك نسبت به تيمار شاهد شد. نتايج پژوهش نشان داد (جدول ۳) تيمارهاى ۲ و ۴ درصد جرمى بيوچار به ترتيب سبب افزايش معنى دار درصد قابليت هدايت الكترىكى خاك نسبت به تيمار شاهد شد. چينتالا و همكاران (Chintala et al., 2013) نيز بيان كردند افزايش قابليت هدايت الكترىكى خاك در اثر كاربرد بيوچار به دليل حضور نمك هاى محلول در بيوچار و زيادتر بودن قابليت هدايت الكترىكى آن نسبت به قابليت هدايت الكترىكى خاك مى‌باشد. قربانى و اميراحمدى

افزايش مى‌دهد (Rajabi et al., 2017). اثرات متقابل آب آبيارى و شورى (جدول ۶) نشان داد با افزايش شورى و کاهش عمق آب آبيارى مقدار پتاسيم افزايش يافت. با کاهش عمق آب آبيارى و افزايش شورى، جذب آب توسط گياه به دليل کاهش رطوبت خاك و افزايش شورى آن، کاهش مى‌يابد. بنا بر اين جذب پتاسيم توسط گياه نيز کاهش مى‌يابد و پتاسيم بيشتري در خاك باقى مى‌ماند.

درصد نيتروژن: مقدار بيوچار، آب آبيارى و شورى آب و اثرات متقابل آن‌ها تاثير معنى دارى بر مقدار درصد نيتروژن خاك داشت. با افزودن بيوچار به خاك مقدار نيتروژن خاك افزايش يافت. افزايش نيتروژن خاك مى‌تواند به دليل وجود نيتروژن در بيوچار باشد. حسن پور و همكاران (Hasanpour et al., 2022) در بررسى تاثير بيوچار بر برخى ويژگي‌هاى شيميايى و قابليت جذب عناصر غذايى خاك در منطقه اصفهان به اين نتيجه رسيدند كه نيتروژن موجود در بيوچار در خاك آزاد شده و موجب افزايش نيتروژن خاك مى‌شود. موخرجى و همكاران (Mukhrejee et al., 2013) بيان داشتند اضافه كردن بيوچار چمن به خاك با بافت شنى و لوم رسي موجب آزاد شدن نيتروژن در خاك و افزايش نيتروژن خاك مى‌شود. همچنين نيلسن و همكاران (Nelisen et al., 2012) با افزودن بيوچار ذرت به خاك به نتايج مشابهى دست يافتند. افزايش عمق آب آبيارى سبب کاهش مقدار نيتروژن خاك شد. بيشتري مقدار نيتروژن (۰/۲۶ درصد) در تيمار ۶۰ درصد عمق آب آبيارى به دست آمد كه تفاوت معنى دارى با تيمار ۸۰ درصد نداشت. شورى آب آبيارى نيز سبب افزايش درصد نيتروژن خاك شد. اثر متقابل آب آبيارى و بيوچار بر مقدار نيتروژن در سطح احتمال ۵ درصد معنى دار بود (جدول ۴). در تمامى سطوح آب آبيارى افزودن بيوچار به خاك سبب افزايش درصد نيتروژن خاك شد. اثر متقابل بيوچار و شورى آب آبيارى (جدول ۵) نشان داد افزايش شورى آب و افزودن بيوچار سبب افزايش درصد نيتروژن خاك شد. بيشتري درصد نيتروژن (۰/۲۴ درصد) از تيمار B3S3 مشاهده شد كه با تيمار B2S3 تفاوت معنى دار نداشت. افزايش نيتروژن خاك به دليل زياد بودن نيتروژن بيوچار مى‌باشد كه با اختلاط در خاك سبب افزايش نيتروژن خاك شد. اثر متقابل شورى و مقدار آب آبيارى (جدول ۶) نشان داد با افزايش شورى و کاهش عمق آب آبيارى درصد نيتروژن خاك افزايش يافت.

pH: مطابق جدول ۳ مقدار بيوچار، آب آبيارى و شورى آب و اثرات متقابل آن‌ها بر مقدار pH خاك تاثير معنى دارى داشت. pH خاك با افزايش بيوچار افزايش يافت. كاربرد ۲ و ۴ درصد جرمى بيوچار به ترتيب سبب افزايش ۱۳/۲۸ و ۱۳/۸۹ درصدى pH خاك شد. بيوچار به دليل داشتن عناصر قليايى مانند كلسيم و منيزيم داراي pH خنى تا قليايى مى‌باشد. pH بيوچار بسته به نوع ماده آلى و شرايط گرماكافت آن از ۴ تا ۱۲ تغيير مى‌كند. بيوچارهاى با منشأ چوبى نسبت به بيوچارهاى علفى pH كمتري دارند. بيوچارهاى علفى به دليل داشتن عناصر قليايى مانند

خاکدانه‌سازی را در خاک تحت تأثیر قرار داده و ساختمان خاک را بهبود بخشد (Domene et al., 2009). بیوپچار به دلیل ساختار متخلخل و سطح ویژه زیاد دارای جرم مخصوص کم بوده و اختلاط آن‌ها با خاک سبب کاهش جرم مخصوص خاک می‌شود (Sohi et al., 2010). مطابق جدول ۳ مقدار بیوپچار بر جرم مخصوص ظاهری و حقیقی تأثیر معنی‌دار داشت. با افزایش مقدار بیوپچار مصرفی، جرم مخصوص ظاهری و حقیقی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. بیشترین مقادیر جرم مخصوص ظاهری و حقیقی به ترتیب ۱/۷۸ و ۲/۷۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب از تیمار شاهد (بدون مصرف بیوپچار) و کمترین مقادیر آن به ترتیب ۱/۳۹ و ۲/۱۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب از تیمار ۴ درصد جرمی مصرف بیوپچار به دست آمد. کاهش جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک در حضور بیوپچار به دو دلیل می‌تواند رخ دهد، یکی به دلیل مخلوط شدن خاک با ماده‌ای با چگالی ظاهری کمتر و دیگری ناشی از تأثیر افزایش ماده آلی خاک در اثر کاربرد بیوپچار است. ماده آلی سبب بهبود ساختمان خاک، شکل‌گیری خاکدانه‌ها و پایداری آن‌ها می‌شود و از این طریق چگالی ظاهری خاک کاهش می‌یابد (Abel et al., 2013). دوروکس و همکاران (Devereux et al., 2013) نیز بر اساس نتایج پژوهش خود بیان کردند که افزایش منافذ خاک در اثر مواد آلی موجود در بیوپچار، سبب کاهش چگالی ظاهری خاک می‌شود. اختلاف معنی‌دار کاهش چگالی ظاهری با مصرف بیوپچار در پژوهش‌های زیادی مشاهده شده است (Hardie et al., 2013; Kumar et al., 2014). ابل و همکاران (Abel et al., 2013) در پژوهش خود بیان کردند مصرف بیوپچار ذرت باعث کاهش ۸۴ درصدی چگالی ظاهری خاک شد. قربانی و امیراحمدی (Ghorbani & Amir Ahmadi, 2017) در پژوهشی نشان دادند مقدار جرم مخصوص ظاهری در تیمارهای حاوی بیوپچار شلتوک برنج چهار درصد کمتر از تیمار شاهد بود. ایشان بیان کردند بیوپچار جرم مخصوص کمتری نسبت به مواد معدنی خاک دارد و در اثر اختلاط با خاک سبب کاهش تراکم خاک در واحد حجم می‌شود. بیوپچار با تغییر در تراکم دانه‌های خاک، جرم مخصوص ظاهری خاک را کاهش می‌دهد (Lim et al., 2016). بوش و همکاران (Busscher et al., 2011) بیان کردند افزایش کربن آلی خاک با افزودن اصلاح‌کننده‌های آلی مانند بیوپچار سبب کاهش چگالی ظاهری خاک می‌شود و دلیل آن‌را تغییر اندازه خاکدانه عنوان کردند. ایشان معتقد بودند افزودن بیوپچار باعث هم‌آوری خاکدانه‌های میکرو شده و در نتیجه وزن مخصوص ظاهری کاهش می‌یابد. مطابق جدول ۳ مقدار آب آبیاری تأثیر معنی‌داری بر جرم مخصوص ظاهری و حقیقی نداشت. علی‌رغم این جرم مخصوص ظاهری و حقیقی در تیمار ۱۰۰ درصد مقدار آب آبیاری بیشتر از دیگر تیمارهای آبیاری بود. شوری آب آبیاری سبب کاهش جرم مخصوص ظاهری و حقیقی شد (جدول ۳). تیمار ۷ دسی‌زیمنس بر متر شوری آب آبیاری سبب افزایش ۱۸/۶۵ و ۱۷/۵۷ درصدی جرم خصوص حقیقی و ظاهری نسبت به تیمار ۱ دسی‌زیمنس بر متر شد. دلیل افزایش

(Ghorbani & Amir Ahmadi, 2017) در پژوهش خود گزارش کردند اختلاط بیوپچار به خاک سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک می‌شود و دلیل آن را قابلیت بیوپچار در جمع‌آوری مواد مغذی خاک به واسطه سطح ویژه زیاد آن بیان کردند. دیوبند هفشجانی و همکاران (Deoband Hafeshjani et al., 2016) نشان دادند که کاربرد بیوپچار باگاس نیشکر سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک شد. آنان دلیل آن را حضور نمک‌های محلول در بیوپچار و زیادتر بودن قابلیت هدایت الکتریکی آن نسبت به قابلیت هدایت الکتریکی خاک دانستند (Deoband Hafeshjani et al., 2016). افزایش عمق آب آبیاری سبب کاهش شوری خاک شد. تفاوت معنی‌داری از نظر شوری خاک بین تیمارهای ۱۰۰ و ۸۰ درصد عمق آب آبیاری مشاهده نشد. تیمار ۶۰ درصد آب آبیاری نسبت به تیمار ۱۰۰ درصد آب آبیاری ۵۲/۲۶ درصد شوری خاک را افزایش داد. افزایش شوری آب آبیاری سبب افزایش شوری خاک شد. تیمار ۷ دسی‌زیمنس بر متر شوری آب سبب افزایش ۹۰/۵۱ درصدی شوری خاک نسبت به تیمار ۱ دسی‌زیمنس بر متر شد. اثر متقابل آب آبیاری و بیوپچار (جدول ۴) نشان داد با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش مقدار بیوپچار مصرفی شوری خاک افزایش یافت. در تمامی سطوح آب آبیاری افزودن بیوپچار به خاک سبب افزایش شوری خاک شد. اثر متقابل بیوپچار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد با افزایش شوری آب آبیاری و افزایش بیوپچار مصرفی شوری خاک افزایش یافت. تیمار B3S3 با ۲۰/۶۵ دسی‌زیمنس بر متر بیشترین شوری خاک را داشت که با تیمار B2S3 تفاوت معنی‌دار نداشت. رضایی و همکاران (Rezaei et al., 2017) در پژوهشی بیان کردند افزایش شوری آب آبیاری و کاربرد بیوپچار در خاک سبب افزایش غلظت عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم در خاک شده و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک را افزایش دادند. اثر متقابل شوری و مقدار آب آبیاری (جدول ۶) نشان داد با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش شوری آب مقدار شوری خاک افزایش یافت. تیمار I1S3 با ۲۰/۱۴ دسی‌زیمنس بر متر بیشترین مقدار شوری خاک را داشت که با تیمار I2S3 تفاوت معنی‌دار نداشت.

جرم مخصوص ظاهری و حقیقی: جرم مخصوص ظاهری شاخص مهمی از لحاظ ساختمان خاک، تراکم و کیفیت آن می‌باشد. جرم مخصوص ظاهری بر تعامل گیاه و خاک از قبیل عمق ریشه‌دوانی، انتقال اکسیژن و سایر گازها، نفوذ و دسترسی آب و فعالیت موجودات خاکزی تأثیر می‌گذارد. بیوپچار با کاهش جرم مخصوص خاک به پایداری خاکدانه کمک می‌کند (Blanco-Canqui, 2017). بیوپچار بعد از افزوده شدن به خاک، بر اثر هوادیدگی و قرار گرفتن در معرض فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، با گذشت زمان به ذرات کوچکتر تبدیل شده و می‌تواند توزیع اندازه ذرات خاک را تغییر دهد (Brodowski et al., 2007). همچنین با افزایش کربن آلی، تخلخل و سطح ویژه خاک و بهبود فعالیت میکروبی خاک، می‌تواند

جرم مخصوص ظاهری و حقیقی کاهش یافت. بیشترین جرم مخصوص ظاهری و حقیقی از تیمار B1S3 و کمترین آن از تیمار B3S1 به دست آمد.

جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک با افزایش شوری را می توان افزایش وزن واحد حجم خاک در اثر افزایش و تجمع نمک در خاک در شرایط استفاده از آب شور دانست. اثرات متقابل بیوچار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد با افزایش بیوچار و کاهش شوری آب آبیاری

جدول ۳- نتایج مقایسه میانگین ویژگی های اندازه گیری شده خاک

Table 3- The results of comparing the average of the measured characteristics of the soil

تیمارهای آزمایشی Experimental treatments	جرم مخصوص ظاهری Bulk density (gr/cm ³)	جرم مخصوص حقیقی Actual density (gr/cm ³)	اسیدیته pH	قابلیت		پتاسیم Potassium (mg/kg)	فسفر Phosphorus (mg/kg)	عملکرد Yield (kg/ha)	
				هدایت الکتریکی EC (dS/m)	نیتروژن Nitrogen (%)				
بیوچار (%) Biochar(%)	0	1.78a	2.75a	8.13b	8.96c	0.12b	112.63b	15.47b	967.86b
	2	1.58b	2.38b	9.21a	10.16b	a ² 0.2	190.26a	23.95a	1386.45a
	4	1.39c	2.15c	9.26a	21.13a	a ³ 0.2	200.48a	24.84a	985.27b
مقدار آب آبیاری (درصد) Amount of water irrigation	60	1.42a	2.33a	8.25a	19.52b	0.26a	175.34a	24.86a	959.76b
	80	1.47a	2.33a	8.17a	14.47a	0.24a	168.55a	23.51a	1189.46ab
شوری آب آبیاری (دسی زیمنس بر متر) Salinity of water irrigation	100	1.48a	2.36a	7.29ab	12.82a	0.16b	144.78b	20.97b	1350.12a
	1	1.36bc	2.05bc	7.28ab	10.33c	0.17b	123.37c	17.11c	1219.75a
	4	1.47b	2.23b	8.45a	13.38b	0.21a	163.36b	22.01b	1047.33ab
7	1.65a	2.52a	8.86a	19.68a	0.23a	201.18a	24.84a	758.63c	

در هر ستون میانگین های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی دار ندارند.

In each culomn averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% probability level.

جدول ۴- مقایسه میانگین اثرات متقابل بیوچار و مقدار آب آبیاری (بر ویژگی های اندازه گیری شده)

Table 4- Comparison of the average intraction effects of biochar and the amount of irrigation water (B*I) on the measured characteristics

تیمار Treatment	اسیدیته pH	هدایت الکتریکی EC (dS/m)	نیتروژن Nitrogen (%)	پتاسیم Potassium (mg/kg)	فسفر Phosphorus (mg/kg)	عملکرد Yield (kg/ha)
B1I1	8.12b	12.53d	0.16c	140.82d	18.34d	621.57d
B2I1	9.18a	16.96b	0.22a	208.56a	23.95a	697.41dc
B3I1	9.36a	21.25a	0.24a	218.13a	24.45a	540.12e
B1I2	8.23b	9.87e	0.17c	136.25d	18.29d	721.82c
B2I2	8.75a	13.14d	0.2ab	193.46b	22.91b	1186.61a
B3I2	8.85a	15.63b	0.21a	200.08ab	23.51ab	784.53c
B1I3	7.68c	8.56ef	0.15cd	128.91e	17.55de	986.27c
B2I3	7.86bc	10.58e	0.19b	159.57c	20.97c	1371.29a
B3I3	8.41ab	14.78c	0.19b	164.32c	21.71c	1002.47b

در جدول I1، I2 و I3 تیمارهای مقدار آب آبیاری برابر ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه، B1، B2 و B3 تیمارهای مقدار بیوچار برابر ۰، ۲ و ۴ درصد وزنی می باشد.

In Table I1, I2, and I3, the amount of irrigation water treatments are equal to 60, 80, and 100% of water requirement, B1, B2, and B3, the amount of biochar treatments are equal to 0, 2, and 4% by weight.

در هر ستون میانگین های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی دار ندارند.

In each culomn, averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% probability level.

جدول ۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل بیوچار و شوری آب آبیاری (بر ویژگی‌های اندازه‌گیری شده

Table 5- Comparison of the average interaction effects of biochar and irrigation water salinity (B*S) on the measured characteristics

تیمار Treatment	جرم مخصوص ظاهری Bulk density (gr/cm ³)	جرم مخصوص حقیقی actual density (gr/cm ³)	اسیدیته pH	هدایت الکتریکی EC (dS/m)	نیتروژن Nitrogen (%)	پتاسیم Potassium (mg/kg)	فسفر Phosphorus (mg/kg)	عملکرد Yield (kg/ha)
B1S1	1.14dc	2.06d	8.11b	8.46e	0.11e	119.63e	16.66f	1057.24b
B2S1	1.13d	2.04d	8.13b	10.52d	0.14d	121.12e	17.75e	1302.53a
B3S1	1.13d	.02d ^۲	9.11a	11.72cd	0.14d	123.65e	18.11e	804.49c
B1S2	1.42b	2.45b	8.26b	10.63d	0.16c	167.16d	20.08d	817.36c
B2S2	1.19c	2.22c	9.25a	12.25c	0.19b	184.28b	22.61b	754.29d
B3S2	1.15c	2.12c	9.69a	14.85b	0.19b	187.37b	23.21b	624.05e
B1S3	1.66a	2.75a	8.57ab	12.56c	0.17c	176.13c	21.12c	696.85de
B2S3	1.22c	2.25c	9.61a	18.23a	0.23a	211.26a	24.54a	604.28e
B3S3	1.16c	2.15c	9.94a	20.65a	0.24a	216.54a	24.99a	547.81f

در جدول S1، S2 و S3 تیمارهای شوری آب آبیاری برابر ۱، ۴ و ۷ دسی‌زیمنس بر متر، B1، B2 و B3 تیمارهای مقدار بیوچار برابر ۰، ۲ و ۴ درصد وزنی می‌باشد. In Table S1, S2, and S3, the irrigation water salinity treatments are equal to 1, 4, 7 dS/m, B1, B2, and B3, the amount of biochar treatments are equal to 0, 2, and 4% by weight.

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دار ندارند.

In each column, averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% probability level.

جدول ۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل مقدار آب آبیاری و شوری آب آبیاری (بر ویژگی‌های اندازه‌گیری شده خاک

Table 6- Comparison of the average interaction effects of irrigation water amount and irrigation water salinity (I*S) on measured soil properties

تیمار Treatment	جرم مخصوص ظاهری Bulk density (gr/cm ³)	جرم مخصوص حقیقی actual density (gr/cm ³)	اسیدیته pH	هدایت الکتریکی EC (dS/m)	نیتروژن Nitrogen (%)	پتاسیم Potassium (mg/kg)	فسفر Phosphorus (mg/kg)	عملکرد Yield (kg/ha)
I1S1	1.44cd	1.19cd	6.23b	10.75c	0.18c	152.82d	20.23c	1085.25b
I2S1	1.38d	1.16d	6.14b	10.63c	0.17cd	143.63d	18.44d	1326.85a
I3S1	1.32d	1.13d	6.06b	9.56cd	0.16c	138.18d	17.92d	1334.57a
I1S2	1.62b	2.38b	7.31ab	15.74b	0.23ab	176.57b	23.21ab	1014.52bc
I2S2	1.56bc	2.33bc	7.22ab	14.36b	0.22b	169.42bc	22.01b	1027.39b
I3S2	1.51c	2.28c	6.45b	11.58c	0.19c	158.52c	20.52c	1258.69ab
I1S3	1.75a	2.48a	8.98a	20.14a	0.27a	202.21a	24.69a	724.56c
I2S3	1.71a	2.41a	8.26a	18.24a	0.25a	186.46a	23.65a	876.47c
I3S3	1.48c	2.24c	7.12ab	14.28b	0.19c	164.78c	20.97bc	915.68c

در جدول S1، S2 و S3 تیمارهای شوری آب آبیاری برابر ۱، ۴ و ۷ دسی‌زیمنس بر متر، I1، I2 و I3 تیمارهای مقدار آب آبیاری برابر ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد وزنی می‌باشد. In Table S1, S2, and S3, the irrigation water salinity treatments are equal to 1, 4, 7 dS/m, I1, I2, and I3, the amount of irrigation water treatments are equal to 60, 80, and 100% of water requirement.

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دار ندارند.

In each column averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% probability level.

نتیجه‌گیری

این پژوهش با هدف بررسی اثرات بیوچار در شرایط تنش آبی و شوری آب آبیاری بر عملکرد کینوا و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد افزودن بیوچار به خاک سبب افزایش مقدار عملکرد گیاه کینوا، pH و EC خاک شد. جرم مخصوص حقیقی خاک با افزودن ۲ و ۴ درصد جرمی بیوچار به خاک به ترتیب ۱۳ و ۲۱ درصد و جرم مخصوص ظاهری به ترتیب ۱۱ و ۲۲ درصد کاهش یافت. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، کاربرد بیوچار به عنوان روشی مناسب برای بهبود کیفیت شیمیایی و حاصلخیزی خاک

اختلاط بیوچار با خاک در شرایط استفاده از آب شور، سبب شور شدن بیشتر خاک و تجمع نمک در خاک شده و جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک افزایش می‌یابد. اثر متقابل آب آبیاری و شوری (جدول ۶) نشان داد در هر کدام از تیمارهای آب آبیاری افزایش شوری آب آبیاری سبب افزایش جرم مخصوص ظاهری و حقیقی شد. با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش شوری آب، شدت تنش وارده به خاک بیشتر و پراکندگی ذرات بیشتر شد، بنابراین جرم مخصوص ظاهری و حقیقی افزایش یافت.

مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به این که افزودن این ماده آلی به خاک در سطوح زیاد سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک می شود لذا استفاده از مقادیر زیاد بیوچار در خاک باید با احتیاط انجام شود.

سپاسگزاری

این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه زابل انجام شده است. کد پژوهانه IR-UOZ-GR-1837

های فقیر و سبک توصیه می شود. با کاربرد بیوچار مقدار عناصر غذایی خاک (فسفر، نیتروژن و پتاسیم) افزایش یافت. این افزایش نشان دهنده پتانسیل این اصلاح کننده در برطرف نمودن کمبود این عناصر در شرایط خشکی در خاک می باشد. با توجه به این که ماندگاری بیوچار در خاک به مراتب بیشتر از ماده اولیه آن گزارش شده است، می توان از بیوچار به عنوان پتانسیلی برای ارتقاء پایدار سطح حاصل خیزی خاک، کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی و کاهش خطرات زیست محیطی آن ها استفاده کرد. با توجه به اثرات متفاوتی که بیوچار بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و زیستی خاک در مناطق مختلف دارد، پیشنهاد می شود تأثیر آن بر ویژگی های خاک های مختلف با بیوچارهای متفاوت

References

1. Abel, S., Peters, A., Trinks, S., Schonsky, H., Facklam, M., & Wessolek, G. (2013). Impact of biochar and hydrochar addition on water retention and water repellency of sandy soil. *Geoderma*, 202–203:183–191. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.03.003>
2. Abrishamkesh, S., Gorji, M., Asadi, H., Bagheri-Marandi, G., & Pourbabaee, A. (2015). Effects of rice husk biochar application on the properties of alkaline soil and lentil growth. *Plant Soil and Environment*, 61, 475-482. (In Persian with English abstract)
3. Agegnehu, G., Bass, A.M., Nelson, P.N., & Bird, M.I. (2016). Benefits of biochar, compost and biochar–compost for soil quality: maize yield and greenhouse gas emissions in a tropical agricultural soil. *Science of the Total Environment*, 543, 295-306. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.054>
4. Akhtar, S.S., Andersen, M.N., & Liu, F. (2015). Biochar mitigates salinity stress in potato. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 5, 368- 378. <https://doi.org/10.1111/jac.12132>
5. Algosaibi, A.M., El-Garawany, M.M., Badran, A.E., & Almadini, A.M. (2015). Effect of irrigation water salinity on the growth of Quinoa plant seedlings. *Journal of Agricultural Science*, 7(8), 205. <https://doi.org/10.5539/jas.v7n8p205>
6. Bhupindar, S.S. (2014). Nanotechnology in agri- food production: an overview. *Nanotechnology science and applications*. India. www.Dovepress. 7:31-53.
7. Blanco-Canqui, H. (2017). Biochar and soil physical properties. *Soil Science Society of America Journal*, 81(4), 687-711. <https://doi.org/10.2136/sssaj2017.01.0017>
8. Bremner, J.M. (1996). Nitrogen total. In: *Methods of Soil Analysis*. D. L. Sparks et al. (eds) part III, 3rd ed. Am. Soc. Agron. Inc., Madison, WI. Pp. 1085-1122.
9. Brodowski, S., Amelung, W., Haumaier, L., & Zech, W. (2007). Black carbon contribution to stable humus in German arable soils. *Geoderma*, 139, 220–228. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2007.02.004>
10. Busscher, W., Novak, J.M., & Ahmedna, M. (2011). Physical effects of organic matter amendment of a southeastern US coastal loamy sand. *Soil Science Society of American Journal*, 176, 661-667. <https://doi.org/10.1097/SS.0b013e3182357ca9>
11. Cheng, C.H., Lehmann, J., Thies, J.E., & Burton, S.D. (2008). Stability of black carbon in soils across a climatic gradient. *Journal of Geophysical Research Biogeosciences*, 113, 10.
12. Chintala, R., Mollinedo, J., Schumacher, T.E., Papiernik, S.K., Malo, D.D., Clay, D.E., Kumar, S., & Gulbrandson, D.W. (2013). Nitrate sorption and desorption in biochars from fast pyrolysis. *Microporous and Mesoporous Materials*, 179, 250-257.
13. Chintala, R., Mollinedo, J., Schumacher, T.E., Malo, D.D., & Julson, J.L. (2014). Effect of biochar on chemical properties of acidic soil. *Archives of Agronomy and Soil Science*, 60, 393-404.
14. Dabhi, R., Bhatt, N., & Pandit, B. (2013). Super absorbent polymersan innovative water saving technique for optimizing crop yield. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, 10, 5333-5340.
15. Deoband Hafeshjani, L., Naseri, A., Houshmand, A., Abbasi, F., & Soltani Mohammadi, A. (2016). Investigating the effect of sugarcane bagasse biochar on the chemical properties of a sandy loam soil. *Journal of Irrigation Science and Engineering*, 40, 72-63. (In Persian with English abstract)
16. Devereux, R.C., Sturrock, C.J., & Mooney, S.J. (2013). The effects of biochar on soil physical properties and winter wheat growth. *Journal of Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, 103(1), 13-18.
17. Domene, X., Mattana, S., Hanley, K., Enders, A., & Lehmann, J. (2014). Medium -term effects of corn biochar

- addition on soil biota activities and functions in a temperate soil cropped to corn. *Soil Biology and Biochemistry*, 72, 152-162.
18. Downie, A., Crosky, A., & Munroe, P. (2009). *Physical properties of biochar*. pp. 13- 32. In Lehmann J. and S. Joseph (Eds). *Biochar for Environmental Management: Science and Technology*. Earthscan: London, UK.
 19. Elewa, T.A., Sadak, M.S., & Saad, A.M. (2017). Proline treatment improves physiological responses in quinoa plants under drought stress. *Bioscience Research*, 14(1), 21-33.
 20. Fathi Gerdelidani, A., & Mirseyed, H. (2015). *Different aspects of biocurrent effects in improving soil quality*. International Conference on Applied Research in Agriculture, Tehran, 22 May: 1-12. (In Persian with English abstract)
 21. Forohar, M., Khorasani, R., Fototvat, A., Shariat-Madari, H., & Khavazi, K. (2017). The effect of different biochars and their raw materials on some soil chemical properties and nutrients over time in a calcareous soil. *Water and Soil Journal*, 32(2), 299-312. (In Persian with English abstract)
 22. Ghorbani, M., & Amir Ahmadi, A. (2017). The effect of rice husk biochar on some soil physical properties and corn growth in a loamy soil. *Journal of Soil Research*, 32(3), 306-319. (In Persian with English abstract)
 23. Gopal, M., Gupta, A., Hameed, K.S., Sathyaseelan, N., Rajeela, T.K., & Thomas, G.V. (2020). Biochars produced from coconut palm biomass residues can aid regenerative agriculture by improving soil properties and plant yield in humid tropics. *Biochar*, 2, 211-226. <https://doi.org/10.1007/s42773-020-00043-5>
 24. Guvili, A., Mousavi, A.A., & Kamkar Haghghi, A. (2016). Effect of cattle manure biochar and moisture stress on growth characteristics and spinach water use efficiency in greenhouse conditions. *Water Research in Agriculture*, 30(2), 259-243. (In Persian with English abstract)
 25. Hardie, M., Clothier, B., Bound, S., Oliver, G., & Close, D. (2014). Does biochar influence soil physical properties and soil water availability? *Plant Soil*, 376, 347-361. <https://doi.org/10.1007/s11104-013-1980-x>
 26. Hasanpour, E., Shirvani, M., Haj Abbasi, M.A., & Majidi, M.M. (2022). Acidic biochars on some chemical characteristics and ability to absorb nutrients of calcareous soils. *Journal of Water and Soil Sciences*, 26(2), 39-59. (In Persian with English abstract)
 27. HE, L.L., Zhong, Z.K., & Yang, H.M. (2017). Effects on soil quality of biochar and straw amendment in conjunction with chemical fertilizers. *Journal of Integrative Agriculture*, 16(3), 704-712. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(16\)61420-X](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(16)61420-X)
 28. Hirich, A., Choukr, R., & Jacobsen, S. (2013). The combined effect of deficit irrigation by treated wastewater and organic amendment on quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) productivity. *Journal Desalination and Water Treatment*, 25, 2208-2213.
 29. Hosseini, M., Movahedi Naeini, S.A., & Bameri, A. (2015). The effect of different tillage methods on the amount of available potassium in soils with different extractants in a soil with high specific surface area. *Water and Soil*, 4, 966-979. (In Persian with English abstract)
 30. Ibrahim, O.M., Bakry, A.B., El Kramany, M.F., & Elewa, T.A. (2015). Evaluating the role of biochar application under two levels of water requirements on wheat production under sandy soil conditions. *Global Journal of Advanced Research*, 2(2), 411-418.
 31. Kang, J., Hesterberg, D., & Osmond, D.L. (2008). Soil organic matter effects on phosphorus sorption: A path analysis. *Soil Science Society of America Journal*, 73, 360-366
 32. Karmaka, S., Lague, C., Agnew, J., & Landry, H. (2007). Integrated decision support system (DSS) for manure management. *Computers and Electronics*, 57, 190-201. <https://doi.org/10.2136/sssaj2008.0113>
 33. Knowles, O., Robinson, B., Contangelo, A., & Clucas, L. (2011). Biochar for the mitigation of nitrate leaching from soil amended with biosolids. *Science of the Total Environment*, 409, 3206-3210.
 34. Kumar, S., Masto, R.E., Ram, L.C., Sarkar, P., George, J., & Selvi, V.A. (2013). Biochar preparation from *Parthenium hysterophorus* and its potential use in soil application. *Ecological Engineering*, 55, 67-72. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.02.011>
 35. Laird, D.A., Fleming, P.D., Karlen, D.L., Wang, B., & Horton, R. (2010). Biochar impact on nutrient leaching from a Midwestern agricultural soil. *Geoderma*, 158, 436-442. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2010.05.012>
 36. Lehmann, J., & Joseph, S. (2009). *Biochar for environmental management- an introduction*. In: Lehmann J. and Joseph S. (Eds). *Biochar for environmental management: Science and Technology*. Earthscan, London, pp. 1-11.
 37. Liang, B., Lehmann, J., Solomon, D., Kinyangi, J., Grossman, J., O'Neill, B., Skjemstad, J.O., Theis, J., Luizao, F.J., Peterson, J., & Neves, E.G. (2006). Black carbon increases cation exchange capacity in soils. *Soil Science Society of America Journal*, 70, 1719-1730. <https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2009.09.007>
 38. Lim, T., Spokas, K., Feyereisen, G., & Novak, J. (2016). Predicting the impact of biochar additions on soil hydraulic properties. *Chemosphere*, 142, 136-144. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.06.069>
 39. Luo, C., Deng, Y., Inubushi, K., Liang, J., Zhu, S., Wei, Z., Guo, X., & Luo, X., (2018). Sludge biochar amendment and alfalfa revegetation improve soil physicochemical properties and increase diversity of soil microbes in soils from a rare earth element mining wasteland. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(5). <https://doi.org/10.3390/ijerph15050965>

40. Mahmoodabadi, M. (2018). Investigating the effect of sequential application of organic matter and irrigation with sodium water on the size distribution of secondary soil particles. *Environmental Erosion Research*, 15, 24. (In Persian with English abstract)
41. Major, J., Rondon, M., Molina, D., Riha, S.J., & Lehmann, J. (2010). Maize yield and nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol. *Plant and Soil*, 333, 117-128. (In Persian with English abstract)
42. Mensah, A.K., & Frimpong, K.A. (2018). Biochar and/or compost applications improve soil properties, growth, and yield of maize grown in acidic rainforest and coastal savannah soils in Ghana. *International Journal of Agronomy*, 7, 1-8.
43. Mir, A., Piri, H., & Naserin, A. (2021). The effects of different levels of wheat biochar and water stress on the quantitative and qualitative characteristics of Carla (bitter melon) in pots. *Water Research in Agriculture*, 35(2), 170-185. (In Persian with English abstract)
44. Mokami, A., Yazdan-Panah, N., & Saidenjad, A.H. (2022). The effect of using vermicompost and biochar on the morpho-physiological characteristics of quinoa under drought stress conditions. *Iran Water and Soil Research*, 53(1), 130-140. (In Persian with English abstract)
45. Mukherjee, A., & Zimmerman, A.R. (2013). Organic carbon and nutrient release from a range of laboratory produced biochars and biochar-soil mixtures. *Geoderma*, 194, 122-30. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.10.002>
46. Najafi Ghairi, M. (2014). The effect of using different biochars on some soil characteristics and the ability to absorb some nutrients in a calcareous soil. *Journal of Soil Research*, 29(3), 351-358. (In Persian with English abstract)
47. Najafi Ghiri, M., Abtahi, A., Owliaie, H.R., Hashemi, S.S., & Koochkan, H. (2011). Factors affecting potassium pools distribution in highly calcareous soils of southern Iran. *Arid land Research and Management*, 25, 313-327. (In Persian with English abstract)
48. Najafi Ghiri, M., Bostani, H., & Mahmoudi, A. (2017). The effect of the remains of three plant species and their biochar on some characteristics and potassium status of a calcareous soil. *Soil and Water Science Research Journal*, 32(1), 25-36. (In Persian with English abstract)
49. Negaresh, H., & Latifi, L. (2018). The origin of wind deposits in the east of Zabol through morphoscopy and physical and chemical analysis of sediments. *Geography and Environmental Planning*, 20(1), 1-22. (In Persian with English abstract)
50. Nelissen, V., Rütting, T., Huygens, D., Staelens, J., Ruyschaert, G., & Boeckx, P. (2012). Maize biochars accelerate short-term soil nitrogen dynamics in a loamy sand soil. *Soil Biology and Biochemistry*, 55, 20-27. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2012.05.019>
51. Netondo, G.F., Onyango, J.C., & Beck, E. (2004). Sorghum and salinity: II. Gasexchange and chlorophyll fluorescence of sorghum under salt stress. *Crop Science*, 44, 806-811. <https://doi.org/10.2135/cropsci2004.7970>
52. Olsen, S.R., and Sommers, L.E. (1990). Phosphorus. P 403-431. In: A.L. Page (ed), *Method of soil analysis*. Part 2. 2nd agron Monoger., ASA, Madison, WI.
53. Page, A.L., Miller, R.H., & Keeney, D.R. (1982). Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy. In *Soil Science Society of America*, 1159.
54. Piri, H., Naserin, A., & Albalasmeh, A. (2022). Interactive effects of deficit irrigation and vermicompost on yield, quality, and irrigation water use efficiency of greenhouse cucumber. *Journal of Arid Land*, 14(11), 1274-1292. <https://doi.org/10.1007/s40333-022-0035-7>
55. Rahimi-Alashti, S., Bahmanyar, M.A., Qajarspanlou, M., Sadegh-Zadeh, F., & Khodsi-Bidgoli, A. (2021). The effect of the use of some organic and inorganic amendments on the amount of high-use and low-use elements of the soil under quinoa cultivation under water stress conditions. *Soil Management and Sustainable Production*, 11(2), 25-48. (In Persian with English abstract)
56. Rajabi, H. (2014). *Effect of pistachio residue, sewage black mud, and chemical fertilizer on bio- provision and nitrogen and phosphorus absorption by spinach*. Master Thesis. Shiraz University.
57. Rezaei, N., Rezaghi, F., Sepaskhah, A., & Mousavi, A. (2017). The effect of biochar and irrigation water salinity on chemical properties of soil under bean cultivation. *Journal of Soil and Water Science Research*, 32(1), 13-24. (In Persian with English abstract)
58. Robbiani, Z. (2013). Hydrothermal carbonization of biowaste/fecal sludge. *Lappeenranta University of Technology*, 41, 1-71.
59. Shirmardi, M., & Tofghi, H. (2014). Effect of organic matter on phosphorus stabilization kinetics in several different soils. *Iranian Soil and Water Research*, 46, 567-577. (In Persian with English abstract)
60. Singh, B.P., Hatton, B.J., Singh, B., Cowie, A.L., & Kathuria, A. (2010). Influence of biochars on nitrous oxide emission and nitrogen leaching from two contrasting soils. *Journal of Environmental Quality*, 39(4), 1224-1235.
61. Sohi, S., Krull, E., Lopez-Capel, E., & Bol, R. (2010). A review of biochar and its use and function in soil. *Advances in Agronomy*, 105, 47-82. [https://doi.org/10.1016/S0065-2113\(10\)05002-9](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(10)05002-9)
62. Sun, H., Shi, W., Zhou, M., Ma, X., & Zhang, H. (2019). Effect of biochar on nitrogen use efficiency, grain yield and amino acid content of wheat cultivated on saline soil. *Plant, Soil and Environment*, 65, 83-89.
63. Telahigue, D.C., Yahia, L.B., Aljane, F., Belhouchett, K., & Toumi, L. (2017). Grain yield, biomass productivity

- and water use efficiency in quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) under drought stress. *Journal of Scientific Agriculture*, 1, 222-232. (In Persian with English abstract)
64. Thaghafi, F., Qanei-Bafghi, M.J., & Shirmardi, M. (2021). The effect of palm tree waste biochar on element concentration, sodium absorption ratio and some physical properties of saline soil. *Desert Ecosystem Engineering*, 10(31), 85-94. (In Persian with English abstract)
 65. Van Zwieten, L., Kimber, S., Morris, S., Chan, K., Downie, A., Rust, J., Joseph, S., & Cowie, A. (2010). Effects of biochar from slow pyrolysis of papermill waste on agronomic performance and soil fertility. *Plant and Soil*, 327, 235-246. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0050-x>
 66. Walkley, A., & Black, I.A. (1934). An examination of the Degtjareeff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. *Soil Science*, 37, 29-38.
 67. Wang, L., Xue, C., Nie, X., Liu, Y., & Chen, F. (2018). Effects of biochar application on soil potassium dynamics and crop uptake. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 181, 635-643. <https://doi.org/10.1002/jpln.201700528>
 68. Waraich, E.A., Ahmad, R.M., Saifullah, Y., & Ashraf, E. (2011). Role of mineral nutrition in alleviation of drought stress in plants. *Australian Journal of Crop Science*, 6, 764-777.
 69. Westerman, R.E.L. (1990). *Soil testing and plant analysis*. SSSA, Madison, Wisconsin, USA. 784p.
 70. Yao, F.X., Arbustain, M.C., Virgel, S.F., Blanco, Arostegui, J.J., Macia-Agullo, A., & Macias, F. (2009). Simulated geochemical weathering of a mineral ash-rich biochar in a modified Soxhlet reactor. *Chemosphere*, 80, 724-732. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.05.026>
 71. Yuan, J.H., Xu, R.K., & Zhang, H. (2011). The forms of alkalis in the biochar produced from crop residues at different temperatures. *Bioresource Technology*, 102(3), 3488-3497. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.11.018>
 72. Zahoor, R., Dong, H., Abid, M., Zhao, W., Wang, Y., & Zhou, Z. (2017). Potassium fertilizer improves drought stress alleviation potential in cotton by enhancing photosynthesis and carbohydrate metabolism. *Environmental and Experimental Botany*, 137, 73-83. <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2017.02.002>
 73. Zhang, M., Fan, C.H., Li, Q.L., Li, B., Zhu, Y.Y., & Xiong, Z.Q. (2015). A 2-yr field assessment of the effects of chemical and biological nitrification inhibitors on nitrous oxide emissions and nitrogen use efficiency in an intensively managed vegetable cropping system. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 201, 43-50. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.12.003>
 74. Zhang, M., Riaz, M., Liu, B., Xia, H., El-Desouki, Z., & Jiang, C. (2020). Two-year study of biochar: Achieving excellent capability of potassium supply via alter clay mineral composition and potassium-dissolving bacteria activity. *Science of the Total Environment*, 717, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137286>
 75. Zolfi Bavariani, M., Ronaghi, A., Karimian, N., Ghasemi, W., & Yatharbi, J. (2015). The effect of biochar prepared from chicken manure at different temperatures on the chemical characteristics of a calcareous soil. *Journal of Water and Soil Sciences*, 20(75), 73-84. (In Persian with English abstract)