

Research Article

Vol. 37, No. 6, Feb.-Mar., 2024, p. 943-955

Cold Plasma Treatment Effects on Corn (*Zea mays* L.) Yield and Iron and Zinc Concentration

B. Atarodi ^{1*}, M. Zangiabadi ¹

1- Assistant Professor of Soil and Water Research Department, Khorasan-Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran

(* - Corresponding Author Email: B.atarodi@areeo.ac.ir)

Received: 13-09-2023	How to cite this article:
Revised: 28-10-2023	Atarodi, B., & Zangiabadi, M. (2024). Cold plasma treatment effects on corn (<i>Zea mays</i> L.) yield and iron and zinc concentration. <i>Journal of Water and Soil</i> , 37(6), 943-955.
Accepted: 11-11-2023	(In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/jsw.2023.84422.1333
Available Online: 11.11.2023	

Introduction

Today, it is an inevitable necessity to make use of advanced and efficient technologies in order to increase productivity and gain a better economic status. Among different methods attracted the attention of researchers for enhancement in quantity and quality yield, cold plasma technique as a modern procedure has shown a promising prospects. Despite the importance of using cold plasma in agriculture, studies have focused more on the effect of this technique on reducing microbial load in agricultural products, less on absorption of nutrients in plants. Therefore, the objectives of this experiment were to evaluate the impacts of plasma treatment of corn seeds and plasma activated water (PAW) on growth and concentration of zinc and iron in the shoots of corn.

Materials and Methods

This research was conducted as a factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with 3 replications in a research greenhouse in agricultural and natural resources research and education center of Khorasan Razavi. The factors of experiment were three types of seed (control seeds, seeds treated with dry plasma and wet plasma), two kinds of irrigation water (distilled water and PAW) and two levels of foliar spray (without foliar spray and foliar spray with iron and zinc). Required mass of soil, was gathered, air-dried, sieved from 5 mm mesh and weighted in 6 packs. Based on the soil test values the required macro, micronutrients (except for iron and zinc) was calculated and added to the soil, and then the soil samples were moved to the pot. PLASMA BIOTEC Company located in Khorasan Razavi Park of Sciences and Technology, Mashhad, Iran performed plasma treatment of seeds and water. Plasma treated corn seeds were planted on May 18th with a density of 6 seeds in each pot. Plantlets were reduced to 2 plants after germination and establishment and irrigation was continued with desired treatments. Shoots of each pot was cut 8 weeks after sowing, 1 cm above the ground and delivered to the laboratory, where the samples were washed, dried, grounded and the concentration of zinc and iron were measured using the atomic absorption device (Perkin Elmer, 2380) in dry ash digested in 2 N HCl acid. Data were statistically analyzed by SAS statistical software (version 9.4). Comparison of means for the main effects and interactions was performed by Tukey's test at 5 percent confidence interval.

Results and Discussion

Comparison of means for the interaction effects of water \times seed \times foliar spray showed that the minimum concentration of iron (147.67 mg/kg) was observed in plants grown from non-treated seeds, not foliar sprayed and irrigated with non-PAW (treatment 1 in Table 7). On the other hand, plants grown from wet plasma treated seeds and received foliar spray showed the highest concentration of iron regardless of irrigation water type (treatments 10 and 12 in Table 7). Comparison of means also shows that iron concentration in plants grown from dry plasma treated seeds had no significant difference with that of non-treated seeds (treatments 1 and 5 or 2 and 6). The mean



©2023 The author(s). This is an open access article distributed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

<https://doi.org/10.22067/jsw.2023.84422.1333>

comparison results for zinc concentrations showed that the minimum value was related to plants grown from non-treated seeds, not foliar sprayed and irrigated with non-PAW (treatment 1 in Table 8). The comparison of the simple effects of the type of seed on the concentration of zinc in shoots (Table 6) showed that wet plasma seeds caused a significant increase in the concentration of zinc. However, comparison of means for the interaction effects of water \times seed \times foliar spray showed that the effect of plasma treatment on zinc concentration was effective only in treatments that received foliar spray (comparison of treatment 2 with 10 in table 8). Based on these results the highest zinc concentration was observed in plants grown from wet plasma seeds and received foliar spray at the same time (treatment 12 in Table 8). In addition, the comparison of treatment 1 with treatment 4 and treatment 9 with treatment 2 indicates that in order to increase the concentration of zinc in plant, plasma treatment of seeds cannot replace the foliar spray method. Comparison of means for the interaction effects of water \times seed \times Foliar spray showed that the minimum yield was observed in plants grown from non- treated seeds, irrigated with non-activated water and not sprayed with iron and zinc solution (treatment 1 in Table 9). However, the similar treatment which grown from wet plasma treated seeds (treatment 9), showed significantly higher yield. Dry plasma, without foliar spray and without PAW (treatment 5) had no significant priority over the control. Plants grown from seeds treated with wet plasma and without foliar spray could not significantly show more iron and zinc content over the control, while their shoot yield was higher.

Conclusion

Based on the findings of this study, it can be inferred that irrigation with PAW and utilizing seeds treated with dry plasma exhibited no significant impact on augmenting zinc and iron content, as well as shoot yield. Conversely, wet plasma treatment, while not yielding significant enhancements in the concentration of iron and zinc within the plant, did result in increased yield. It is crucial to note that the extent of influence exerted by factors such as frequency and duration of seed exposure to plasma conditions on the observed outcomes may vary significantly. Therefore, optimizing methodology and conducting further research in this domain are imperative for a comprehensive understanding of these processes.

Keywords: Concentration, Dry plasma, Nutrition, Plant, Wet Plasma

مقاله پژوهشی

جلد ۳۷، شماره ۶، بهمن-اسفند ۱۴۰۲، ص. ۹۵۵-۹۴۳

تأثیر پلاسمای سرد بر عملکرد و غلظت آهن و روی در ذرت (*Zea mays* L.)

بصیر عطاردی^{۱*} - مهدی زنگی آبادی^۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

چکیده

امروزه در بخش کشاورزی، استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته و کارآمد به منظور افزایش بهره‌وری و کسب موقعیت اقتصادی بهتر، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌آید. در میان روش‌های متعددی که در جهت بهبود، افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته‌اند، پلاسمای سرد، تکنیکی جدید، دوست‌دار محیط‌زیست و اقتصادی است که افق‌های امیدبخشی را در این حوزه ایجاد کرده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر پلاسمای سرد بر عملکرد و جذب عناصر آهن و روی در ذرت انجام گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل سه نوع بذر (غیر پلاسمائی، پلاسمائی خشک و پلاسمائی مرطوب)، دو نوع آب آبیاری (آب مقطر و آب پلاسمائی) و دو سطح محلول‌پاشی (عدم محلول‌پاشی و محلول‌پاشی دو عنصر آهن و روی) بود که به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و با ۳ تکرار، در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجرا شد. هشت هفته پس از کشت، اندام هوایی گیاهان مربوط به هر گلدان به طور مجزا از یک سانتی‌متری سطح خاک برداشت، به آزمایشگاه منتقل، عملیات شستشو، خشک کردن، اندازه‌گیری وزن خشک و اندازه‌گیری غلظت آهن و روی نمونه‌ها، توسط دستگاه جذب اتمی انجام گردید. نتایج نشان داد که مصرف آب پلاسمائی تأثیر معنی‌داری بر غلظت آهن، روی و مقدار عملکرد اندام هوایی ذرت نداشت ولی پلاسمائی نمودن بذور به روش مرطوب تأثیر معنی‌داری بر غلظت عنصر روی و میزان عملکرد داشت به طوری که بالاترین غلظت روی و مقدار عملکرد در گیاهانی مشاهده شد که بذور آنها پلاسمائی مرطوب بوده، و همزمان محلول‌پاشی شده بودند. با این وجود برای افزایش غلظت روی و آهن، پلاسمائی نمودن بذور نتوانست جایگزین روش محلول‌پاشی گردد. در مجموع و براساس نتایج حاصل، پلاسمائی نمودن مرطوب بذور، به طریقی - غیر از افزایش غلظت دو عنصر آهن و روی - می‌تواند سبب بهبود عملکرد گیاه گردد.

واژه‌های کلیدی: پلاسمای خشک، پلاسمای مرطوب، تغذیه، غلظت، گیاه

مقدمه

عناصر می‌باشد. با این وجود، در ایران به دلیل pH بالا و آهکی بودن خاک‌ها، عناصر روی و آهن در خاک رسوب کرده، از دسترس گیاه خارج شده، که این موضوع از طرفی سبب کاهش آهن و روی قابل جذب خاک‌های کشور شده و از طرف دیگر باعث کاهش کارایی کودهای مصرفی می‌گردد (Moreno-Jiménez et al., 2019; Shahsavand & Eshghi, 2021). همچنین، طبق گزارش FAO حدود ۳۰ درصد از خاک‌های تحت کشت دنیا دچار کمبود روی بوده، کمبود این عنصر در حدود ۴۰ درصد از خاک‌های ایران و ۷۵ درصد از خاک‌های استان

دو عنصر آهن و روی جزء عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان از جمله ذرت (*Zea mays*) محسوب می‌شوند که نقش مهمی در افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی دارند. این دو عنصر، علاوه بر کشاورزی در حوزه پزشکی و سلامت نیز مورد توجه بوده به طوری که در برخی کشورها، محصولات نظیر گندم با آهن غنی‌سازی می‌شوند. مصرف کودهای شیمیائی حاوی روی و آهن در اراضی کشاورزی، از جمله روش‌های معمول برای رفع نیاز گیاهان به این

۱- استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
(*- نویسنده مسئول: Email: B.atarodi@areeo.ac.ir)

و نیتروژن در زمان‌های ۱۵ تا ۱۲۰ ثانیه) گزارش کردند که استفاده از هر دو نوع گاز ذکر شده توانست طول ریشه، ارتفاع ساقه و میزان پروتئین گندم را نسبت به شرایط شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش دهد. در پژوهش دیگری، لامیچهان و همکاران (Lamichhane et al., 2021) اثر پلاسمادهی (با استفاده از گاز نیتروژن) بر عملکرد ذرت را مطالعه نموده، نتایج آنان نشان داد که پلاسمادهی توانست محتوی کلروفیل، عملکرد وزن خشک و میزان پروتئین محلول گیاه ذرت را افزایش دهد. در خصوص بررسی مکانیسم تأثیر پلاسما بر عملکرد گیاهان مطالعات مختلفی انجام گردیده است. ایجاد ترک‌های میکروسکوپی در سطح بذر در نتیجه پلاسمائی نمودن بذر، باعث افزایش جذب آب و املاح معدنی توسط بذر و در نتیجه افزایش عملکرد می‌گردد. از طرفی منافذ ایجاد شده در اثر پلاسمادهی، پوسته بذر را شکننده‌تر نموده، بنابراین جوانه بذر، با صرف انرژی کمتری قادر خواهد بود پوسته بذر را بشکافد و رشد نماید (Goudarzi et al., 2021). از این طریق، پلاسمادهی بذر سبب افزایش سرعت جوانه‌زنی بذر می‌گردد که این عمل باعث استقرار سریعتر گیاه گردیده، لذا گیاه از نظر رشدی در وضعیت مطلوب‌تری قرار می‌گیرد و متعاقب آن عملکرد گیاه افزایش می‌یابد. علاوه بر تأثیر مثبت پلاسمادهی بذر بر افزایش عملکرد گیاه، برخی مطالعات نشان داده‌اند پلاسمائی نمودن آب مصرفی برای گیاه نیز منجر به بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه می‌شود. در واقع، پلاسمادهی آب سبب تشکیل گروه‌های فعال اکسیژن نیتروژن (RONS)^۳ در آب می‌گردد و با توجه به اینکه نیتروژن جزء اساسی ساختار کلروفیل و پروتئین‌های گیاهی به‌شمار می‌رود لذا افزایش میزان فتوسنتز و پروتئین در گیاه و متعاقباً آن افزایش عملکرد کمی از نتایج مصرف آب پلاسمائی^۴ می‌باشد (Lamichhane et al., 2021). به عنوان یک نمونه، مطالعات لامیچهان و همکاران (Lamichhane et al., 2021) نشان داد که مصرف آب پلاسمائی (که با گاز نیتروژن فعال شده بود) در مقایسه با آب معمولی، غلظت نیتروژن نیتراتی گیاه ذرت را به‌طور معنی‌داری افزایش داد که در نتیجه آن، افزایش سنتز پروتئین و عملکرد بیشتر گیاه مشهود بود.

شاینسکی و همکاران (Shainsky et al., 2012) نشان دادند که با روش پلاسمائی می‌توان pH آب را از ۷/۵ به ۲/۵ کاهش داد. این محققان دلیل کاهش pH آب پلاسمائی را تشکیل اسیدهای نیتریک و نیترو و نیز گونه آنیونی سوپراکسید (O_2^-) در طی فرآیند پلاسمائی شدن دانسته و گزارش کردند ماندگاری کاهش pH آب پلاسمائی به نوع گاز مورد استفاده در تیمار پلاسما بستگی داشته، به‌طوری‌که اگر پلاسمائی شدن با گاز اکسیژن انجام شود کاهش pH تنها تا ۳ ساعت پس از

خراسان تخمین زده می‌شود (Moshiri et al., 2010; Najafi et al., 2013). کمبود آهن نیز در بسیاری از خاک‌های ایران و استان خراسان مشاهده شده به‌عنوان مثال، در حالی‌که حد بحرانی آهن در خاک ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود غلظت آن در برخی خاک‌های تحت کشت ذرت در استان خراسان ۴ میلی‌گرم بر کیلوگرم گزارش شده است (Nabavi moghadam et al., 2013). علاوه بر این، کودهای حاوی عناصر آهن و روی که اثربخشی بیشتری دارند- مثل کلات‌های^۱ آهن و روی - قیمت بالائی داشته و مصرف آن برای تمام محصولات مقرون به‌صرفه نیست. از این‌رو، یافتن روش‌های جایگزین برای رفع نیازهای گیاهان به دو عنصر مذکور می‌تواند اهمیت داشته باشد.

امروزه در بخش کشاورزی، استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته و کارآمد به‌منظور افزایش بهره‌وری و کسب موقعیت اقتصادی بهتر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌شمار می‌آید. در میان روش‌های متعددی که در جهت بهبود، افزایش کمی و کیفیت محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته‌اند، پلاسمای سرد، تکنیکی جدید و اقتصادی است که افق‌های امیدبخشی را در این حوزه ایجاد کرده است.

با وجود اهمیت کاربرد پلاسمای سرد در کشاورزی، مطالعات بیشتر به تأثیر این تکنیک بر کاهش آلودگی و بار میکروبی محصولات کشاورزی معطوف بوده، تأثیر آن بر بهبود جذب و افزایش غلظت عناصر غذایی در بافت‌های گیاه، به‌خصوص در شرایطی نظیر خاک‌های کشور ما (که به دلیل آهکی بودن جذب عناصر غذایی مانند آهن و روی با محدودیت مواجه می‌باشد) کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. برخی محققان از جمله راندنیا و همکاران (Randeniya et al., 2015) و هاشیزوم و همکاران (Hashizume et al., 2020) گزارش کردند که با استفاده از پلاسمای سرد می‌توان بسته به هدف مورد نظر، در اطراف بذر، لایه نازک^۲ هیدروفیل یا هیدروفوب (آب‌دوست یا آب‌گریز) تشکیل داد. در دو مطالعه ذکر شده، به‌ترتیب از گازهای اکسیژن و آرگون استفاده شده بود. تشکیل لایه آب‌دوست در اطراف بذر، سبب افزایش جذب آب توسط بذر و متعاقباً آن بهبود جذب عناصر غذایی و میزان عملکرد می‌گردد. جیانگ و همکاران (Jiang et al., 2018) در ارزیابی تأثیر پلاسما با استفاده از گاز هلیوم، بر وضعیت عناصر غذایی در بافت‌های گیاه گوجه‌فرنگی مشاهده کردند که تیمار کردن قبل از کشت بذر گوجه‌فرنگی با پلاسمای ۸۰ W، باعث افزایش غلظت عناصر نیتروژن و فسفر در ریشه و ساقه گیاه گردیده، ولی بر میزان پتاسیم گیاه تأثیری معنی‌داری ندارد. ایران‌بخش و همکاران (Iranbakhsh et al., 2017) در بررسی تأثیر پلاسمائی نمودن بذر گندم (با دو گاز هلیوم

4- Plasma activated water (PAW)

1- Chelates
2- Thin film
3- Reactive oxygen- nitrogen species

(آب مقطر و آب پلاسمائی) و دو سطح محلول پاشی (عدم محلول پاشی و محلول پاشی دو عنصر آهن و روی) بود (جدول ۱) که به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و با ۳ تکرار، در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجرا شد.

آماده سازی خاک

حجم کافی از نمونه خاکی که دارای میزان روی و آهن کمتر از حد بحرانی بود جمع آوری شده، پس از هوا خشک شدن و عبور از الک ۵ میلی متری در دسته جات ۶ کیلوگرمی توزین شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در جدول ۲ آمده است. عناصر پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز (به جز آهن و روی) براساس نتایج آزمون خاک و از منبع اوره، سوپر فسفات تریپل، سولفات پتاسیم، کلات منگنز (Flourish Mn 9 % EDTA) به خاکها افزوده شد. به این منظور، ۰/۶۵ گرم اوره، ۰/۶۵ گرم سوپر فسفات تریپل، ۱/۲ گرم سولفات پتاسیم و ۰/۳۳ گرم کلات منگنز به نمونه های ۶ کیلوگرمی خاک اضافه شد. برای اختلاط کامل و یکنواخت، کودها آسیاب و ابتدا به حجم کمتری از نمونه اضافه و سپس با کل خاک مخلوط شد. ضمناً ۰/۶۵ گرم اوره نیز در طی دو تقسیط در طی دوره رشد به هر گلدان اضافه گردید.

آماده سازی گلدانها

به منظور ایجاد زه کش مناسب و نیز جلوگیری از خروج خاک از ته گلدانها در حین آبیاری، در ته هر گلدان یک عدد کاغذ صافی گذاشته شد و سپس بر روی آن ۴۰۰ گرم شن درشت و ۱۰۰ گرم شن شسته شده ریخته شد، به طوری که وزن گلدان خالی و سنگریزه برای تمام گلدانها مساوی گردید. به هر گلدان، ۶ کیلوگرم خاک که طبق مرحله قبلی آماده شده بود اختصاص داده شد.

تیمار پلاسما ماندگار است و مجدداً pH آب روند افزایشی خواهد گرفت ولی چنانچه پلاسمائی شدن با هوا انجام شود ماندگاری pH آب تا حدود ۷۰ ساعت پس از پلاسمائی شدن نیز ادامه خواهد داشت. در مطالعه مشابهی، پارک و همکاران (Park et al., 2013) گزارش کردند با در معرض قرار دادن دو نمونه آب با pH های ۷/۵ و ۸/۵ در شرایط پلاسمائی (به مدت ۱۲۰ ثانیه)، مقادیر pH یک واحد کاهش یافت. با این وجود، این محققان در خصوص اینکه کاهش pH آب، چه میزان پایدار است اظهار نظر نکرده اند ولی در خصوص پایداری گروه های فعال نیتروژن، گزارش کردند که این خاصیت در آب پلاسمائی بعد از گذشت دو روز از بین می رود. در مطالعه دیگری، میلدازن و همکاران (Mildažiene et al., 2020) بیان کرده اند که آب پلاسمائی تولید شده با هوا دارای امواج الکترومغناطیس می باشد که از طریق افزایش سرعت فتوسنتز و افزایش فعالیت برخی از هورمون های گیاهی تأثیر مثبتی بر رشد گیاه می گذارد. یودپیتاک و همکاران (Yodpitak et al., 2019) شش رقم برنج را تحت تأثیر پلاسما سرد با استفاده از گاز آرگون قرار دادند و مشاهده کردند که درصد جوانه زنی، طول ریشه و ارتفاع گیاهچه در بذور تیمار شده (با زمان ۷۵ ثانیه و توان ۱۳۵ وات) نسبت به شرایط شاهد افزایش معنی داری نشان داد.

با عنایت به کمبود مطالعات در زمینه تأثیر پلاسما بر جذب عناصر غذایی در شرایط خاک های کشور ما، پژوهش حاضر، به منظور بررسی تأثیر تیمار بذور ذرت با پلاسما سرد، همچنین تأثیر مصرف آب پلاسمائی بر رشد و غلظت عناصر آهن و روی در اندام هوایی ذرت انجام گردید. هدف دیگر این مطالعه، بررسی امکان جایگزینی تأمین عناصر آهن و روی مورد نیاز ذرت به روش محلول پاشی با روش پلاسمائی بود.

مواد و روش ها

در این پروژه، فاکتورهای آزمایشی شامل سه نوع بذر (غیر پلاسمائی، پلاسمائی خشک و پلاسمائی مرطوب)، دو نوع آب آبیاری

جدول ۱- فاکتورهای آزمایشی و سطوح مربوط به آن

Table 1- Experimental factors and their levels

سطح Level	فاکتور Factor		
	محلول پاشی Foliar spray	آب آبیاری Irrigation water	بذر Seed
	عدم محلول پاشی Without foliar spray	آب مقطر Distilled water (Non- activated water)	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)
	محلول پاشی With foliar spray	آب پلاسمائی PAW	پلاسمائی خشک Treated with dry plasma
			پلاسمائی مرطوب Treated with wet plasma

جدول ۲- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده

Table 2- Physico-chemical properties of soil

ویژگی خاک Soil properties	واحد Unit	مقدار Value
pH	--	8.1
رس Clay	%	13
شن Sand	%	33
کربن آلی Organic carbon	%	0.63
درصد اشباع Saturation percent	%	37
هدایت الکتریکی Electrical conductivity	dS/m	0.95
فسفر قابل دسترس Available P	mg/kg	8.4
پتاسیم قابل دسترس Available K	mg/kg	219
روی قابل دسترس Available Zn	mg/kg	0.58
منگنز قابل دسترس Available Mn	mg/kg	8.28
آهن قابل دسترس Available Fe	mg/kg	3.43

کاشت و برداشت

قبل از کشت، بذور ذرت با محلول هیپوکلریت سدیم ۳ درصد به مدت ۳۰ ثانیه ضدعفونی، بعد از آب‌کشی با آب مقطر مجدداً ۳۰ ثانیه با قارچ‌کش بنومیل ۲ در هزار ضدعفونی گردید. در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، تعداد ۶ عدد بذر ذرت، رقم سینگل کراس ۷۰۴ (پلاسمائی شده یا غیر پلاسمائی؛ بسته به تیمار) در هر گلدان (۳۷ سانتی‌متر ارتفاع، ۳۰ سانتی‌متر قطر)، کشت گردید. پلاسمائی نمودن بذور به دو روش خشک و مرطوب توسط مرکز خدمات و تحقیقات پلاسمای مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مستقر در پارک علم و فناوری مشهد) انجام شد. به طور خلاصه، برای پلاسمائی نمودن به روش خشک، بذور در دستگاه پلاسمای سرد^۱ (Plasma Supply, BK 9401) قرار داده شد و پلاسمادهی به مدت ۴۰ ثانیه در مجاورت گاز اکسیژن و ۴۵ ثانیه در مجاورت هوا (در مجموع ۸۵ ثانیه) در ولتاژ ۱۰ کیلوولت و توان ۶۰ وات انجام گردید. برای پلاسمائی نمودن بذور به روش مرطوب، بذور پلاسمائی خشک به مدت ۱۲ ساعت در آب پلاسمائی نگهداری شد. آب پلاسمائی مورد استفاده در پروژه نیز توسط مرکز خدمات و تحقیقات پلاسمای تهیه شد. به منظور پلاسمائی نمودن آب، آب معمولی (غیرپلاسمائی) در دستگاه پلاسمای در تماس با لایه دی‌الکتریک و در مجاورت گاز نیتروژن قرار گرفت و پلاسمادهی تا زمانی که pH آن از ۷/۱ به ۶/۲ کاهش یافت ادامه یافت. استفاده از نیتروژن (به‌عنوان گاز در پلاسمادهی آب) در مقایسه با هوا، شرایط مطلوب‌تری برای تولید ترکیباتی مانند NH_3 به وجود می‌آورد که این ترکیب برای کاهش pH

آب و متعاقب آن جذب بهتر عناصر غذایی مؤثرتر خواهد بود (Lamichhane et al., 2021). جزئیات روش پلاسمائی نمودن بذور و تولید آب پلاسمائی، توسط محققان مختلفی از جمله لینگ و همکاران (Ling et al., 2016)، پورتو و همکاران (Porto et al., 2018)، لامیچهان و همکاران (Lamichhane et al., 2021) و همچنین توسط راسور و نما (Rathore & Nema., 2021) توضیح داده شده است.

بعد از جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه‌ها، تعداد بوته‌های هر گلدان به ۲ عدد کاهش یافت. آبیاری گلدان‌ها، با آب مقطر یا آب پلاسمائی (بسته به تیمار) صورت گرفت. ضمناً در تیمارهای واجد آب پلاسمائی، سه نوبت آبیاری در طی فصل رشد با آب پلاسمائی صورت گرفت و سایر نوبت‌های آبیاری با آب مقطر انجام شد. رطوبت گلدان‌ها در طول دوره کشت با روش توزین، در حد ۸۵ درصد ظرفیت زراعی تأمین شد. در صورت خروج آب از گلدان‌ها، آب اضافی به ظروف پلاستیکی زیر گلدان‌ها وارد شده که مجدداً برای آبیاری همان گلدان مورد استفاده قرار گرفت. برای تهیه کودهای مورد استفاده در محلول‌پاشی، از سولفات آهن و سولفات روی استفاده شد. به این منظور ۱/۵ گرم کود سولفات آهن (حاوی ۱۹٪ آهن) و ۱/۵ گرم کود سولفات روی (حاوی ۳۴٪ روی) به‌طور جداگانه در ۱/۵ لیتر آب مقطر حل گردید. کودهای مذکور از شرکت Fruitimax خریداری گردید. محلول‌پاشی عناصر آهن و روی در طی فصل رشد سه بار (در زمان ۴ برگ‌گی شدن و سپس به فواصل یک هفته‌ای) انجام شد. هشت هفته پس از کشت، اندام هوایی

1- Cold plasma generator

نتایج و بحث

اثرات اصلی نوع آب مصرفی بر غلظت آهن و روی و عملکرد اندام هوایی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت آهن، روی و مقدار عملکرد اندام هوایی به طور معنی داری ($P > 0.05$) تحت تأثیر نوع آب مصرفی قرار نگرفت (جدول ۳، ۴ و ۵). غلظت آهن اندام هوایی از ۱۶۴/۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم در گیاهان آبیاری شده با آب غیرپلاسمائی (آب مقطر) به ۱۶۶/۲۲ میلی گرم بر کیلوگرم در گیاهان آبیاری شده با آب پلاسمائی، افزایش یافت (جدول ۶). ولی این میزان تغییر، از نظر آماری معنی دار نبود. غلظت روی در گیاهان شاهد ۶۵/۰۵ میلی گرم بر کیلوگرم بود که با مصرف آب پلاسمائی، به ۶۴/۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم رسید (جدول ۶). همچنین با مصرف آب پلاسمائی، عملکرد از ۲۴/۰۳ گرم در هر گلدان در گیاهان شاهد، به ۲۴/۱۰ گرم در هر گلدان در گیاهان تیمار شده با آب پلاسمائی افزایش یافت که از نظر آماری تغییر معنی داری محسوب نمی شود (جدول ۶). در مطالعه مشابهی، پورتو و همکاران (Porto et al., 2018) گزارش کردند مصرف آبی که به مدت ۵ دقیقه در شرایط پلاسمائی قرار گرفته، باعث کاهش رشد گیاه سویا گردید. برخی گزارشات نیز بیان می کنند که انتخاب یون نامناسب و یا پتانسیل اکسایش و احیای نامناسب در زمان تهیه آب پلاسمائی می تواند باعث کیفیت نامناسب آب پلاسمائی گردیده و مصرف این آب، رشد گیاه را کاهش دهد (Rathore et al., 2022).

گیاهان مربوط به هر گلدان به طور مجزا از یک سانتی متری سطح خاک برداشت، به آزمایشگاه منتقل، عملیات شستشو، خشک کردن، اندازه گیری وزن خشک و اندازه گیری غلظت آهن و روی نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی انجام گردید. انتخاب دو عنصر آهن و روی در این مطالعه، به دلیل محدودیت جذب این دو عنصر در خاک های استان و کشور، و انتخاب ذرت به عنوان محصول مورد بررسی، به دلیل پاسخ بارز این گیاه به کمبود آهن صورت گرفت.

نمونه های گیاه پس از انتقال به آزمایشگاه و شستشو، به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد در آون خشک گردید، پس از آن، وزن خشک نمونه ها با ترازوی دیجیتالی اندازه گیری، نمونه ها کاملاً آسیاب شد. برای اندازه گیری عناصر آهن و روی در نمونه ها، پس از تهیه خاکستراز نمونه (در کوره در دمای ۵۵۰ درجه سانتی گراد و ۴ ساعت، با استفاده از اسید کلریدریک ۲ نرمال هضم انجام گردید و غلظت عناصر مذکور در عصاره ها توسط دستگاه جذب اتمی (مدل پرکین المر، ۲۳۸۰) قرائت شد (Emami, 1996).

محاسبات آماری

تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار آماری (SAS PC (version 9.4) انجام شد. مقایسه میانگین های اثرات اصلی و متقابل در سطح احتمال ۵ درصد با آزمون توکی صورت گرفت.

جدول ۳- نتایج تجزیه واریانس اثرات تیمارهای آزمایشی بر غلظت آهن اندام هوایی ذرت

Table 3- The results of analysis of variance of the effects of experimental treatments on iron concentration in shoot of corn

منابع تغییر Source of change	درجه آزادی df	میانگین مربعات M.S	مقدار F F Value	P-Value
آب Water	1	44.44	1.63	0.21
بذر Seed	2	502.78	18.47	< 0.0001
محلول پاشی Foliar spray	1	8341.78	306.43	< 0.0001
آب × بذر Water*Seed	2	10.77	0.4	0.68
آب × محلول پاشی Water* Foliar spray	1	1.78	0.07	0.80
بذر × محلول پاشی Seed* Foliar spray	2	104.11	3.82	0.04
آب × بذر × محلول پاشی Water*Seed* Foliar spray	2	45.44	1.67	0.21
خطا Error	24	27.22	-	-
ضریب تغییرات (%) (%) CV	-	3.16	-	-

جدول ۴- نتایج تجزیه واریانس اثرات تیمارهای آزمایشی بر غلظت روی اندام هوایی ذرت

Table 4- The results of analysis of variance of the effects of experimental treatments on zinc concentration in shoot of corn

منابع تغییر Source of change	درجه آزادی df	میانگین مربعات M.S	مقدار F F Value	P-Value
آب Water	1	10.03	2.09	0.16
بذر Seed	2	1356.03	282.18	< 0.0001
محلول پاشی Foliar spray	1	24388.01	5074.97	< 0.0001
آب × بذر Water*Seed	2	15.53	3.23	0.06
آب × محلول پاشی Water* Foliar spray	1	476.69	99.20	< 0.0001
بذر × محلول پاشی Seed* Foliar spray	2	496.70	103.36	< 0.0001
آب × بذر × محلول پاشی Water*Seed* Foliar spray	2	7.19	1.50	0.24
خطا Error	24	4.80	-	-
ضریب تغییرات (%) (%) CV	-	3.40	-	-

جدول ۵- نتایج تجزیه واریانس اثرات تیمارهای آزمایشی بر عملکرد خشک اندام هوایی ذرت

Table 5- The results of analysis of variance of the effects of experimental treatments on dry yield of shoot of corn

منابع تغییر Source of change	درجه آزادی df	میانگین مربعات M. S	مقدار F F Value	P-Value
آب Water	1	0.045	0.12	0.73
بذر Seed	2	51.39	67.59	< 0.0001
محلول پاشی Foliar spray	1	35.10	93.46	< 0.0001
آب × بذر Water*Seed	2	0.01	0.04	0.96
آب × محلول پاشی Water* Foliar spray	1	0.098	0.02	0.89
بذر × محلول پاشی Seed* Foliar spray	2	0.47	1.26	0.30
آب × بذر × محلول پاشی Water*Seed* Foliar spray	2	0.005	0.01	0.99
خطا Error	24	0.37	-	-
ضریب تغییرات (%) (%) CV	-	2.54	-	-

گیاهان حاصل از بذر پلاسمائی مرطوب افزایش نشان داد (جدول ۶). با این وجود، غلظت آهن در گیاهان حاصل از بذر غیرپلاسمائی و پلاسمائی خشک اختلاف معنی داری نداشت. غلظت روی و میزان عملکرد نیز روند مشابهی داشتند به طوری که مقدار این دو صفت، در گیاهان حاصل از بذر پلاسمائی مرطوب در مقایسه با گیاهان حاصل از بذر غیرپلاسمائی به طور معنی داری بیشتر بود (جدول ۶).

اثرات اصلی نوع بذر بر غلظت آهن، روی و عملکرد خشک اندام هوایی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع بذر مصرفی، تأثیر معنی داری ($P < 0.05$) بر هر سه صفت مورد بررسی یعنی غلظت آهن، روی و مقدار عملکرد اندام هوایی گیاهان داشت (جدول ۳، ۴ و ۵). غلظت آهن اندام هوایی در گیاهان حاصل از بذر معمولی (غیرپلاسمائی) از ۱۶۳/۱۷ میلی گرم بر کیلوگرم به ۱۷۲/۳۴ میلی گرم بر کیلوگرم در

جدول ۶- مقایسه میانگین اثرات ساده فاکتورها بر غلظت آهن و روی و عملکرد خشک اندام هوایی ذرت

Table 6- Comparison of means for direct effects of factors on iron and zinc concentration at corn shoots

فاکتور Factor	سطح فاکتور Factor level	غلظت آهن Fe Concentration (mg kg ⁻¹)	غلظت روی Zn Concentration (mg kg ⁻¹)	عملکرد Shoot yield (g pot ⁻¹)
آب آبیاری Irrigation Water	آب مقطر Distilled water (Non- activated water)	164.00 ^a	65.05 ^a	24.03 ^a
	آب پلاسمائی PAW	166.22 ^a	64.00 ^a	24.10 ^a
	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	163.17 ^b	56.50 ^c	23.19 ^b
بذر Seed	پلاسمائی خشک Treated with dry plasma	159.83 ^b	60.51 ^b	23.27 ^b
	پلاسمائی مرطوب Treated with wet plasma	172.34 ^a	76.58 ^a	25.75 ^a
محلول پاشی Foliar spray	عدم محلول پاشی Without foliar spray	149.89 ^b	38.50 ^b	23.08 ^b
	محلول پاشی With foliar spray	180.33 ^a	90.55 ^a	25.06 ^a

Means followed by different letters are significantly different (P<0.05) according to Tukey's LSD test.

معنی دار غلظت آهن، روی و میزان عملکرد در مقایسه با گیاهان شاهد گردید (جدول ۳، ۴ و ۵). بر اساس نتایج مقایسات میانگین (جدول ۶) اعمال محلول پاشی، غلظت آهن، روی و مقدار عملکرد را به ترتیب ۲۰، ۱۳۵ و ۹ درصد نسبت به گیاهان شاهد افزایش داد. آرمجو و همکاران (Arazmjoo *et al.* 2018) تأثیر محلول پاشی عناصر آهن و روی (از منبع سولفات این دو عنصر) را بر برخی خصوصیات سه رقم گندم روشن، یک کراس روشن، بم و افق مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنان نشان داد که محلول پاشی عناصر مذکور از طریق افزایش طول سنبله و تعداد دانه در سنبله باعث افزایش عملکرد ارقام مورد بررسی گردید. تأثیر مثبت محلول پاشی آهن و روی با غلظت‌های به ترتیب ۲/۵ و ۵ در هزار، در افزایش عملکرد ذرت نیز گزارش شده است (Yousefpour & Farajzadeh Memari Tabrizi, 2018).

اثر متقابل آب × بذر × محلول پاشی بر غلظت آهن در اندام هوایی

مقایسه میانگین اثرات متقابل آب × بذر × محلول پاشی نشان داد کمترین غلظت آهن (۱۴۷/۶۷ میلی گرم بر کیلوگرم) در شرایط عدم محلول پاشی و در گیاهان حاصل از بذور غیرپلاسمائی که با آب غیرپلاسمائی آبیاری شده بودند مشاهده گردید (تیمار شماره ۱، جدول ۷). در مقابل گیاهان حاصل از بذور پلاسمائی مرطوب و در شرایط محلول پاشی - صرف نظر از اینکه با کدام نوع آب آبیاری شده باشند -

تأثیر مثبت پلاسمائی نمودن بذور (در مجاورت هوا، توان ۶۰ وات و مدت زمان ۱۸۰ ثانیه) بر افزایش عملکرد گندم توسط صابری و همکاران (Sabeti *et al.*, 2022) گزارش شده است. این محققان دریافتند که پلاسمائی نمودن بذور از طریق بهبود برخی خصوصیات بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی نظیر افزایش میزان فتوسنتز سبب بهبود جذب عناصر غذایی و افزایش عملکرد می‌گردد. در مطالعه مشابهی در خصوص تأثیر پلاسمائی بر جذب عناصر غذایی، جیانگ و همکاران (Jiang *et al.*, 2018) افزایش عملکرد گوجه فرنگی تحت تأثیر پلاسمائی را به افزایش جذب عناصر نیتروژن و فسفر مرتبط دانستند. آنان دریافتند که افزایش جذب این دو عنصر در شرایط پلاسمائی، بر اثر افزایش حجم ریشه و سطح برگ صورت گرفت. صفری و همکاران (Safari *et al.*, 2017) گزارش کردند که قرار دادن یک دقیقه‌ای بذور فلفل در معرض پلاسمائی سرد (با ولتاژ ۱۵ کیلوولت، فرکانس ۲۰ کیلوهرتز و توان ۱۰۰ وات)، سبب افزایش معنی دار سطح برگ گیاهان تیمار شده نسبت به شاهد گردیده ولی زمان‌های بیش از یک دقیقه نه تنها خصوصیات رشدی را بهبود نداد، بلکه برخی از صفات مورد بررسی نظیر طول ریشه و ساقه را نیز کاهش داد.

اثرات اصلی محلول پاشی بر غلظت آهن و روی و عملکرد خشک اندام هوایی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمار محلول پاشی باعث افزایش

اثر متقابل آب × بذر × محلول پاشی بر غلظت روی در اندام هوایی

نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات متقابل آب × بذر × محلول پاشی بر غلظت روی اندام هوایی نشان داد که کمترین غلظت روی مربوط به تیمار بذر غیر پلاسمائی، آب غیر پلاسمائی و عدم محلول پاشی بود (تیمار شماره ۱، جدول ۸).

اگرچه مقایسه میانگین اثرات ساده نوع بذر مصرفی بر غلظت روی در اندام هوایی (جدول ۶) نشان داد که پلاسمائی نمودن مرطوب بذور، باعث افزایش معنی دار غلظت روی گردید با این وجود، مقایسات میانگین اثر متقابل آب × بذر × محلول پاشی بر غلظت روی اندام هوایی نشان داد که پلاسمائی نمودن مرطوب بذور، تنها در تیمارهایی که محلول پاشی انجام گرفته باعث افزایش معنی دار غلظت روی در اندام هوایی می گردد (مقایسه تیمار شماره ۲ با شماره ۱۰، جدول ۸) و در تیمارهایی که محلول پاشی صورت نگرفته پلاسمائی نمودن مرطوب بذور تاثیر معنی داری بر افزایش غلظت روی در اندام هوایی نداشت (مقایسه تیمار شماره ۱ با شماره ۹، جدول ۸).

بیشترین غلظت آهن و بیشترین عملکرد را داشتند (تیمارهای شماره ۱۰ و ۱۲، جدول ۷). این نتایج بیانگر آن است که آب پلاسمائی در مقایسه با آب غیر پلاسمائی، تأثیری بر افزایش عملکرد ندارد.

نتایج مقایسات میانگین نشان می دهند که غلظت آهن در گیاهان حاصل از بذور پلاسمائی خشک و بذور معمولی (غیر پلاسمائی) تفاوت معنی داری ندارد. به عبارتی، بذور پلاسمائی شده به روش خشک در مقایسه با بذور غیر پلاسمائی، نتوانست بر افزایش غلظت آهن گیاه تأثیر معنی داری داشته باشد (تیمار شماره ۱ و ۵ یا ۲ و ۶).

رسولی و همکاران (Rasooli et al., 2021) گزارش کردند بسته به مدت زمان قرار گرفتن بذور در شرایط پلاسمائی، تیمار پلاسمائی می تواند اثرات متفاوتی بر جذب عناصر غذایی توسط گیاه داشته باشد. آنان در مطالعه خود مشاهده کردند که قرار گرفتن بذور زیره سبز (*Cuminum cyminum*) به مدت ۵ دقیقه در شرایط پلاسمائی، توانست مقدار جذب عناصر کلسیم و آهن توسط این گیاه را افزایش دهد در صورتی که قرارگیری ۱۰ دقیقه ای بذور در شرایط پلاسمائی، بر جذب آهن تأثیر معنی داری نداشته، حتی جذب عناصر کلسیم و منیزیم را کاهش داد.

جدول ۷- مقایسه میانگین اثر متقابل آب × بذر × محلول پاشی بر غلظت آهن در اندام هوایی

Table 7- Mean comparison of the interaction effects of water × seed × Foliar spray on iron concentration in shoots (means that have no common letters, showed significant difference at 5% level of Tukey test)

شماره تیمار Treatment No.	بذر Seeds	آب آبیاری Irrigation Water	محلول پاشی Foliar Spray	غلظت آهن Fe Conc. (mg kg ⁻¹)
1	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب مقطر Non- activated water	بدون محلول پاشی Without foliar spray	147.67 ^c
2	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب مقطر Non- activated water	محلول پاشی With foliar spray	174.33 ^b
3	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب پلاسمائی PAW	بدون محلول پاشی Without foliar spray	155.00 ^c
4	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب پلاسمائی PAW	محلول پاشی With foliar spray	175.67 ^b
5	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب مقطر Non- activated water	بدون محلول پاشی Without foliar spray	142.68 ^c
6	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب مقطر Non- activated water	محلول پاشی With foliar spray	176.33 ^b
7	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب پلاسمائی PAW	بدون محلول پاشی Without foliar spray	143.67 ^c
8	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب پلاسمائی PAW	محلول پاشی With foliar spray	176.66 ^b
9	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب مقطر Non- activated water	بدون محلول پاشی Without foliar spray	156.68 ^c
10	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب مقطر Non- activated water	محلول پاشی With foliar spray	186.33 ^a
11	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب پلاسمائی PAW	بدون محلول پاشی Without foliar spray	153.67 ^c
12	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب پلاسمائی PAW	محلول پاشی With foliar spray	192.67 ^a

Means followed by different letters are significantly different (P<0.05) according to Tukey's LSD test.

جدول ۸- مقایسه میانگین اثر متقابل آب × بذر × محلول پاشی بر غلظت روی در اندام هوایی

Table 8- Mean comparison of the interaction effects of water × seed × Foliar spray on zinc concentration in shoots (means that have no common letters, showed significant difference at 5% level of Tukey test)

شماره تیمار Treatment No.	بذر Seeds	آب آبیاری Irrigation Water	محلول پاشی Foliar Spray	غلظت روی Zn Conc. (mg kg ⁻¹)
1	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب مقطر Non- activated water	بدون محلول پاشی Without foliar spray	40.60 ^d
2	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب مقطر Non- activated water	محلول پاشی With foliar spray	76.11 ^c
3	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب پلاسمائی PAW	بدون محلول پاشی Without foliar spray	29.00 ^e
4	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب پلاسمائی PAW	محلول پاشی With foliar spray	80.33 ^c
5	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب مقطر Non- activated water	بدون محلول پاشی Without foliar spray	41.68 ^d
6	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب مقطر Non- activated water	محلول پاشی With foliar spray	79.30 ^c
7	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب پلاسمائی PAW	بدون محلول پاشی Without foliar spray	33.33 ^e
8	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب پلاسمائی PAW	محلول پاشی With foliar spray	87.56 ^b
9	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب مقطر Non- activated water	بدون محلول پاشی Without foliar spray	45.67 ^d
10	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب مقطر Non- activated water	محلول پاشی With foliar spray	107.11 ^a
11	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب پلاسمائی PAW	بدون محلول پاشی Without foliar spray	40.67 ^d
12	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب پلاسمائی PAW	محلول پاشی With foliar spray	113.00 ^a

Means followed by different letters are significantly different ($P < 0.05$) according to Tukey's LSD test.

مشابهی که به جای بذر غیر پلاسمائی، بذر پلاسمائی خشک یا مرطوب داشته (تیمار شماره ۵ با تیمار شماره ۹) مقایسه شود مشخص می‌گردد که پلاسمائی نمودن بذر به روش مرطوب می‌تواند باعث افزایش معنی‌دار عملکرد گیاه گردد در صورتی که پلاسمائی نمودن بذر به روش خشک تأثیر معنی‌داری بر عملکرد ندارد.

به نظر می‌رسد که پلاسمائی نمودن بذر به روش مرطوب نتوانست به تنهایی (بدون انجام محلول پاشی) غلظت‌های دو عنصر آهن و روی را به‌طور معنی‌داری افزایش دهد ولی مقدار عملکرد خشک اندام هوایی گیاه را افزایش داد. از این‌رو، می‌توان استنباط کرد که پلاسمائی نمودن مرطوب بذر به طریقی - غیر از بهبود جذب دو عنصر آهن و روی - سبب افزایش عملکرد گردیده است. در تحقیقات مشابهی توسط لینگ و همکاران (Ling et al., 2016) افزایش عملکرد بادام زمینی در اثر تیمار بذر آن با پلاسما، گزارش شده است. این محققان، افزایش وزن ریشه، قطر ساقه و سطح برگ بادام زمینی تحت تأثیر تیمار پلاسمائی را در مقایسه با گیاهان شاهد گزارش کردند. آنان مشاهده کردند که در گیاهان تیمار شده با پلاسما، غلظت نیتروژن برگ و میزان کلروفیل افزایش معنی‌داری داشته، افزایش عملکرد را به افزایش غلظت نیتروژن و کلروفیل نسبت دادند.

بر همین اساس، بالاترین غلظت روی در گیاهانی مشاهده شد که بذر آنها پلاسمائی مرطوب بوده، و همزمان محلول پاشی نیز شده بودند (تیمار شماره ۱۲، جدول ۸). این نتایج مشخص می‌نماید که تأثیر محلول پاشی در افزایش غلظت روی در حضور بذر پلاسمائی مرطوب در مقایسه با بذر غیر پلاسمائی به‌طور معنی‌داری بیشتر است (مقایسه تیمار ۱۲ با تیمار ۴).

همچنین، مقایسه تیمار ۱ با تیمار ۴ و تیمار ۹ با تیمار ۲ بیانگر آن است که پلاسمائی نمودن بذر، نمی‌تواند به منظور افزایش غلظت روی در گیاه، جایگزین روش محلول پاشی گردد.

اثر متقابل آب × بذر × محلول پاشی بر عملکرد خشک اندام هوایی

نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات متقابل آب × بذر × محلول پاشی بر عملکرد اندام هوایی نشان داد که کمترین عملکرد به میزان ۲۲/۶۷۱۸ گرم بر گلدان در شرایط عدم محلول پاشی و در گیاهان حاصل از بذر غیر پلاسمائی که با آب غیر پلاسمائی آبیاری شده بودند مشاهده گردید (تیمار شماره ۱، جدول ۹). در صورتی که تیمار شماره ۱ (بذر غیر پلاسمائی، آب غیر پلاسمائی و عدم محلول پاشی) با تیمارهای

نتیجه گیری

نمودن مرطوب، گرچه سبب افزایش غلظت آهن و روی گیاه نگردید ولی عملکرد را افزایش داد. ذکر این نکته ضروری است که دامنه تأثیر عواملی نظیر فرکانس مورد استفاده و مدت زمان قرارگیری بذور در شرایط پلاسمائی بر نتایج حاصله بسیار گسترده بوده، لذا بهینه سازی روش کار و انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری می باشد.

از نتایج این پژوهش می توان نتیجه گیری نمود که کاربرد آب پلاسمائی و پلاسمائی نمودن بذر ذرت به روش خشک، تأثیری بر افزایش غلظت عناصر آهن، روی و مقدار عملکرد ذرت ندارد. پلاسمائی

جدول ۹- مقایسه میانگین اثر متقابل آب × بذر × محلول پاشی بر عملکرد خشک اندام هوائی

Table 9- Mean comparison of the interaction effects of water × seed × Foliar spray on dry weight (means that have no common letters, showed significant difference at 5% level of Tukey test)

شماره تیمار Treatment No.	بذر Seeds	آب آبیاری Irrigation Water	محلول پاشی Foliar Spray	عملکرد اندام هوائی Shoots D.Wt (g pot ⁻¹)
1	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب مقطر Non- activated water	بدون محلول پاشی Without foliar spray	22.18 ^c
2	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب مقطر Non- activated water	محلول پاشی With foliar spray	24.07 ^b
3	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب پلاسمائی PAW	بدون محلول پاشی Without foliar spray	22.27 ^c
4	غیر پلاسمائی Non-treated (Control)	آب پلاسمائی PAW	محلول پاشی With foliar spray	24.24 ^b
5	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب مقطر Non- activated water	بدون محلول پاشی Without foliar spray	22.51 ^c
6	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب مقطر Non- activated water	محلول پاشی With foliar spray	24.04 ^b
7	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب پلاسمائی PAW	بدون محلول پاشی Without foliar spray	22.43 ^c
8	پلاسمای خشک Treated with dry plasma	آب پلاسمائی PAW	محلول پاشی With foliar spray	24.10 ^b
9	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب مقطر Non- activated water	بدون محلول پاشی Without foliar spray	24.50 ^b
10	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب مقطر Non- activated water	محلول پاشی With foliar spray	26.91 ^a
11	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب پلاسمائی PAW	بدون محلول پاشی Without foliar spray	24.61 ^b
12	پلاسمای مرطوب Treated with wet plasma	آب پلاسمائی PAW	محلول پاشی With foliar spray	26.98 ^a

Means followed by different letters are significantly different (P<0.05) according to Tukey's LSD test.

References

- Arazmjoo, E., Behdani, M.A., Mahmoodi, S., & Sadeghzade, B. (2018). Response of some bread wheat cultivars to foliar application of Zn and Fe different forms in two Locations with different soil properties. *Iranian Journal of Field Crops Research*, 16(1), 203-216. (In Persian with English abstract). <https://doi.org/10.22067/gsc.v16i1.61570>
- Emami, A. (1996). Methods of plant analysis, 982, 80-93. (In persian)
- Goudarzi, S., Ghafoorifard, H., Ghasemi, S.A., & Mazandarani, A. (2021). *The effect of atmospheric cold plasma on the rates of germination and root length and shoot length of sesame seed*. P1-7. In 27th Iranian nuclear conference, 30 February 2021. Nuclear Society of Iran, Mashhad, Iran.
- Hashizume, H., Kitano, H., Mizuno, H., Abe, A., Yuasa, G., Tohno, S., Tanaka, H., Ishikawa, K., Matsumoto, S., Sakakibara, H., Nikawa, S., Maeshima, M., Mizuno, M., & Hori, M. (2020). Improvement of yield and grain quality by periodic cold plasma treatment with rice plants in a paddy field. *Plasma Processes and Polymers*, 18(1), 1-11. <https://doi.org/10.1002/ppap.202000181>
- Iranbakhsh, A., Ghoranneviss, M., Oraghi Ardebili, Z., Oraghi Ardebili, N., Hesami Tackallou, S., & Nikmaram, H. (2017). Non-thermal plasma modified growth and physiology in *Triticum aestivum* via generated signaling molecules and UV radiation. *Biologia Plantarum*, 61, 702-708. <https://doi.org/10.1007/s10535-016-0699-y>
- Jiang, J., Li, J., & Dong, Y. (2018). Effect of cold plasma treatment on seedling growth and nutrient absorption of tomato. *Plasma Science and Technology*, 20(4), 1-4. <https://doi.org/10.1088/2058-6272/aaa0bf>

- 7- Lamichhane, P., Veerana, M., Lim, J.S., Mumtaz., S., Shrestha, B., Kaushik, N.K., Park, G., & Choi, E.H. (2021). Low-temperature plasma-assisted nitrogen fixation for corn plant growth and development. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(10), 1-20. <https://doi.org/10.3390/ijms22105360>
8. Ling, L., Jiangang, L., Minchong, S., Jinfeng, H., Hanliang, S., Yuanhua, D., & Jiafeng, J. (2016). Improving seed germination and peanut yields by cold plasma treatment. *Plasma Science and Technology*, 18(10), 1027-1033. <https://10.1088/1009-0630/18/10/10>
9. Mildaziene, V., Ivankov, A., Pauzaite, G., Naucienė, Z., Zukiene, R., Degutyte-Fomins, L., Pukalskas, A., Venskutonis, P., Filatova, I., & Lyushkevich, V. (2020). Seed treatment with cold plasma and electromagnetic field induces changes in red clover root growth dynamics, flavonoid exudation, and activates nodulation. *Plasma Processes and Polymers*, 18(1), 1-10. <https://doi.org/10.1002/ppap.202000160>
10. Moreno-Jiménez, E., Plaza, C., Saiz, H., Manzano, R., Flagmeier, M., & Maestre, M. (2019). Aridity and reduced soil micronutrient availability in global drylands. *Nature Sustainability*, 2(5), 371-377. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0262-x>
11. Moshiri, F., Ardalan, M., Tehrani, M.M., & Savaghebi, Gh. (2010). Zinc efficiency of wheat cultivars in a calcareous soil with low zinc status. *Journal of Water and Soil*, 24(1), 145-153. (In Persian with English abstract)
12. Nabavi Moghadam, R., Saberi, M.H., & Sayyari, M.H. (2013). Effect of soil application of iron and manganese sulphate on quantitative and qualitative characteristics of forage maize hybrid single cross 704. *Journal of Crop Improvement*, 15(2), 75-86. <https://doi.org/10.22059/jci.2013.36100>
13. Najafi-Ghiri, M., Ghasemi-Fasaee, R., & Farrokhejad, E. (2013). Factors affecting micronutrient availability in calcareous soils of Southern Iran. *Arid Land Research and Management*, 27(3), 203-215. <https://doi.org/10.1080/15324982.2012.719570>
14. Porto, C. L., Ziuzina, D., Los, A., Boehm, D., Palumbo, F., Favia, P., Tiwari, B., Bourke, P., & Cullen, P. (2018). Plasma activated water and airborne ultrasound treatments for enhanced germination and growth of soybean. *Innovative Food Science and Emerging Technologies*, 49, 13-19. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2018.07.013>
- 15-Randeniya, L.K., & Groot, G. (2015). Non-Thermal plasmatareatment of agricultural seeds for stimulation of germination, removal of surface contamination and other benefits: A review. *Plasma Processes and Polymers*, 12, 608-623. <https://doi.org/10.1002/ppap.201500042>
16. Rasooli, Z., Barzin, G., Davari Mahabadi, T., & Entezari, M. (2021). Stimulating effects of cold plasma seed priming on germination and seedling growth of cumin plant. *South African Journal of Botany*, 142, 106-113. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.06.025>
17. Rathore, V., Tiwari, B., & Nema, S. (2022). Treatment of pea seeds with plasma activated water to enhance germination, plant growth, and plant composition. *Plasma Chemistry and Plasma Processing*, 42(1), 109-129. <https://doi.org/10.1007/s11090-021-10211-5>
18. Rathore, V., & Nema, S.K. (2021). Optimization of process parameters to generate plasma activated water and study of physicochemical properties of plasma activated solutions at optimum condition. *Journal of Applied Physics*, 129, 901-924. <https://doi.org/10.1063/5.0033848>
19. Saberi, M., Ghomi, H., & Andreasen, C. (2022). Eco-friendly approach to improve traits of winter wheat by combining cold plasma treatments and carbonization of subtropical biomass waste. *Scientific Reports*, 12, 1-12. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-15286-4>
20. Safari, N., Iranbakhsh, A., & Oraghi ardeblil, Z. (2017). Non-thermal plasma modified growth and differentiation process of *Capsicum annuum* PP805 Godiva in in vitro conditions. *Plasma Science and Technology*, 19(5), 1-6. <https://doi.org/10.1088/2058-6272/aa57ef>
21. Shainsky, N., Dobrynin, D., Ercan, U., Joshi, S.G., Ji, H., Brooks, A., Fridman, G., Cho, Y., Fridman, A., & Friedman, G., 2012. Plasma acid: water treated by dielectric barrier discharge. *Plasma Processes and Polymers*, 9, 6-13. <https://doi.org/10.1002/ppap.201100084>
22. Shahsavandi, F., & Eshghi, S. (2021). Effects of bicarbonate and Fe sources on vegetative growth and physiological traits of four grapevine cultivars. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 52(20), 2401-2413. <https://doi.org/10.1080/00103624.2021.1928172>
23. Yodpitak, S., Mahatheeranont, S., Boonyawan, D., Sookwong, Ph., Roytrakul, S., & Norkaew, O. (2019). Cold plasma treatment to improve germination and enhance the bioactive phytochemical content of germinated brown rice. *Food Chemistry*, 289, 328-339. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.03.061>
24. Yousefpour, A., & Farajzadeh Memari Tabrizi, E. (2018). Evaluation of micronutrient application at different growth stages on yield and yield components and grain quality of Sweet Corn. *Journal of Crop Ecophysiology*, 12(2), 287-302. (In Persian with English abstract)