

Investigation of the effect of biochar on the physical and chemical properties of soil under quinoa cultivation under water and salinity stress conditions

O. Tourajzadeh¹, H. Piri^{2*}, A. Naserin³, M.M. Cahri⁴

1- Phd student, Department of Water Engineering, Faculty of Water and Soil, University of Zabol.

2- Assosiat Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Water and Soil, University of Zabol.

3- Department of Water Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.

4-Assosiat Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Water and Soil, University of Zabol.

*- Corresponding Author Email: H_piri2880@uoz.ac.ir

Introduction

Appropriate and practical use of agricultural waste will reduce the pressure on the environment. Recently, the use of biochar in agricultural land as a source of organic material for plant growth and as a amendment to improve soil properties has been greatly promoted. Due to its unique chemical and physical properties, biochar can be used as a soil conditioner and has many benefits for optimal agricultural and environmental management. Studies have shown that biochar is a useful amendment for improving the physical and chemical properties of soil, effective in maintaining organic matter and soil moisture.

Materials and Methods

This research was conducted with the aim of investigating the effects of biochar on the physical and chemical properties of soil under conditions of water stress and irrigation water salinity. The experiment was carried out in a factorial and completely randomized design with three replications in greenhouse conditions. The treatments include three irrigation water treatments (60, 80, and 100 percent water requirement of the plant, respectively, I1, I2, and I3), three treatments of biochar prepared from northern forest trees at a temperature of 300 degrees Celsius (0, 2, and 4 percent by weight of potting soil, respectively, B1, B2, and B3) and three water quality treatments (with electrical conductivity 1, 4 and 7 dS/m respectively S1, S2 and S3). The pots were weighed every other day and at each level of biochar and salinity, the water deficit up to the agricultural moisture level was calculated based on the changes in the pot's weight. After the end of the growing season (harvesting in the first half of April 1401), in order to investigate the effect of biochar on the amount of soil nutrients and some physical and chemical parameters of the soil under the conditions of water stress and irrigation water salinity, sampling was done from the soil of each pot. The samples were taken to the laboratory and parameters of apparent and actual specific gravity, acidity and salinity of the soil, percentage of nitrogen, phosphorus and potassium absorbable of the soil were measured in the laboratory.

Water productivity

Referring to the yield to irrigation water ratio, is obtained by the following relation (Payero et al., 2009):

$$WP=Y/IR \quad (1)$$

In this equation, WP represents water productivity (kg/m^3), Y denotes the yield (kg/ha), and IR shows the amount of irrigation water (m^3/ha).

Statistical analysis

The analysis of variance for the results obtained from different treatments was conducted using SAS software (SAS 9.1, SAS Institute, Cary, NC, USA). The mean values of the main factors and interactive effects were compared using the Duncan method at the 1% and 5% levels of significance

Results and Discussion

The results showed that the amount of biochar, irrigation water and water salinity and their mutual effects had a significant effect on the measured parameters at the probability level of one and five percent. Adding 2 and 4 mass percent biochar to the soil increases the amount of phosphorus (35 and 60 percent, respectively), potassium (57 and 61 percent), nitrogen (83 and 91 percent), pH (13 and 13 percent) and electrical conductivity of the soil. (EC) (13 and 57 percent). By adding 2% and 4% of biochar to the soil, the actual specific gravity of the soil decreased by 13% and 21%, respectively, and the apparent specific gravity decreased by 11% and 22%, respectively. The actual and apparent specific gravity of the soil decreased by adding biochar to the soil. Decreasing the depth of irrigation water and increasing water salinity increased the amount of phosphorus, potassium, nitrogen, pH and EC of the soil. The amount of irrigation water had no significant effect on the apparent and actual specific gravity, but the salinity of the irrigation water caused a significant increase in the apparent and actual specific gravity of the soil. Although the addition of biochar to the soil increased the nutrients required by plants in the soil, but considering that the addition of this organic matter to the soil at high levels increases the electrical conductivity of the soil, therefore the use of high amounts of biochar in the soil should be careful. According to the results obtained from the research, the use of biochar is recommended as a suitable method for improving the chemical quality and productivity of poor and light soils.

Key words: apparent specific gravity, electrical conductivity, Nitrogen, phosphorus, potassium.

بررسی تأثیر بیوپچار بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش آبی و شوری

ام البنین توراجزاده^۱، حلیمه پیری^{۲*}، امیر ناصرین^۳، محمد مهدی چاری^۴

۱- دانشجوی دکترا، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

۲- دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل.

۳- استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ملاتانی.

۴- دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل.

*- نویسنده مسئول: H_piri2880@uoz.ac.ir

چکیده

استفاده مناسب و کاربردی از ضایعات کشاورزی موجب کاهش فشار بر محیط زیست خواهد شد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات بیوپچار در شرایط تنش آبی و شوری آب آبیاری بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شد. آزمایش در شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل آب آبیاری (۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه به ترتیب، I₁، I₂ و I₃)، بیوپچار تهیه شده از درختان جنگلی شمال در دمای ۳۰۰ درجه سلسیوس (صفر، ۲ و ۴ درصد جرمی خاک گلدان به ترتیب B1، B2 و B3) و کیفیت آب (با قابلیت هدایت الکتریکی ۱، ۴ و ۷ دسی زیمنس بر متر به ترتیب S1، S2 و S3) بود. گلدان‌ها به صورت یک روز در میان توزین شده و کمبود آب تا حد رطوبت زراعی براساس تغییرات جرم گلدان محاسبه شد. بعد از پایان فصل کشت کینوا (برداشت نیمه اول فروردین ۱۴۰۱)، برای بررسی اثر بیوپچار بر میزان عناصر غذایی خاک و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط تنش آبی و شوری آب آبیاری، نمونه برداری از خاک هر گلدان انجام شد. نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل و ویژگی‌های جرم مخصوص ظاهری و حقیقی، pH و شوری خاک، درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل جذب در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد مقدار بیوپچار، آب آبیاری و شوری آب و اثرات متقابل آن‌ها در سطح احتمال یک و پنج درصد بر ویژگی‌های اندازه‌گیری شده تأثیر معنی‌داری داشت. افزودن ۲ و ۴ درصد جرمی بیوپچار به خاک سبب افزایش مقدار فسفر (به ترتیب ۳۵ و ۶۰ درصد)، پتاسیم (۵۷ و ۶۱ درصد)، نیتروژن (۸۳ و ۹۱ درصد)، pH (۱۳ و ۱۳ درصد) و قابلیت هدایت الکتریکی خاک (EC) (۱۳ و ۵۷ درصد) شد. جرم مخصوص حقیقی خاک با افزودن ۲ و ۴ درصد جرمی بیوپچار به خاک به ترتیب ۱۳ و ۲۱ درصد و جرم مخصوص ظاهری به ترتیب ۱۱ و ۲۲ درصد کاهش یافت. کاهش عمق آب آبیاری و افزایش شوری آب باعث افزایش مقدار فسفر، پتاسیم، نیتروژن، pH و EC خاک شد. مقدار آب آبیاری تأثیر معنی‌داری بر جرم مخصوص ظاهری و حقیقی نداشت اما شوری آب آبیاری سبب افزایش معنی‌دار جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک شد. اگر چه افزایش بیوپچار به خاک باعث افزایش عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک شد اما با توجه به این که افزودن این ماده آلی به خاک در سطوح زیاد سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک می‌شود لذا استفاده از مقادیر زیاد بیوپچار در خاک باید با احتیاط انجام شود.

کلمات کلیدی: نیتروژن، فسفر، پتاسیم، قابلیت هدایت الکتریکی، جرم مخصوص ظاهری.

مقدمه

با افزایش جمعیت جهان، نیاز به غذا و تولیدات کشاورزی به شدت در حال افزایش است به طوری که سازمان خوار و بار جهانی پیش بینی کرده است با افزایش جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰، سالانه ۲۰۰ میلیون تن غذا و محصولات کشاورزی مورد نیاز است (Bhupindar, 2014)، اما بر اثر عواملی همچون تغییرات آب و هوا، محدود شدن منابع آب و خاک و افزایش آلودگی محیط زیست مشکلاتی در کشاورزی و تولید مواد غذایی کافی به وجود می آید. در شرایط تنش خشکی و شوری، جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه محدود می شود (Waraich *et al.*, 2013). بنابراین در این شرایط خاک باید بستر مناسبی را برای تأمین نیازهای گیاه به عنوان محیط رشد و نمو فراهم کند. کاربرد کودهای آلی، زیستی و همچنین مواد معدنی طبیعی می تواند موجب اصلاح ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک شوند (Dabhi *et al.*, 2013). عدم مدیریت صحیح خاک موجب شده است تا خاک به تدریج کیفیت و حاصل خیزی خود را از دست داده و به خاک نامرغوب تبدیل شود. بنابراین استفاده از اصلاح کننده هایی که بتواند این شرایط را بهبود بخشیده و از تخریب خاک جلوگیری کند، امری ضروری می باشد. مصرف صحیح و مناسب انواع اصلاح کننده ها مهمترین راه حفظ و اصلاح شرایط حاصل خیزی خاک و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی می باشد (Karmaka *et al.*, 2007). افزودن اصلاح کننده های آلی به خاک در شرایط کمبود آب بسیار مؤثر هستند (Hirich *et al.*, 2013). اخیراً استفاده از بیوپچار در زمین های کشاورزی به عنوان منبع تأمین کننده مواد آلی برای رشد گیاه و اصلاح کننده ای برای بهبود ویژگی های خاک رونق زیادی یافته است (Domene *et al.*, 2014). بیوپچار به دلیل ویژگی های شیمیایی و فیزیکی منحصر به فرد خود، می تواند به عنوان اصلاح کننده خاک مورد استفاده قرار گرفته و فواید بسیاری برای مدیریت بهینه کشاورزی و محیط زیست داشته باشد. بیوپچار ماده جامد سیاه رنگ غنی از کربن پایدار می باشد که در نتیجه سوزاندن مواد آلی در شرایط بدون اکسیژن و یا اکسیژن کم، در دمای کمتر از 700 درجه سلسیوس تولید می شود (Lehmann and Joseph, 2009). مطالعات نشان داده است که بیوپچار یک ماده اصلاح کننده مفید برای بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، مؤثر در حفظ ماده آلی و رطوبت خاک می باشد (Van Zwieten *et al.*, 2013). بیوپچار ویژگی های مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک را تحت تأثیر قرار می دهد. تأثیر بیوپچار بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک توسط محققان مختلف طی دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص شده است که افزودن بیوپچار به خاک کیفیت آن را تغییر می دهد و اغلب سبب افزایش و بهبود کیفیت خاک می شود (Lehmann and Joseph, 2009).

با توجه به پایداری بیوپچار در مقابل تجزیه میکروبی و زمان ماندگاری طولانی آن در خاک، مصرف بیوپچار سبب افزایش سطح مواد آلی خاک به مدت طولانی و در نتیجه بهبود ویژگی های خاک، مخصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک می شود. همچنین، افزودن بیوپچار به عنوان یک ماده اصلاحی به خاک موجب افزایش بازهای تبادل، ظرفیت تبادل کاتیونی و قابلیت دسترسی عناصر غذایی، کاهش جرم مخصوص ظاهری و بهبود ظرفیت نگهداری آب می شود (Liang *et al.*, 2006). بیوپچار به دلیل سطح ویژه زیاد و تراکم بار سطحی بالا، توانایی خاک برای نگهداری عناصر غذایی و آب

قابل استفاده گیاه را افزایش و شستشوی عناصر غذایی و کودها را کاهش می‌دهد (Laird *et al.*, 2010). بیوپچار با کاهش آبشویی عناصر غذایی، سبب افزایش بهبود بهره‌وری کودها شده و با بهبود ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و کاهش مقاومت کششی خاک، موجب نفوذ و رشد بهتر ریشه گیاه می‌شود (Knowles *et al.*, 2011). نجفی‌قیری (Najafi, 2014) تأثیر کاربرد بیوپچار را بر ویژگی‌های خاک و قابلیت جذب عناصر غذایی مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش نشان داد مصرف بیوپچار سبب افزایش معنی‌دار ماده آلی و قابلیت هدایت الکتریکی و پتاسیم محلول و تبادل شد در حالی که قابلیت دسترسی نیتروژن، فسفر، روی و مس تحت تأثیر مصرف بیوپچار قرار نگرفت. نتایج مطالعه دیوبند هفشجانی و همکاران (Deoband Hafeshjani *et al.*, 2016) نشان داد افزودن بیوپچار باگاس نیشکر تهیه شده در ۳۰۰ درجه سلسیوس و در سطوح ۰/۲، ۰/۵، و ۱ درصد جرمی، سبب افزایش معنی‌دار کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل آنیونی، قابلیت هدایت الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک شد.

منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطق مهم و استراتژیک استان است. کمبود آب در دشت سیستان، یک مسئله جدی و دارای اهمیت است. تنها منبع آب منطقه، رودخانه هیرمند است که از کوه‌های بابا یغمای افغانستان سرچشمه می‌گیرد و بحران آب منطقه، ناشی از کمبود آب در این رودخانه است به‌گونه‌ای که عدم تأمین آب هیرمند منجر به نابودی کشاورزی منطقه گردیده است. در این منطقه اراضی زیادی وجود دارد که قابل زرع می‌باشد اما به دلیل کمبود منابع آب به صورت بایر رها شده‌اند. بنابراین باید دنبال راهکاری بود که با حفظ شرایط پایدار در منابع آب و خاک منطقه از لحاظ اقتصادی موجب توسعه کشاورزی شود. تدوین برنامه آبیاری و اعمال مدیریت صحیح آبیاری در این منطقه می‌تواند از زیان‌های ناشی از کمبود منابع آب در منطقه بکاهد. برخی از کشاورزان منطقه برای آبیاری اراضی کشاورزی از چاهک‌های سطحی که در مزارع آن‌ها حفر شده است، استفاده می‌کنند. آب این چاهک‌ها معمولاً از نظر کیفی نامطلوب و شور می‌باشد. استفاده از این آب‌ها سبب کاهش عملکرد گیاهان و در نهایت شوری خاک می‌شود. از طرف دیگر درصد ماده آلی و عناصر غذایی در خاک اراضی سیستان کم می‌باشد. استفاده از بیوپچار به عنوان منبع تأمین کننده ماده آلی برای تأمین مواد غذایی گیاهان و همچنین اصلاح خاک در این منطقه می‌تواند مفید باشد. لذا هدف از این پژوهش بررسی و تعیین سطوح مناسب کاربرد بیوپچار برای خاک‌های اراضی دشت سیستان در شرایط کم‌آبی و شوری آب آبیاری می‌باشد.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه دشت سیستان بود. این منطقه در محدوده طول جغرافیایی ۶۱ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۶۱ درجه و ۴۹ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۵۵ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۰ دقیقه شمالی واقع شده است. این منطقه با اقلیم گرم و خشک دارای متوسط بارندگی سالانه منطقه ۵۵ میلی‌متر و میزان تبخیر سالانه ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میلی‌متر و ارتفاع از سطح دریا ۴۸۹/۲ متر می‌باشد. غالب بافت خاک منطقه لوم شن می‌باشد (Negareh and Latifi, 2018). ابتدا، خاک با بافت لوم شنی از اعماق ۰ تا ۳۰ سانتی‌متری خاک منطقه تهیه شده، هوا خشک شده و سپس از الک ۲ میلی‌متر عبور داده شد. همچنین از آب مورد استفاده نیز جهت تعیین کیفیت آن نمونه‌برداری شد. بیوپچار مورد استفاده در تحقیق از شرکت کربن اکتیو بشل واقع در قائمشهر مازندران خریداری شد. شرکت مورد نظر برای تهیه بیوپچار از شاخ و برگ خشک شده درختان جنگلی استان مازندران استفاده کرده است. ابتدا شاخ و برگ‌های خشک شده بسته‌بندی شده و سپس در دمای ۳۰۰ درجه سلسیوس و در شرایط بدون اکسیژن حرارت داده شده است. نتایج تجزیه آب و خاک و بیوپچار مورد استفاده در جدول ۱ آورده

شده است. برای اندازه‌گیری pH و هدایت الکتریکی بیوچار از نسبت یک به ۱۰ بیوچار با آب مقطر استفاده شد (Guvili et al., 2016).

جدول ۱- برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، آب و بیوچار

Table ۱- Some physical and chemical characteristics of soil, water and biochar

ویژگی‌های اندازه‌گیری شده Measured characteristics	روش اندازه‌گیری	بیوچار Biochar	آب water			خاک soil
			S3	S2	S1	
pH	عصاره‌گیری گل اشباع و pH	7.3	7.12	7.42	7.81	8.3
قابلیت هدایت الکتریکی (dS/m)EC	متر و EC سنج Saturated mud extraction and pH meter and EC meter	6.1	7	4	1	0.58
کربن آلی (درصد) organic carbon (%)	به روش والکی بلک (۱۹۳۴) by the Walky Black method (1934)	57.5	-	-	-	1.36
فسفر (میلی‌گرم در کیلوگرم) (mg/kg) phosphorus	به روش اولسن (اولسن و سومر، ۱۹۹۰) by the Olsen's method (Olsen and Sommer, 1990)	398.65	0.39	0.34	0.26	10.45
پتاسیم (میلی‌گرم در کیلوگرم) (mg/kg) potassium	عصاره‌گیری گل اشباع و روش وستمن (۱۹۹۰) Saturated mud extraction and Westman method (1990)	2375.48	0.74	0.65	0.41	110.63
کلسیم محلول (میلی‌اکی والان در لیتر) Dissolved calcium (meq/L)	عصاره‌گیری گل اشباع و دستگاه فلیم فتومتر (پیج، ۱۹۸۲) Saturated mud extraction and felaim photometer device (Page, 1982)	17.5	14.64	8.25	2.05	0.42
منیزیم محلول (میلی‌اکی والان در لیتر) Dissolved magnesium (meq/L)		11.6	10.16	5.74	2.95	0.75
سدیم محلول (میلی‌اکی والان در لیتر) Dissolved sodium (meq/L)		3.7	18.95	9.87	4.2	0.63

نیتروژن (درصد) Nitrogen (%)	به روش کج‌دال (برمنر، ۱۹۹۶) by the Kjeldahl method (Bremner, 1996)	19.5	-	-	-	0.02
--------------------------------	--	------	---	---	---	------

پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی و به روش فاکتوریل و به صورت گلدانی با سه تکرار در آبان ماه ۱۴۰۰ در گلخانه در شهر بنجار با موقعیت جغرافیایی ۶۱ درجه و ۲۹ دقیقه طول شرقی و ۳۱ درجه و یک دقیقه عرض شمالی اجرا شد. فاکتورها شامل آب آبیاری در سه سطح (۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد مقدار آب آبیاری به ترتیب، I₁، I₂ و I₃)، سه سطح شوری آب آبیاری (۱، ۴ و ۷ دسی زیمنس بر متر به ترتیب S₁، S₂ و S₃) و سه سطح بیوپار (۰، ۲ و ۴ درصد جرمی خاک گلدان به ترتیب B1، B2 و B3) بود. انتخاب سطوح شوری آب آبیاری بر اساس وجود چاهک‌های آب شور در منطقه مورد مطالعه بود که کشاورزان منطقه از آب این چاهک‌ها برای کشاورزی استفاده می‌کنند. مقادیر بیوپار نیز بر اساس مطالعات انجام شده توسط محققین در منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است (Mir et al., 2021). گلدان‌های مورد استفاده در تحقیق گلدان پلاستیکی با قطر و ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر بود. گلدان‌ها با ۵ کیلو خاک عبور داده شده از الک ۲ میلی‌متری و سطوح مختلف بیوپار پر شد. ابتدا گلدان‌ها به صورت کامل اشباع شد. روی گلدان‌ها برای جلوگیری از تبخیر آب پوشانده شد. جرم گلدان بعد از زمانی که آب ثقلی از انتهای گلدان خارج شد، اندازه‌گیری و به عنوان جرم در حالت ظرفیت زراعی در نظر گرفته شد (Mir et al., 2021). در هر گلدان تعداد هشت عدد بذر کینوا رقم Titicaca در نیمه دوم آبان ۱۴۰۰ در عمق ۲ سانتی‌متری از سطح خاک کاشته شد. پس از استقرار گیاه در مرحله چهاربرگی به سه گیاه در گلدان تقلیل یافت. از زمان کاشت تا زمان استقرار گیاهچه، تمام گلدان‌ها به صورت کامل و با آب شیرین و تا حد ظرفیت زراعی آبیاری شد. سپس تیمارهای شوری و کم‌آبیاری اعمال شد. گلدان‌ها به صورت یک روز در میان توزین شده و در هر سطح بیوپار و شوری، کمبود آب تا حد رطوبت براساس تغییرات جرم گلدان محاسبه شد و سپس براساس سطح تیمار آبیاری، آبیاری انجام شد.

بعد از پایان فصل کشت (برداشت نیمه اول فروردین ۱۴۰۱)، برای بررسی اثر بیوپار بر میزان عناصر غذایی قابل جذب خاک و برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط تنش آبی و شوری آب آبیاری، نمونه‌برداری از خاک هر گلدان انجام شد. نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شد. ویژگی‌های جرم مخصوص ظاهری و حقیقی، اسیدیته و شوری خاک، درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. فسفر قابل جذب خاک به روش اولسن (Olsen and Sommers, 1990) و پتاسیم قابل استفاده به وسیله استات آمونیوم عصاره‌گیری شد (Westeman, 1990). غلظت فسفر و پتاسیم به ترتیب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و فلیم فتومتر تعیین شد. درصد نیتروژن کل به روش کج‌دال اندازه‌گیری شد (Bremner, 1996). تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SAS و مقایسه میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام شد. با توجه به این که تحقیق حاضر بعد از کشت کینوا بوده است برای بررسی بهتر نتایج، تاثیر تیمارها بر عملکرد کینوا نیز در جداول ۲ تا ۶ آورده شده است.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس برخی ویژگی‌های اندازه‌گیری شده خاک در جدول ۲ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌گردد اثر مقدار آب آبیاری، شوری و بیوپار و اثرات متقابل آن‌ها بر ویژگی‌ها در سطح احتمال یک و یا پنج درصد معنی‌دار

بوده است. جداول ۳ تا ۶ مقایسه میانگین اثرات ساده و متقابل ویژگی‌های اندازه‌گیری شده را نشان می‌دهند. بیوچار ویژگی‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک توسط محققان مختلف طی دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص شده که افزودن بیوچار به خاک کیفیت آن را تغییر می‌دهد و اغلب بهبود کیفیت خاک را به همراه دارد (Lehmann and Joseph, 2009).

جدول ۲- نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات و درجه آزادی) ویژگی‌های خاک و عملکرد محصول

Table 2- Results of analysis of variance (mean square and degree of freedom) of soil property and crop yield

منابع تغییرات Sources of changes	درجه آزادی Degree of freedom	جرم مخصوص ظاهری Bulk density (gr/cm ³)	جرم مخصوص حقیقی actual density (gr/cm ³)	اسیدیته PH	هدایت الکتریکی EC (dS/m)	نیتروژن Nitrogen (%)	پتاسیم Potassium (mg/kg)	فسفر Phosphorus (mg/kg)	عملکرد Yield (kg/ha)
بیوچار (B) Biochar	2	0.002 *	0.106 *	0.056**	39.69**	0.005**	6345.52**	8.42 **	1151.43**
مقدار آب آبیاری Amount of water									
(I) irrigation	2	0.000 ns	0.828 ns	0.02 *	11.98 *	0.002 *	5716.69**	11.35 *	291.82**
شوری آب آبیاری Salinity of irrigation Water									
(S)	2	0.003 *	1.187 *	0.002 *	27.179**	0.004**	3825.32**	10.26 *	625.84**
I*B	۴	0.014ns	3.226ns	0.03*	4.466 *	0.003*	3196.27 *	9.78 *	48.14*
I*S	۴	0.002 *	0.589 *	0.013 *	1.751 *	0.006**	2873.49 *	5.62 *	16.42*
B*S	4	0.004 *	1.153 *	0.018 *	11.078 *	0.003**	2597.55*	8.54 *	85.29**
I*B*S	۸	0.002 ns	2.194 ns	0.023*	23.543**	0.002*	2358.41 *	6.39 *	124.69**
خطا Error	۱۲	0.003	0.965	0.008	5.136	0.001	19.41	1.32	12.18
ضریب تغییرات Coefficient of (CV) variation	-	10.549	22.668	1.280	19.283	20.510	14.26	16.27	

** و *** معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد، ns عدم معنی‌داری.

*and **significance at the probability level of five percent and one percent, ns non-significance.

عملکرد: مطابق جدول ۳ کاهش عمق آب آبیاری باعث کاهش ۱۱/۹ و ۲۸/۹۶ درصدی عملکرد دانه شد اما این کاهش بین تیمار I3 و I2 معنی‌دار نبود. افزایش تنش آبی منجر به کوچک شدن سطح برگ، کاهش شاخص سطح برگ، کاهش وزن سنبله و کوچک شدن دانه و به دنبال آن کاهش عملکرد دانه شد. گزارشات مختلف بیانگر کاهش عملکرد دانه با افزایش تنش خشکی می‌باشد (Telahigue et al., 2017; Elewa et al., 2017).

اولین نشانه تنش خشکی در گیاهان کاهش فشار تورگور و در ادامه کاهش رشد سلول‌ها می‌باشد. کاهش رشد سلول منجر به کاهش ارتفاع گیاه و کاهش تولید ماده خشک می‌شود. با کاهش رشد سلول، رشد برگ، میزان جذب نور خورشید، فتوسنتز و تولید ماده خشک کاهش می‌یابد (Mohkami et al., 2022). کاربرد ۲ درصد وزنی بیوچار عملکرد دانه را افزایش داد. استفاده بیشتر بیوچار (تیمار B3) عملکرد دانه را افزایش داد اما با تیمار عدم مصرف بیوچار تأثیر معنی‌دار نداشت که به دلیل افزایش شوری حاصل از کاربرد مقادیر زیاد بیوچار می‌باشد. نتایج بررسی تأثیر بیوچار بر شوری خاک که در ادامه به آن پرداخته شده است، موید این موضوع است. سان و همکاران هفت سطح بیوچار را بر روی گیاه گندم مورد ارزیابی قرار دادند. نتیجه مطالعه آن‌ها نشان داد کاربرد ۵ تا ۲۰ تن در هکتار بیوچار باعث افزایش عملکرد گندم شد اما کاربرد بیشتر از آن موجب کاهش عملکرد گندم شد (Sun et al., 2019). محققین بیان داشتند افزایش عملکرد در اثر کاربرد بیوچار در خاک می‌تواند به دلیل اثرات مستقیم (عناصر غذایی موجود در زیست توده که طی فرایند تجزیه حرارتی به بیوچار تبدیل شده) و غیرمستقیم (بهبود ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک) آن باشد (Major et al., 2010). تیمار B2 با ۱۳۸۶/۴۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار B1 با ۹۶۷/۸۶ کیلوگرم در هکتار کمترین مقادیر عملکرد دانه را داشتند. جرم مخصوص ظاهری کم، تخلخل زیاد، ظرفیت تبادل کاتیونی بالا و ظرفیت نگهداری رطوبت قابل ملاحظه‌ی بیوچار باعث افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و حاصلخیزی خاک، افزایش رشد گیاه و عملکرد می‌شود (Fathi and Mirseyed, 2015). محکمی و همکاران (Mohkami et al., 2022) به نتایج مشابهی دست یافتند و بیان کردند استفاده از بیوچار باعث افزایش عملکرد کینوا در شرایط تنش خشکی شد. شوری آب آبیاری باعث کاهش معنی‌دار مقدار عملکرد دانه شد (جدول ۳). آب با کیفیت ۴ دسی‌زیمنس بر متر (تیمار S2) منجر به کاهش ۱۴/۱ درصدی عملکرد دانه شد اما با تیمار S1 تفاوت معنی‌دار نداشت. بنابراین می‌توان گفت کینوا از نظر تحمل شوری آب آبیاری گیاهی نسبتاً مقاوم می‌باشد. تنش شوری باعث افزایش فشار اسمزی، اختلال در جذب آب توسط ریشه، کاهش فتوسنتز گیاه، کاهش مواد فتوسنتزی و در نتیجه کاهش عملکرد دانه می‌شود. القصبی و همکاران (Algoziabi et al., 2015) نشان دادند در شوری‌های بالای ۴ دسی‌زیمنس بر متر عملکرد دانه کینوا کاهش یافت. اثرات متقابل آب آبیاری و بیوچار (جدول ۴) نشان داد در تمام سطوح آب آبیاری با افزایش مصرف بیوچار تا ۲ درصد وزنی عملکرد دانه افزایش یافت. افزایش بیشتر بیوچار (تیمار ۴ درصد وزنی) باعث کاهش عملکرد دانه شد. در سطوح تنش آبی شدید تیمار عدم مصرف بیوچار (B1) عملکرد دانه بیشتری نسبت به تیمار ۴ درصد وزنی بیوچار (B3) داشت. تیمار IIB3 کمترین (۵۴۰/۱۲ کیلوگرم در هکتار) مقدار عملکرد دانه را داشت. می‌توان بیان داشت استفاده از بیوچار با به‌کار بردن آب آبیاری مناسب، باعث فراهم شدن آب و مواد غذایی و در نتیجه رشد بهینه گیاه گردیده است. ابراهیم و همکاران (Ibrahim et al., 2015) به افزایش

بیشتر عملکرد کاه و کلس در تیمارهای حاوی بیوپچار و آبیاری بر اساس ۸۰ درصد نیاز آبی گیاه در مقایسه با تیمارهای بدون بیوپچار و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه اشاره کردند که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. در تحقیق حاضر نیز عملکرد دانه (۱۱۸۶/۶۱ کیلوگرم در هکتار) در تیمار I2B2 (۸۰ درصد نیاز آبی گیاه و استفاده ۲ درصد وزنی بیوپچار) بیشتر از عملکرد دانه (۹۸۶/۲۷ کیلوگرم در هکتار) در تیمار I3B1 (۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم استفاده از بیوپچار) بود. اثر متقابل آب آبیاری و شوری (جدول ۶) نشان داد با افزایش شوری آب آبیاری و کاهش عمق آب مصرفی عملکرد دانه کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه (۱۳۳۴/۵۷ کیلوگرم در هکتار) از تیمار I3S1 مشاهده شد. تیمار I2S1 با مقدار ۱۳۲۶/۸۵ کیلوگرم در هکتار در رتبه بعدی قرار گرفت که تفاوت معنی دار با تیمار I3S1 نداشت. در تنش های آبی بالا استفاده از آب با کیفیت پایین باعث کاهش شدیدتر عملکرد شد. یکی از دلایل کاهش عملکرد را می توان به کاهش فتوسنتز در نتیجه تنش حاصل از تجمع نمک در محدوده ریشه نسبت داد که این مسأله می تواند در نتیجه کاهش ورود دی اکسید کربن به دلیل کاهش هدایت روزنه و همچنین کاهش سطح برگ باشد (Netondo et al., 2004). از سوی دیگر، افزایش پتانسیل اسمزی در نتیجه ی حضور نمک در محدوده ریشه و کاهش آن در سلول های گیاهی، موجب تغییر در مسیر انتقال فرآورده های فتوسنتزی و تجمع آن در سلول های ریشه برای مقابله با تنش حاصله خواهد شد. به عبارت دیگر، کاهش انرژی آزاد آب در خاک گیاه را وادار خواهد کرد تا برای جذب آب انرژی بیشتری صرف کند که این امر مستلزم افزایش پتانسیل اسمزی در سلول های گیاهی با تجمع مواد قندی در آن است. تجمع مواد آلی ساخته شده در سلول های ریشه به منظور تنظیم اسمزی و مقابله با اثرات مخرب شوری در جذب آب، انتقال آن به سایر اندام های هوایی و متعاقباً رشد رویشی را محدود ساخته و در نهایت منتج به کاهش عملکرد خواهد شد (Piri et al., 2016). اثر متقابل بیوپچار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد با کاربرد آب شور (تیمار S2 و S3) و افزایش بیوپچار مصرفی عملکرد دانه کاهش یافت. تیمار B2S1 (آب غیرشور و ۲ درصد وزنی بیوپچار) عملکرد دانه (۱۳۰۲/۵۳ کیلوگرم در هکتار) بالاتری نسبت به تیمار B1S1 (آب غیرشور و عدم مصرف بیوپچار) داشت. بنابراین می توان گفت در شرایط استفاده از آب شیرین بیوپچار می تواند عملکرد دانه را افزایش دهد. در شرایط استفاده از آب شور با شوری S2 و S3 عملکرد دانه در تیمارهای عدم استفاده بیوپچار (تیمارهای B1S2 و B1S3) بیشتر از تیمار ۲ و ۴ درصد وزنی بیوپچار بود اما از این نظر با عملکرد دانه تیمارهایی که ۲ درصد وزنی بیوپچار داشتند (تیمارهای B2S2 و B2S3) تفاوت معنی دار نداشت.

فسفر: مطابق جدول ۳ اثرات مقدار بیوپچار بر قابلیت استفاده فسفر در خاک در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. با کاربرد بیوپچار مقدار فسفر قابل جذب افزایش یافت. بیشترین مقدار فسفر (۲۴/۸۴ میلی گرم در کیلوگرم خاک) در تیمار مصرف ۴ درصد جرمی بیوپچار به دست آمد. مصرف ۲ درصد جرمی بیوپچار با مصرف ۴ درصد

جرمی تفاوت معنی دار با هم نداشتند. افزایش فسفر قابل جذب در تیمارهای حاوی بیوچار می تواند به دلیل تجزیه بیوچار و تشکیل کمپلکس های آلی قویتری با کلسیم، آهن و آلومینیوم در مقایسه با فسفر ایجاد کنند و موجب کاهش سرعت رسوب فسفر تغییر شکل آن شوند. به علاوه، ایجاد پوشش محافظ در سطح ذرات توسط هوموس ظرفیت تثبیت فسفر این ذرات را کاهش می دهد (Kang et al., 2008). بیوچار می تواند قابلیت استفاده فسفر را از طریق جذب سطحی و افزایش ظرفیت تبادل آنیونی خاک، افزایش دهد (Chintala et al., 2014) و از طرفی بیوچار به دلیل اندوخته زیاد فسفر، به طور مستقیم نیز فسفر آزاد می کند و سبب افزایش فسفر خاک می شود (Zahoor et al., 2017). شیرمردی و توفیقی (Shirmardi and Tofighi, 2014) بیان کردند افزودن ماده آلی به خاک موجب افزایش بازیابی فسفر اضافه شده به خاک می شود. حسن پور و همکاران (Hasanpour et al., 2022) بیان کردند اضافه کردن بیوچار در خاک های لوم شنی سبب افزایش معنی دار فسفر قابل جذب خاک نسبت به تیمار شاهد شد که به دلیل وجود ذخیره فسفر در بیوچار کاربردی است. فروهر و همکاران (Forohar et al., 2017) در تحقیق خود بیان داشتند استفاده از بیوچار کود گاوی در خاک های آهکی مقدار فسفر خاک را از $\frac{7}{4}$ میلی گرم در کیلوگرم خاک به مقدار $\frac{40}{7}$ میلی گرم در کیلوگرم خاک افزایش داد و علت آن را بالا بودن مقدار فسفر موجود در بیوچار کود گاوی (۸۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک) بیان کردند. ثقفی و همکاران (Thaghafi et al., 2021) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که افزودن بیوچار خرما به خاک شور بر مقدار فسفر خاک تأثیر معنی دار نداشت که با نتایج این تحقیق و تحقیقات قبلی که افزایش فسفر خاک را گزارش کردند (He et al., 2017; 2018; Lou et al., 2018)، مطابقت نداشت. ایشان بیان کردند احتمالاً این اختلاف نتیجه نوع بیوچار متفاوتی است که در پژوهش استفاده شده است. همچنین محتوای فسفر بیوچار مورد استفاده در تحقیق کمتر از مقدار فسفر خاک شاهد بود و بنابراین نمیتوانسته است مقدار فسفر خاک را افزایش دهد. ژانگ و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که افزودن بیوچار گاو و کلش برنج در سطح ۵ درصد منجر به افزایش معنی دار و $\frac{13}{8}$ درصدی فسفر قابل استفاده نسبت به تیمار بدون بیوچار شد (Zhang et al., 2015). مطالعات نشان داده است افزودن اصلاح کننده های آلی به خاک مانند بیوچار سبب افزایش عناصر غذایی خاک، بهبود حاصلخیزی و افزایش تولید محصولات می شود (Zhang et al., 2015). با افزایش سطوح خشکی از تنش ملایم به شدید مقدار فسفر قابل جذب خاک افزایش یافت. با افزایش عمق آب آبیاری از ۶۰ درصد (تیمار I1) به ۱۰۰ درصد (تیمار I3) مقدار فسفر $\frac{18}{43}$ درصد کاهش یافت. بین تیمارهای ۶۰ و ۸۰ درصد آب آبیاری (I2 و I1) از نظر مقدار فسفر تفاوت معنی دار مشاهده نشد. آب آبیاری باعث شستشوی مواد غذایی و کودها و کاهش مقدار فسفر شد. مطابق جدول ۳ با افزایش شوری مقدار فسفر افزایش یافت. تیمار آب با کیفیت ۷ دسی زیمنس بر متر (تیمار S3) بیشترین مقدار فسفر ($\frac{24}{84}$ میلی گرم در کیلوگرم خاک) را داشت. دلیل آن را می توان زیادتر بودن نسبت عناصر

موجود در آب شور دانست. اثر متقابل آب آبیاری و بیوپچار (جدول ۴) نشان داد با افزایش مقدار بیوپچار کاربردی و کاهش عمق آب آبیاری مقدار فسفر افزایش یافت. مطابق جدول ۴ در هر کدام از سطوح آب آبیاری تیمارهایی که بیوپچار در آن‌ها به کار رفته بود، مقادیر فسفر بیشتری داشتند. به عنوان نمونه مقدار فسفر (۲۱/۷۱ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) در تیمار ۱۰۰ درصد نیاز آبی و کاربرد ۴ درصد جرمی بیوپچار (تیمار I3B3) بیشتر از تیمار ۱۰۰ درصد نیاز آبی و عدم مصرف بیوپچار (تیمار I3B1) (۱۷/۵۵ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) بود. کودهای آلی با افزایش قدرت نگهداری آب مانع شستشوی عناصر غذایی از خاک می‌شوند و در نتیجه ماندگاری عناصر غذایی در خاک افزایش می‌یابد، همچنین مواد آلی با افزایش فعالیت میکروبی سبب افزایش حلالیت عناصری مانند فسفر در خاک می‌شوند (Agegnehu et al., 2016). یائو و همکاران (Yao et al., 2009) نشان دادند با افزودن بیوپچار تولید شده از کود حیوانی به خاک فرسول، فسفر قابل جذب گیاه در خاک افزایش یافت. اثر متقابل بیوپچار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد با افزایش شوری آب آبیاری و بیوپچار مصرفی مقدار فسفر افزایش یافت. بیشترین مقدار فسفر (۲۴/۹۹ میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) از تیمار A3C3 (۴ درصد جرمی بیوپچار و شوری ۷ دسی‌زیمنس بر متر) به دست آمد که با تیمار A2C3 (۲ درصد جرمی بیوپچار و شوری ۷ دسی‌زیمنس بر متر) تفاوت معنی‌دار نداشت. اثر متقابل آب آبیاری و شوری (جدول ۶) نشان داد در هر یک از سطوح شوری آب آبیاری با کاهش عمق آب آبیاری مقدار فسفر افزایش یافت. دلیل این موضوع را می‌توان شستشوی مواد غذایی خاک در اثر کاربرد سطوح زیادتر آب دانست. بیشترین مقدار فسفر (۲۴/۶۹ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) از تیمار B1C3 (۶۰ درصد آب آبیاری و ۷ دسی‌زیمنس بر متر شوری آب) به دست آمد که با تیمار B2C3 تفاوت معنی‌دار نداشت.

پتاسیم: مطابق جدول ۲ اثرات آب آبیاری، بیوپچار و شوری آب آبیاری و اثرات متقابل آن‌ها در سطح احتمال یک و پنج درصد بر مقدار پتاسیم خاک تأثیر معنی‌دار داشت. با افزایش بیوپچار مصرفی مقدار پتاسیم افزایش یافت. افزودن ۲ و ۴ درصد جرمی بیوپچار به خاک به ترتیب سبب افزایش ۶۸/۹۲ و ۷۷/۹۹ درصد پتاسیم نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد بیوپچار) شد. تفاوت معنی‌داری بین مقدار پتاسیم در تیمار ۲ و ۴ درصد جرمی بیوپچار مشاهده نشد. با کاربرد بیوپچار در خاک، پتاسیم موجود در آن وارد فاز محلول و به دلیل تعادل بین پتاسیم محلول و تبادل مقداری نیز وارد از تبادل می‌شود و در نتیجه هر دو شکل محلول و تبادل پتاسیم افزایش می‌یابد (Rahimi-Alashti et al., 2021). ابریشمکش و همکاران (Abrishamkesh et al., 2015) بیان کردند بیوپچار شلتوک برنج اضافه شده با خاک با بافت لوم رسی، سبب افزایش پتاسیم قابل جذب نسبت به تیمار شاهد شد. فروهر و همکاران (Forohar et al., 2017) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند کاربرد بیوپچار کود گاوی در خاک آهکی مقدار پتاسیم خاک را از ۷۵ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک به ۳۹۰ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک افزایش داد. ایشان بیان

داشتند این امر می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر بیوچار کود گاوی بر فرایندهای جذب و رهاسازی پتاسیم و هدایت این واکنش‌ها به سمت رهاسازی بیشتر پتاسیم از منابع خاکی آن باشد. وانگ و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که مصرف بیوچار در خاک سبب افزایش رشد باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم در خاک شده و میزان پتاسیم قابل جذب در خاک را افزایش می‌دهد (Wang et al., 2018). در مطالعه دیگر ژانگ و همکاران به این نتیجه رسیدند که با کاربرد دو درصد بیوچار، میزان مصرف کود پتاسه به اندازه ۴۰ درصد کاهش یافته است زیرا بیوچار با تغییر ساختار کانی‌های رسی و افزایش جمعیت میکروبی خاک، تبدیل پتاسیم کندرها را به پتاسیم قابل دسترس تسریع می‌بخشد (Zhang et al., 2020). وجود مقدار زیادی پتاسیم در بیوچار آن را به عنوان یک منبع پتاسیم آلی خیلی مفید برای گیاه معرفی کرده که می‌تواند رشد و عملکرد گیاه را افزایش دهد (Gopal et al., 2020). پتاسیم یکی از عناصر پرمصرف گیاهی است و کمبود آن در خاک‌های ایران رو به گسترش است (Najafi-Ghiri et al., 2011). بیوچار می‌تواند به عنوان ماده اصلاح‌کننده برای بهبود وضعیت حاصل‌خیزی پتاسیم خاک‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. موخرجی و همکاران (Mukherjee et al., 2013) بیان داشتند که بیوچار دارای دامنه‌ای از شکل‌های عناصر غذایی می‌باشد که با سرعت‌های متفاوتی آزاد شده و تأثیرات متفاوتی را بر حاصلخیزی خاک دارند. پژوهشگران گزارش کردند بیوچار حاصل از سیوس برنج می‌تواند میزان پتاسیم قابل تبادل خاک را افزایش دهد (Mensah et al., 2018). نجفی‌قیری و همکاران (Najafi-Ghiri et al., 2011) نیز در پژوهشی دریافتند که کاربرد بقایای گیاهی و بیوچار آنها می‌تواند علاوه بر افزایش مقدار ماده آلی خاک، وضعیت پتاسیم خاک را بهبود بخشد. ایشان بیان کردند که کاربرد برگ آتریپلکس، برگ کنار و بقایای نی و بیوچار آنها تأثیر زیادی بر پتاسیم خاک داشته و مقدار همه شکل‌های پتاسیم را افزایش می‌دهد. ثقفی و همکاران (Thaghafi et al., 2021) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که افزودن ۱/۵ و ۲ درصد وزنی بیوچار خرما به خاک شور موجب افزایش به ترتیب ۱۲/۳۳ و ۱۸/۷۹ درصدی پتاسیم خاک نسبت به تیمار شاهد شد. ایشان بیان داشتند تفاوت در روند افزایش پتاسیم در سطوح مختلف بیوچار احتمالاً مربوط به تثبیت پتاسیم در سطوح پایین کاربرد بیوچار و کاهش یافتن میزان تثبیت در سطوح با نظیر ۲٪ باشد. به بیان ساده‌تر، در سطوح پایین کاربرد بیوچار، اکثر پتاسیم آزاد شده از بیوچار به درون خاک وارد فازهایی غیر از محلول شده (فازهایی از قبیل تبادل و حتی تثبیت در فضای بین لایه‌ای رس‌ها) و در نتیجه افزایش پتاسیم محلول کمتر نمود داشته است. اما در سطوح بالای کاربرد بیوچار احتمالاً با کاهش میزان تثبیت پتاسیم، بیشتر پتاسیم محلول خاک را متأثر کرده و در نتیجه افزایش‌های قابل توجهی در سطوح بالای کاربرد بیوچار مشاهده شد. افزایش عمق آب آبیاری به دلیل شستشوی مواد غذایی سبب کاهش مقدار پتاسیم خاک شد. بیشترین مقدار پتاسیم (۱۷۵/۳۴ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) از تیمار ۶۰ درصد آب آبیاری مشاهده شد که با تیمار ۸۰ درصد آب آبیاری تفاوت معنی‌دار

نداشت. با افزایش رطوبت، گیاه میزان پتاسیم زیادی جذب کرده و به این دلیل خاک میزان پتاسیم کمتری را نشان داده است. این مطلب با نتایج حسینی و همکاران که گزارش نمودند با افزایش رشد و توسعه ریشه گیاه، میزان جذب پتاسیم به وسیله گیاه افزایش می‌یابد که در نتیجه میزان پتاسیم قابل جذب در خاک کاهش می‌یابد، مطابقت دارد (Hosseini et al., 2015). افزایش شوری آب آبیاری نیز سبب افزایش مقدار پتاسیم شد. اثرات متقابل بیوپچار و آب آبیاری (جدول ۴) نشان داد با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش بیوپچار مصرفی مقدار پتاسیم افزایش یافت. بیشترین مقدار پتاسیم (۲۱۸/۱۳ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) از تیمار B3I1 و کمترین آن (۱۲۸/۹۱ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) از تیمار B1I3 به دست آمد. ساختار متخلخل بیوپچار سبب سطح ویژه زیاد آن و در خاک سبب افزایش ظرفیت نگهداری مواد مغذی خاک می‌گردد. علاوه بر این بیوپچار، ظرفیت ماندگاری مواد مغذی را در خاک بهبود می‌بخشد و از آشفته‌گویی آن‌ها در محیط خاک جلوگیری می‌کند. این موضوع می‌تواند به دو دلیل باشد؛ اول این‌که مواد مغذی در منافذ کربنی شده به دام می‌افتد و دوم این‌که اکسیداسیون زیستی آهسته سبب تولید گروه‌های کربوکسیل در حاشیه بیوپچار می‌شود که ظرفیت نگهداری مواد مغذی را افزایش می‌دهد (Robbiani, 2013). تغییرات و پایداری بیوپچار در خاک، تحت تأثیر وضعیت رطوبت خاک قرار می‌گیرد و وضعیت رطوبت خاک ممکن است معدنی شدن و تصاعد کربن بیوپچار را در شرایط مختلف خاک تحت تأثیر قرار دهد که در این رابطه نیاز به پژوهش‌های بیشتری می‌باشد (Cheng et al., 2008). اثرات متقابل بیوپچار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد با افزایش شوری و افزایش بیوپچار مصرفی مقدار پتاسیم افزایش یافت. در تمامی سطوح شوری تفاوت معنی‌داری بین مقادیر پتاسیم با کاربرد ۲ و ۴ درصد جرمی بیوپچار مشاهده نشد. بیوپچار اثرات تنش شوری را با جذب سدیم از محلول خاک کاهش می‌دهد (Akhtar et al., 2015). پژوهش‌ها نشان داده است سدیم و پتاسیم با یکدیگر حالت رقابتی دارند. بیوپچار سبب کاهش جذب سدیم و افزایش پتاسیم شده و مقاومت به شوری را افزایش می‌دهد (Rajabi et al., 2017). اثرات متقابل آب آبیاری و شوری (جدول ۶) نشان داد با افزایش شوری و کاهش عمق آب آبیاری مقدار پتاسیم افزایش یافت. با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش شوری، جذب آب توسط گیاه به دلیل کاهش رطوبت خاک و افزایش شوری آن، کاهش می‌یابد. بنابراین جذب پتاسیم توسط گیاه نیز کاهش می‌یابد و پتاسیم بیشتری در خاک باقی می‌ماند.

درصد نیتروژن: مقدار بیوپچار، آب آبیاری و شوری آب و اثرات متقابل آن‌ها تأثیر معنی‌داری بر مقدار درصد نیتروژن خاک داشت. با افزودن بیوپچار به خاک مقدار نیتروژن خاک افزایش یافت. افزایش نیتروژن خاک می‌تواند به دلیل وجود نیتروژن در بیوپچار باشد. حسن‌پور و همکاران (Hasanpour et al., 2021) در بررسی تأثیر بیوپچار بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و قابلیت جذب عناصر غذایی خاک در منطقه اصفهان به این نتیجه رسیدند که نیتروژن موجود در بیوپچار در خاک آزاد شده و موجب افزایش نیتروژن خاک می‌شود. موخرجی و همکاران

(Mukhrejee *et al.*, 2013) بیان داشتند اضافه کردند. بیوپچار چمن به خاک با بافت شنی و لوم رسی موجب آزاد شدن نیتروژن در خاک و افزایش نیتروژن خاک می‌شود. همچنین نلیسن و همکاران (Nelisen *et al.*, 2012) با افزودن بیوپچار ذرت به خاک به نتایج مشابهی دست یافتند. افزایش عمق آب آبیاری سبب کاهش مقدار نیتروژن خاک شد. بیشترین مقدار نیتروژن (۰/۲۶ درصد) در تیمار ۶۰ درصد عمق آب آبیاری به دست آمد که تفاوت معنی‌داری با تیمار ۸۰ درصد نداشت. شوری آب آبیاری نیز سبب افزایش درصد نیتروژن خاک شد. اثر متقابل آب آبیاری و بیوپچار بر مقدار نیتروژن در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار بود (جدول ۴). در تمامی سطوح آب آبیاری افزودن بیوپچار به خاک سبب افزایش درصد نیتروژن خاک شد. اثر متقابل بیوپچار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد افزایش شوری آب و افزودن بیوپچار سبب افزایش درصد نیتروژن خاک شد. بیشترین درصد نیتروژن (۰/۲۴ درصد) از تیمار B3S3 مشاهده شد که با تیمار B2S3 تفاوت معنی‌دار نداشت. افزایش نیتروژن خاک به دلیل زیاد بودن نیتروژن بیوپچار می‌باشد که با اختلاط در خاک سبب افزایش نیتروژن خاک شد. اثر متقابل شوری و مقدار آب آبیاری (جدول ۶) نشان داد با افزایش شوری و کاهش عمق آب آبیاری درصد نیتروژن خاک افزایش یافت.

pH: مطابق جدول ۳ مقدار بیوپچار، آب آبیاری و شوری آب و اثرات متقابل آن‌ها بر مقدار pH خاک تأثیر معنی‌داری داشت. pH خاک با افزایش بیوپچار افزایش یافت. کاربرد ۲ و ۴ درصد جرمی بیوپچار به ترتیب سبب افزایش ۱۳/۲۸ و ۱۳/۸۹ درصدی pH خاک شد. بیوپچار به دلیل داشتن عناصر قلیایی مانند کلسیم و منیزیم دارای pH خنثی تا قلیایی می‌باشد. pH بیوپچار بسته به نوع ماده آلی و شرایط گرماکافت آن از ۴ تا ۱۲ تغییر می‌کند. بیوپچارهای با منشأ چوبی نسبت به بیوپچارهای علفی pH کمتری دارند. بیوپچارهای علفی به دلیل داشتن عناصر قلیایی مانند سدیم و پتاسیم بیشتر دارای pH زیادتری می‌باشند (Sing *et al.*, 2010). بنابراین می‌توان گفت اضافه کردن بیوپچار با pH زیاد، سبب افزایش pH خاک می‌شود. چیتتالا و همکاران در پژوهش خود مشاهده کردند که افزودن بیوپچار تولید شده از علوفه ذرت به خاک اسیدی، سبب افزایش pH خاک شد (Chintala *et al.*, 2013). زلفی باوریانی و همکاران (Zolfi Bavariani *et al.*, 2015) نشان دادند افزودن بیوپچارکود مرغی باعث افزایش معنی‌دار pH، قابلیت هدایت الکتریکی، ماده آلی خاک، پتاسیم و فسفر قابل دسترس شد و بیشترین میزان عناصر قابل جذب در بیوپچار تهیه شده در ۳۰۰ درجه سلسیوس مشاهده شد. با توجه به این‌که خاک‌های منطقه سیستان آهکی و قلیایی می‌باشد و بیوپچار سبب افزایش pH خاک می‌شود بنابراین استفاده از بیوپچار در این مناطق دارای محدودیت است. افزایش عمق آب آبیاری سبب کاهش pH خاک شد. اما از این نظر تفاوت معنی‌داری بین تیمارها حاصل نشد. افزایش شوری آب آبیاری سبب افزایش pH خاک شد. احتمالاً افزایش املاح ناشی از افزایش شوری آب آبیاری سبب افزایش pH خاک شد. اثر متقابل بیوپچار و مقدار آب آبیاری (جدول

۴) نشان داد در تمام سطوح آبیاری افزودن بیوپچار به خاک سبب افزایش pH خاک شد. تیمار B3I1 با ۹/۳۶ بیشترین و تیمار B1I3 با مقدار ۷/۶۸ کمترین مقادیر pH خاک را داشتند. اثرات متقابل بیوپچار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد با افزایش شوری آب آبیاری و افزودن بیوپچار به خاک مقدار pH خاک افزایش یافت. بیشترین مقدار pH خاک (۹/۹۴) از تیمار B3S3 و کمترین آن (۸/۱۱) از تیمار B1S1 به دست آمد. دلیل این امر افزایش املاح خاک در اثر استفاده از بیوپچار و آب شور می‌باشد. اثرات متقابل آب آبیاری و شوری (جدول ۶) نشان داد با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش شوری آب مقدار pH خاک افزایش یافت. تیمار I1S3 بیشترین مقدار pH خاک (۸/۹۸) را داشت که با تیمار I2S3 (۸/۲۶) تفاوت معنی‌دار نداشت. افزایش شوری سبب افزایش املاح خاک و کاهش عمق آب آبیاری از آبسویی املاح جلوگیری می‌کند. املاح در خاک تجمع می‌یابد و بنابراین pH خاک افزایش یافت. محمودآبادی (Mahmoodabadi, 2018) بیان کرد استفاده از آب حاوی سدیم سبب افزایش pH و ESP خاک می‌شود. با افزایش سدیم SAR خاک افزایش یافته و pH زیاد می‌شود.

EC: افزودن ۴ درصد جرمی بیوپچار به خاک سبب افزایش ۲/۳۵ برابری شوری خاک نسبت به تیمار شاهد شد. نتایج پژوهش نشان داد (جدول ۳) تیمارهای ۲ و ۴ درصد جرمی بیوپچار به ترتیب سبب افزایش معنی‌دار درصد قابلیت هدایت الکتریکی خاک نسبت به تیمار شاهد شد. چیتتالا و همکاران نیز بیان کردند افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک در اثر کاربرد بیوپچار به دلیل حضور نمک‌های محلول در بیوپچار و زیادتر بودن قابلیت هدایت الکتریکی آن نسبت به قابلیت هدایت الکتریکی خاک می‌باشد (Chintala *et al.*, 2013). قربانی و امیراحمدی (Ghorbani and Amir Ahmadi, 2017) در پژوهش خود گزارش کردند اختلاط بیوپچار به خاک سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک می‌شود و دلیل آن را قابلیت بیوپچار در جمع‌آوری مواد مغذی خاک به واسطه سطح ویژه زیاد آن بیان کردند. دیوبند هفشجانی و همکاران (Deoband Hafeshjani *et al.*, 2016) نشان دادند که کاربرد بیوپچار باگاس نیشکر سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک شد. آنان دلیل آن را حضور نمک‌های محلول در بیوپچار و زیادتر بودن قابلیت هدایت الکتریکی آن نسبت به قابلیت هدایت الکتریکی خاک دانستند (Deoband Hafeshjani *et al.*, 2016). افزایش عمق آب آبیاری سبب کاهش شوری خاک شد. تفاوت معنی‌داری از نظر شوری خاک بین تیمارهای ۱۰۰ و ۸۰ درصد عمق آب آبیاری مشاهده نشد. تیمار ۶۰ درصد آب آبیاری نسبت به تیمار ۱۰۰ درصد آب آبیاری ۵۲/۲۶ درصد شوری خاک را افزایش داد. افزایش شوری آب آبیاری سبب افزایش شوری خاک شد. تیمار ۷ دسی زیمنس بر متر شوری آب سبب افزایش ۹۰/۵۱ درصدی شوری خاک نسبت به تیمار ۱ دسی زیمنس بر متر شد. اثر متقابل آب آبیاری و بیوپچار (جدول ۴) نشان داد با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش مقدار بیوپچار مصرفی شوری خاک افزایش یافت. در تمامی سطوح آب آبیاری افزودن بیوپچار به خاک سبب افزایش شوری خاک شد. اثر متقابل بیوپچار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد با

افزایش شوری آب آبیاری و افزایش بیوپچار مصرفی شوری خاک افزایش یافت. تیمار B3S3 با ۲۰/۶۵ دسی زیمنس بر متر بیشترین شوری خاک را داشت که با تیمار B2S3 تفاوت معنی‌دار نداشت. رضایی و همکاران (Rezaei et al., 2017) در پژوهشی بیان کردند افزایش شوری آب آبیاری و کاربرد بیوپچار در خاک سبب افزایش غلظت عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم در خاک شده و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک را افزایش دادند. اثر متقابل شوری و مقدار آب آبیاری (جدول ۶) نشان داد با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش شوری آب مقدار شوری خاک افزایش یافت. تیمار I1S3 با ۲۰/۱۴ دسی زیمنس بر متر بیشترین مقدار شوری خاک را داشت که با تیمار I2S3 تفاوت معنی‌دار نداشت.

جرم مخصوص ظاهری و حقیقی: جرم مخصوص ظاهری شاخص مهمی از لحاظ ساختمان خاک، تراکم و کیفیت آن می‌باشد. جرم مخصوص ظاهری بر تعامل گیاه و خاک از قبیل عمق ریشه‌دوانی، انتقال اکسیژن و سایر گازها، نفوذ و دسترسی آب و فعالیت موجودات خاکزی تأثیر می‌گذارد. بیوپچار با کاهش جرم مخصوص خاک به پایداری خاکدانه کمک می‌کند (Blanco-Canqui, 2017). بیوپچار بعد از افزوده شدن به خاک، بر اثر هوادهی و قرار گرفتن در معرض فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، با گذشت زمان به ذرات کوچکتر تبدیل شده و می‌تواند توزیع اندازه ذرات خاک را تغییر دهد (Brodowski et al., 2007). همچنین با افزایش کربن آلی، تخلخل و سطح ویژه خاک و بهبود فعالیت میکروبی خاک، می‌تواند خاکدانه‌سازی را در خاک تحت تأثیر قرار داده و ساختمان خاک را بهبود بخشد (Domene et al., 2009). بیوپچار به دلیل ساختار متخلخل و سطح ویژه زیاد دارای جرم مخصوص کم بوده و اختلاط آن‌ها با خاک سبب کاهش جرم مخصوص خاک می‌شود (Sohi et al., 2010). مطابق جدول ۳ مقدار بیوپچار بر جرم مخصوص ظاهری و حقیقی تأثیر معنی‌دار داشت. با افزایش مقدار بیوپچار مصرفی، جرم مخصوص ظاهری و حقیقی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. بیشترین مقادیر جرم مخصوص ظاهری و حقیقی به ترتیب ۱/۷۸ و ۲/۷۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب از تیمار شاهد (بدون مصرف بیوپچار) و کمترین مقادیر آن به ترتیب ۱/۳۹ و ۲/۱۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب از تیمار ۴ درصد جرمی مصرف بیوپچار به دست آمد. کاهش جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک در حضور بیوپچار به دو دلیل می‌تواند رخ دهد، یکی به دلیل مخلوط شدن خاک با ماده‌ای با چگالی ظاهری کمتر و دیگری ناشی از تأثیر افزایش ماده آلی خاک در اثر کاربرد بیوپچار است. ماده آلی سبب بهبود ساختمان خاک، شکل‌گیری خاکدانه‌ها و پایداری آن‌ها می‌شود و از این طریق چگالی ظاهری خاک کاهش می‌یابد (Abel et al., 2013). دوروکس و همکاران (Devereux et al., 2013) نیز براساس نتایج پژوهش خود بیان کردند که افزایش منافذ خاک در اثر مواد آلی موجود در بیوپچار، سبب کاهش چگالی ظاهری خاک می‌شود. اختلاف معنی‌دار کاهش چگالی ظاهری با مصرف بیوپچار در پژوهش‌های زیادی مشاهده شده است (Hardie et al., 2013; Kumar et al., 2014). ابل و همکاران (Abel et al., 2013) در

پژوهش خود بیان کردند مصرف بیوپچار ذرت باعث کاهش ۸۴ درصدی چگالی ظاهری خاک شد. قربانی و امیراحمدی (Ghorbani and Amir Ahmadi, 2017) در پژوهشی نشان دادند مقدار جرم مخصوص ظاهری در تیمارهای حاوی بیوپچار شلتوک برنج ۰.۴٪ کمتر از تیمار شاهد بود. ایشان بیان کردند بیوپچار جرم مخصوص کمتری نسبت به مواد معدنی خاک دارد و در اثر اختلاط با خاک سبب کاهش تراکم خاک در واحد حجم می شود. بیوپچار با تغییر در تراکم دانه های خاک، جرم مخصوص ظاهری خاک را کاهش می دهد (Lim et al., 2016). بوشر و همکاران (Busscher et al., 2011) بیان کردند افزایش کربن آلی خاک با افزودن اصلاح کننده های آلی مانند بیوپچار سبب کاهش چگالی ظاهری خاک می شود و دلیل آن را تغییر اندازه خاکدانه عنوان کردند. ایشان معتقد بودند افزودن بیوپچار باعث هماوری خاکدانه های میکرو شده و در نتیجه وزن مخصوص ظاهری کاهش می یابد. مطابق جدول ۳ مقدار آب آبیاری تأثیر معنی داری بر جرم مخصوص ظاهری و حقیقی نداشت. علی رغم این جرم مخصوص ظاهری و حقیقی در تیمار ۱۰۰ درصد مقدار آب آبیاری بیشتر از دیگر تیمارهای آبیاری بود. شوری آب آبیاری سبب کاهش جرم مخصوص ظاهری و حقیقی شد (جدول ۳). تیمار ۷ دسی زیمنس بر متر شوری آب آبیاری سبب افزایش ۱۸/۶۵ و ۱۷/۵۷ درصدی جرم خصوص حقیقی و ظاهری نسبت به تیمار ۱ دسی زیمنس بر متر شد. دلیل افزایش جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک با افزایش شوری را می توان افزایش وزن واحد حجم خاک در اثر افزایش و تجمع نمک در خاک در شرایط استفاده از آب شور دانست. اثرات متقابل بیوپچار و شوری آب آبیاری (جدول ۵) نشان داد با افزایش بیوپچار و کاهش شوری آب آبیاری جرم مخصوص ظاهری و حقیقی کاهش یافت. بیشترین جرم مخصوص ظاهری و حقیقی از تیمار B1S3 و کمترین آن از تیمار B3S1 به دست آمد. اختلاط بیوپچار با خاک در شرایط استفاده از آب شور، سبب شور شدن بیشتر خاک و تجمع نمک در خاک شده و جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک افزایش می یابد. اثر متقابل آب آبیاری و شوری (جدول ۶) نشان داد در هر کدام از تیمارهای آب آبیاری افزایش شوری آب آبیاری سبب افزایش جرم مخصوص ظاهری و حقیقی شد. با کاهش عمق آب آبیاری و افزایش شوری آب، شدت تنش وارده به خاک بیشتر و پراکندگی ذرات بیشتر شد، بنابراین جرم مخصوص ظاهری و حقیقی افزایش یافت.

جدول ۳- نتایج مقایسه میانگین ویژگی های اندازه گیری شده خاک

Table ۳- The results of comparing the average of the measured characteristics of the soil

تیمارهای آزمایشی Experimental treatments	جرم مخصوص ظاهری Bulk density (gr/cm ³)	جرم مخصوص حقیقی Actual density (gr/cm ³)	اسیدیته pH	قابلیت هدایت الکتریکی EC (dS/m)	نیتروژن Nitrogen (%)	پتاسیم (K) potassium (mg/kg)	فسفر (P) Phosphorus (mg/kg)	عملکرد Yield (kg/ha)	
بیوچار (%)	0	1.78a	2.75a	8.13b	8.96c	0.12b	112.63b	15.47b	967.86b
	2	1.58b	2.38b	9.21a	10.16b	0.21a	190.26a	23.95a	1386.45a
	4	1.39c	2.15c	9.26a	21.13a	0.23a	200.48a	24.84a	985.27b
مقدار آب آبیاری (درصد)	60	1.42a	2.33a	8.25a	19.52b	0.26a	175.34a	24.86a	959.76b
	80	1.47a	2.33a	8.17a	14.47a	0.24a	168.55a	23.51a	1189.46ab
	100	1.48a	2.36a	7.29ab	12.82a	0.16b	144.78b	20.97b	1350.12a
شوری آب آبیاری (دسی زیمنس بر متر)	1	1.36bc	2.05bc	7.28ab	10.33c	0.17b	123.37c	17.11c	1219.75a
	4	1.47b	2.23b	8.45a	13.38b	0.21a	163.36b	22.01b	1047.33ab
	7	1.65a	2.52a	8.86a	19.68a	0.23a	201.18a	24.84a	758.63c

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دار ندارند.

In each column averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% probability level.

جدول ۴- مقایسه میانگین اثرات متقابل بیوچار و مقدار آب آبیاری (B*I) بر ویژگی‌های اندازه‌گیری شده

Table 4- Comparison of the average interaction effects of biochar and the amount of irrigation water (B*I) on the measured characteristics

تیمار Treatment	اسیدیته pH	هدایت الکتریکی EC (dS/m)	نیتروژن Nitrogen (%)	پتاسیم potassium (mg/kg)	فسفر Phosphorus (mg/kg)	عملکرد Yield (kg/ha)
B1I1	8.12b	12.53d	0.16c	140.82d	18.34d	621.57d
B2I1	9.18a	16.96b	0.22a	208.56a	23.95a	697.41dc
B3I1	9.36a	21.25a	0.24a	218.13a	24.45a	540.12e
B1I2	8.23b	9.87e	0.17c	136.25d	18.29d	721.82c
B2I2	8.75a	13.14d	0.2ab	193.46b	22.91b	1186.61a
B3I2	8.85a	15.63b	0.21a	200.08ab	23.51ab	784.53c
B1I3	7.68c	8.56ef	0.15cd	128.91e	17.55de	986.27c
B2I3	7.86bc	10.58e	0.19b	159.57c	20.97c	1371.29a
B3I3	8.41ab	14.78c	0.19b	164.32c	21.71c	1002.47b

در جدول I1، I2 و I3 تیمارهای مقدار آب آبیاری برابر ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه، B1، B2 و B3 تیمارهای مقدار بیوچار برابر ۲، ۴ و ۸ درصد وزنی می‌باشد.

In Table I1, I2, and I3, the amount of irrigation water treatments are equal to 60, 80, and 100% of water requirement, B1, B2, and B3, the amount of biochar treatments are equal to 0, 2, and 4% by weight.

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دار ندارند.

In each column averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% probability level.

جدول ۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل بیوچار و شوری آب آبیاری (B*S) بر ویژگی‌های اندازه‌گیری شده

Table ۵- Comparison of the average interaction effects of biochar and irrigation water salinity (B*S) on the measured characteristics

تیمار	جرم مخصوص ظاهری	جرم مخصوص حقیقی	اسیدیته pH	هدایت الکتریکی EC (dS/m)	نیتروژن Nitrogen (%)	پتاسیم potassium (mg/kg)	فسفر Phosphorus (mg/kg)	عملکرد Yield (kg/ha)
Treatment	Bulk density (gr/cm ³)	actual density (gr/cm ³)						
B1S1	1.14dc	2.06d	8.11b	8.46e	0.11e	119.63e	16.66f	1057.24b
B2S1	1.13d	2.04d	8.13b	10.52d	0.14d	121.12e	17.75e	1302.53a
B3S1	1.13d	۲.02d	9.11a	11.72cd	0.14d	123.65e	18.11e	804.49c
B1S2	1.42b	2.45b	8.26b	10.63d	0.16c	167.16d	20.08d	817.36c
B2S2	1.19c	2.22c	9.25a	12.25c	0.19b	184.28b	22.61b	754.29d
B3S2	1.15c	2.12c	9.69a	14.85b	0.19b	187.37b	23.21b	624.05e
B1S3	1.66a	2.75a	8.57ab	12.56c	0.17c	176.13c	21.12c	696.85de
B2S3	1.22c	2.25c	9.61a	۱۸.23a	0.23a	211.26a	24.54a	604.28e
B3S3	1.16c	2.15c	9.94a	۲۰.65a	0.24a	216.54a	24.99a	547.81f

در جدول S1, S2, و S3 تیمارهای شوری آب آبیاری برابر ۱، ۴ و ۷ دسی‌زیمنس بر متر، B1, B2, و B3 تیمارهای مقدار بیوچار برابر ۰، ۲ و ۴ درصد وزنی می‌باشد.

In Table S1, S2, and S3, the irrigation water salinity treatments are equal to 1, 4, 7 dS/m, B1, B2, and B3, the amount of biochar treatments are equal to 0, 2, and 4% by weight.

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دار ندارند.

In each column averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% probability level.

جدول ۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل مقدار آب آبیاری و شوری آب آبیاری (I*S) بر ویژگی‌های اندازه‌گیری شده خاک

Table ۶- Comparison of the average interaction effects of irrigation water amount and irrigation water salinity (I*S) on measured soil properties

تیمار	جرم مخصوص ظاهری	جرم مخصوص حقیقی	اسیدیته pH	هدایت الکتریکی EC (dS/m)	نیتروژن Nitrogen (%)	پتاسیم potassium (mg/kg)	فسفر Phosphorus (mg/kg)	عملکرد Yield (kg/ha)
Treatment	Bulk density (gr/cm ³)	actual density (gr/cm ³)						
I1S1	1.44cd	1.19cd	6.23b	10.75c	0.18c	152.82d	20.23c	1085.25b
I2S1	1.38d	1.16d	6.14b	10.63c	0.17cd	143.63d	18.44d	1326.85a
I3S1	1.32d	1.13d	6.06b	9.56cd	0.16c	138.18d	17.92d	1334.57a
I1S2	1.62b	2.38b	7.31ab	15.74b	0.23ab	176.57b	23.21ab	1014.52bc
I2S2	1.56bc	2.33bc	7.22ab	14.36b	0.22b	169.42bc	22.01b	1027.39b
I3S2	1.51c	2.28c	6.45b	11.58c	0.19c	158.52c	20.52c	1258.69ab
I1S3	1.75a	2.48a	8.98a	20.14a	0.27a	202.21a	24.69a	724.56c
I2S3	1.71a	2.41a	8.26a	18.24a	0.25a	186.46a	23.65a	876.47c
I3S3	1.48c	2.24c	7.12ab	14.28b	0.19c	164.78c	20.97bc	915.68c

در جدول S1، S2 و S3 تیمارهای شوری آب آبیاری برابر ۱، ۴ و ۷ دسی‌زیمنس بر متر، I1، I2 و I3 تیمارهای مقدار آب آبیاری برابر ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد وزنی می‌باشد.

In Table S1, S2, and S3, the irrigation water salinity treatments are equal to 1, 4, 7 dS/m, I1, I2, and I3, the amount of irrigation water treatments are equal to 60, 80, and 100% of water requirement.

در هر ستون میانگین‌های دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دار ندارند.

In each column averages with the same letters do not have significant differences based on Duncan's test at the 5% probability level.

نتیجه‌گیری

این پژوهش با هدف بررسی اثرات بیوپار در شرایط تنش آبی و شوری آب آبیاری بر عملکرد کینوا و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد افزودن بیوپار به خاک سبب افزایش مقدار عملکرد گیاه کینوا، pH و EC خاک شد. جرم مخصوص حقیقی خاک با افزودن ۲ و ۴ درصد جرمی بیوپار به خاک به ترتیب ۱۳ و ۲۱ درصد و جرم مخصوص ظاهری به ترتیب ۱۱ و ۲۲ درصد کاهش یافت. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، کاربرد بیوپار به عنوان روشی مناسب برای بهبود کیفیت شیمیایی و حاصلخیزی خاک‌های فقیر و سبک توصیه می‌شود. با کاربرد بیوپار مقدار عناصر غذایی خاک (فسفر، نیتروژن و پتاسیم) افزایش یافت. این افزایش نشان‌دهنده پتانسیل این اصلاح‌کننده در برطرف نمودن کمبود این عناصر در شرایط خشکی در خاک می‌باشد. با توجه به این‌که ماندگاری بیوپار در خاک به مراتب بیشتر از ماده اولیه آن گزارش شده است، می‌توان از بیوپار به عنوان پتانسیلی برای ارتقاء پایدار سطح حاصل‌خیزی خاک، کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی و کاهش خطرات زیست محیطی آن‌ها استفاده کرد. با توجه به اثرات متفاوتی که

بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و زیستی خاک در مناطق مختلف دارد، پیشنهاد می‌شود تأثیر آن بر ویژگی‌های خاک‌های مختلف با بیوچارهای متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به این که افزودن این ماده آلی به خاک در سطوح زیاد سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک می‌شود لذا استفاده از مقادیر زیاد بیوچار در خاک باید با احتیاط انجام شود.

سپاسگزاری

این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه زابل انجام شده است. کد پژوهانه IR-UOZ-GR-1837

منابع

1. Abel S., Peters A., Trinks S., Schonsky H., Facklam, M., and Wessolek, G. 2013. Impact of biochar and hydrochar addition on water retention and water repellency of sandy soil. *Geoderma*, 202–203:183–191.
2. Abrishamkesh, S., Gorji, M., Asadi, H., Bagheri-Marandi, G., and Pourbabae, A. 2015. Effects of rice husk biochar application on the properties of alkaline soil and lentil growth. *Plant Soil and Environment* 61: 475-482.
3. Agegnehu, G., Bass, A.M., Nelson, P.N., and Bird, M.I. 2016. Benefits of biochar, compost and biochar–compost for soil quality: maize yield and greenhouse gas emissions in a tropical agricultural soil. *Science of the Total Environment*. 543: 295-306.
4. Akhtar, S.S., Andersen, M.N., and Liu, F. 2015. Biochar mitigates salinity stress in potato. *Journal of Agronomy and Crop Science*. 5: 368- 378.
5. Algosaibi, A. M., El-Garawany, M. M., Badran, A. E. and Almadini, A. M. 2015. Effect of irrigation water salinity on the growth of Quinoa plant seedlings. *Journal of Agricultural Science*, 7(8): 205.
6. Bhupindar, S.S. 2014. Nanotechnology in agri- food production: an overview. *Nanotechnology science and applications*. India. www.Dovepress. 7:31-53.
7. Blanco-Canqui, H. 2017. Biochar and soil physical properties. *Soil Science Society of America Journal*. 81(4), 687-711.
8. Bremner, J. M. 1996. Nitrogen total. In: *Methods of Soil Analysis*. D. L. Sparks et al. (eds) part III, 3rd ed. Am. Soc. Agron. Inc., Madison, WI. Pp. 1085-1122.
9. Brodowski, S., W. Amelung., L. Haumaier., and Zech, W. 2007. Black carbon contribution to stable humus in German arable soils. *Geoderma*. 139:220–228.
10. Busscher, W., Novak, J.M., and Ahmedna, M. 2011. Physical effects of organic matter amendment of a southeastern US coastal loamy sand. *Soil Science Society of American journal*, 176: 661-667.
11. Cheng, C.H., J. Lehmann., J.E. Thies., and Burton, S.D. 2008. Stability of black carbon in soils across a climatic gradient. *Journal of Geophysical Research Biogeosciences*.113:10.

12. Chintala, R., Mollinedo, J., Schumacher, T. E., Papiernik, S. K., Malo, D. D., Clay, D. E., Kumar, S. and Gulbrandson, D. W. 2013. Nitrate sorption and desorption in biochars from fast pyrolysis. *Microporous and Mesoporous Materials*, 179: 250 -257.
13. Chintala, R., Mollinedo, J., Schumacher, T.E., Malo, D.D., and Julson, J.L. 2014. Effect of biochar on chemical properties of acidic soil. *Archives of Agronomy and Soil Science*. 60: 393-404.
14. Dabhi, R., Bhatt, N., and Pandit, B. 2013. Super absorbent polymers an innovative water saving technique for optimizing crop yield. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*. 10: 5333-5340.
15. Deoband Hafeshjani, L., Naseri, A., Houshmand, A., Abbasi, F., and Soltani Mohammadi, A. ۲۰۱۶. Investigating the effect of sugarcane bagasse biochar on the chemical properties of a sandy loam soil. *Journal of Irrigation Science and Engineering*, ۴: ۷۲-۷۳
16. Devereux, R. C., Sturrock, C. J. and Mooney, S. J. 2013. The Effects of Biochar on Soil Physical Properties and Winter Wheat Growth. *Journal of Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, 103(1): 13-18.
17. Domene, X., Mattana, S., Hanley, K., Enders, A. and Lehmann, J. 2014. Medium -term effects of corn biochar addition on soil biota activities and functions in a temperate soil cropped to corn. *Soil Biology and Biochemistry*, 72: 152 -162.
18. Downie, A., A. Crosky., and Munroe, P. 2009. Physical properties of biochar. pp. 13- 32. In Lehmann J. and S. Joseph (Eds). *Biochar for Environmental Management: Science and Technology*. Earthscan: London, UK.
19. Elewa, T. A., Sadak, M. S. and Saad, A. M. 2017. Proline treatment improves physiological responses in quinoa plants under drought stress. *Bioscience Research*. 14(1): 21-33.
20. Fathi Gerdelidani, A. and Mirseyed, H. 2015. Different aspects of biocurrent effects in improving soil quality. *International Conference on Applied Research in Agriculture*, Tehran, 22 May: 1-12.
21. Forohar, M., Khorasani, R., Fatut, M., Shariat-Madari, H., Khavazi, K. ۲۰۱۷. The effect of different biochars and their raw materials on some soil chemical properties and nutrients over time in a calcareous soil. *Water and Soil Journal*, ۳۲(۲): ۳۱۲-۲۹۹.
22. Ghorbani, M., and Amir Ahmadi, A. ۲۰۱۷. The effect of rice husk biochar on some soil physical properties and corn growth in a loamy soil. *Journal of Soil Research*, ۳۲(۳): -۳۱۹
۳۰۶
23. Gopal, M., Gupta, A., Hameed, K.S., Sathyaseelan, N., Rajeela, T.K., and Thomas, G.V. 2020. Biochars produced from coconut palm biomass residues can aid regenerative agriculture by improving soil properties and plant yield in humid tropics. *Biochar*. 2: 211-226.
24. Guvili, A., Mousavi, A. A., and Kamkar Haghighi, A. 2016. Effect of cattle manure biochar and moisture stress on growth characteristics and spinach water use efficiency in greenhouse conditions. *Water research in agriculture*, 30(2), 259-243.
25. Hardie, M., Clothier, B., Bound, S., Oliver, G., and Close, D. 2014. Does biochar influence soil physical properties and soil water availability? *Plant Soil*, 376: 347–361.

26. Hasanpour, E., Shirvani, M., Haj Abbasi, M.A., and Majidi, M.M. 2022. Acidic biochars on some chemical characteristics and ability to absorb nutrients of calcareous soils. *Journal of Water and Soil Sciences*, ۲۶(۲): ۳۹-۵۹
27. HE, L. L., Zhong, Z. K. and Yang, H. M. 2017. Effects on soil quality of biochar and straw amendment in conjunction with chemical fertilizers. *Journal of Integrative Agriculture*, 16(3), 704-712.
28. Hirich, A., Choukr, R., and Jacobsen, S. 2013. The combined effect of deficit irrigation by treated wastewater and organic amendment on quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) productivity. *Journal Desalination and Water Treatment*. 25: 2208-2213.
29. Hosseini, M., Movahedi Naeini, S.A., and Bameri, A. 2015. The effect of different tillage methods on the amount of available potassium in soils with different extractants in a soil with high specific surface area. *Water and Soil*. 4: 966-979.
30. Ibrahim, O. M., Bakry, A. B., El Kramany, M. F. and Elewa, T. A. 2015. Evaluating the role of biochar application under two levels of water requirements on wheat production under sandy soil conditions. *Global Journal of Advanced Research*, 2(2): 411- 418.
31. Kang, J., Hesterberg, D., and Osmond, D.L. 2008. Soil organic matter effects on phosphorus sorption: A path analysis. *Soil Science Society of America Journal*. 73: 360-366
32. Karmaka, S., Lague, C., Agnew, J., and Landry, H. 2007. Integrated decision support system (DSS) for manure management. *Computers and Electronics*. 57: 190-201.
33. Knowles, O., Robinson, B., Contangelo, A. and Clucas, L. 2011. Biochar for the mitigation of nitrate leaching from soil amended with biosolids. *Science of the Total Environment*, 409: 3206 -3210.
34. Kumar, S., Masto, RE., Ram, LC., Sarkar, P., George, J., and Selvi, VA. 2013. Biochar preparation from *Parthenium hysterophorus* and its potential use in soil application. *Ecological Engineering*, 55: 67-72.
35. Laird, D.A., Fleming, P.D., Karlen, D.L., Wang, B. and Horton, R. 2010. Biochar impact on nutrient leaching from a Midwestern agricultural soil. *Geoderma* 158:436-442.
36. Lehmann, J. and Joseph, S. 2009. Biochar for environmental management- an introduction. In: Lehmann J. and Joseph S. (Eds). *Biochar for environmental management: Science and Technology*. Earthscan, London, pp. 1-11.
37. Liang, B., Lehmann, J., Solomon, D., Kinyangi, J., Grossman, J., O'Neill, B., Skjemstad, J.O., Theis, J., Luizao, F.J., Peterson, J., and Neves, E.G. 2006. Black carbon increases cation exchange capacity in soils. *Soil Science Society of America Journal* 70:1719-1730.
38. Lim, T., Spokas, K., Feyereisen, G., and Novak, J. 2016. Predicting the impact of biochar additions on soil hydraulic properties. *Chemosphere*, 142: 136-144.
39. Luo, C., Deng, Y., Inubushi, K., Liang, J., Zhu, S., Wei, Z., Guo, X. and Luo, X., 2018. Sludge Biochar Amendment and Alfalfa Revegetation Improve Soil Physicochemical Properties and Increase Diversity of Soil Microbes in Soils from a Rare Earth Element Mining Wasteland. *International journal of environmental research and public health*, 15(5).
40. Mahmoodabadi, M. ۲۰۱۸. Investigating the effect of sequential application of organic matter and irrigation with sodium water on the size distribution of secondary soil particles. *Environmental Erosion Research*, ۴-۱۵:۲

41. Major, J., Rondon, M., Molina, D., Riha, S.J., and Lehmann, J. 2010. Maize yield and nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol. *Plant and Soil* 333:117–128.
42. Mensah, A.K., and Frimpong, K.A. 2018. Biochar and/or compost applications improve soil properties, growth, and yield of maize grown in acidic rainforest and coastal savannah soils in Ghana. *International Journal of Agronomy*. 7: 1-8.
43. Mir, A., Piri, H., Naserin, A. 2021. The effects of different levels of wheat biochar and water stress on the quantitative and qualitative characteristics of Carla (bitter melon) in pots, *Water Research in Agriculture*, ۳۵(۲):.۱۷۰-۱۸۵
44. Mokami, A., Yazdan-Panah, N. and Saidenjad, A.H. 2022. The effect of using vermicompost and biochar on the morpho-physiological characteristics of quinoa under drought stress conditions. *Iran Water and Soil Research*, ۵۳(۱):.۱۳۰-۱۴۰.
45. Mukherjee, A., and Zimmerman, A.R. 2013. Organic carbon and nutrient release from a range of laboratory produced biochars and biochar-soil mixtures. *Geoderma*. 194: 122-30.
46. Najafi Ghairi, M. ۲۰۱۴. The effect of using different biochars on some soil characteristics and the ability to absorb some nutrients in a calcareous soil. *Journal of Soil Research*, ۲۹(۳): ۳۵۱-۳۵۸
47. Najafi-Ghiri, M., Abtahi, A., Owliaie, H.R., Hashemi, S.S., and Koohkan, H. 2011. Factors affecting potassium pools distribution in highly calcareous soils of southern Iran. *Arid land Research and Management*. 25: 313-327.
48. Najafiqiri, M., Bostani, H., and Mahmoudi, A. ۲۰۱۷. The effect of the remains of three plant species and their biochar on some characteristics and potassium status of a calcareous soil. *Soil and Water Science Research Journal*, ۳۲(۱):.۳۶-۲۵.
49. Negaresh, H., and Latifi, L. ۲۰۱۸. The origin of wind deposits in the east of Zabol through morphoscopy and physical and chemical analysis of sediments. *Geography and Environmental Planning*, ۲۰(1): 1-22.
50. Nelissen, V., Rütting, T., Huygens, D., Staelens, J., Ruyschaert, G., and Boeckx, P. 2012. Maize biochars accelerate short-term soil nitrogen dynamics in a loamy sand soil. *Soil Biology and Biochemistry*, 55: 20-27.
51. Netondo, G.F., Onyango, J.C. and Beck. E. 2004. Sorghum and salinity: II. Gasexchange and chlorophyll fluorescence of sorghum under salt stress. *Crop Science*.44: 806–811.
52. Olsen, S.R., and Sommers, L.E. 1990. Phosphorus. P 403-431. In: A.L. Page (ed), *Method of soil analysis*. Part 2. 2nd agron Monoger., ASA, Madison, WI.
53. Page, A.L., Miller, R.H. and Keeney, D.R. 1982. *Methods of Soil Analysis*. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy. In *Soil Science Society of America*, 1159.
54. Piri, H., Naserin, A. and Albalasmeh, A. 2022. Interactive effects of deficit irrigation and vermicompost on yield, quality, and irrigation water use efficiency of greenhouse cucumber. *Journal of Arid Land*, 14(11):1274-1292.
55. Rahimi-Alashti, S., Bahmanyar, M.A., Qajarspanlou, M., Sadegh-Zadeh, F., and Khodsi-Bidgoli, A. 2021. The effect of the use of some organic and inorganic amendments on the

amount of high-use and low-use elements of the soil under quinoa cultivation under water stress conditions. *Soil Management and Sustainable Production*, 11(2): 25-48

56. Rajabi, H., 2014. Effect of pistachio residue, sewage black mud, and chemical fertilizer on bio- provision and nitrogen and phosphorus absorption by spinach. Master Thesis. Shiraz University.
57. Rezaei, N., Rezaghi, F., Sepaskhah, A., and Mousavi, A. 2017. The effect of biochar and irrigation water salinity on chemical properties of soil under bean cultivation. *Journal of Soil and Water Science Research*, 32(1): 28-33
58. Robbiani, Z. 2013. Hydrothermal carbonization of biowaste/fecal sludge. Lappeenranta University of Technology. 41: 1-71.
59. Shirmardi, M., and Tofighi, H. Effect of Organic Matter on Phosphorus Stabilization Kinetics in Several Different Soils. *Iranian Soil and Water Research*. 46: 567-577.
60. Singh, B.P., Hatton, B.J., Singh, B., Cowie, A.L., and Kathuria, A. 2010. Influence of biochars on nitrous oxide emission and nitrogen leaching from two contrasting soils. *Journal of Environmental Quality*. 39(4):1224-1235.
61. Sohi, S., Krull, E., Lopez-Capel, E., and Bol, R. 2010. A review of biochar and its use and function in soil. *Advances in Agronomy* 105:47-82.
62. Sun, H., Shi, W., Zhou, M., Ma, X. and Zhang, H. 2019. Effect of biochar on nitrogen use efficiency, grain yield and amino acid content of wheat cultivated on saline soil. *Plant, Soil and Environment*, 65: 83-89.
63. Telahigue, D. C., Yahia, L. B., Aljane, F., Belhouchett, K. and Toumi, L. 2017. Grain yield, biomass productivity and water use efficiency in quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) under drought stress. *Journal of scientific agriculture*, 1:222-232.
64. Thaghafi, F., Qanei-Bafghi, M.J., and Shirmardi, M. 2021. The effect of palm tree waste biochar on element concentration, sodium absorption ratio and some physical properties of saline soil. *Desert Ecosystem Engineering*, 10(31): 85-98
65. Van Zwieten, L., Kimber, S., Morris, S., Chan, K., Downie, A., Rust, J., Joseph, S., and Cowie, A. 2010. Effects of biochar from slow pyrolysis of papermill waste on agronomic performance and soil fertility. *Plant and Soil*. 327: 235-246.
66. Walkey, A. and Black, I.A. 1934. An examination of the Degtjareeff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. *Soil science*, 37:29-38.
67. Wang, L., Xue, C., Nie, X., Liu, Y., and Chen, F. 2018. Effects of biochar application on soil potassium dynamics and crop uptake. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*. 181: 635-643
68. Waraich, E.A., Ahmad, R.M., Saifullah, Y., and Ashraf, E. 2011. Role of mineral nutrition in alleviation of drought stress in plants. *Australian Journal of Crop Science*. 6: 764-777.
69. Westerman, R.E.L. 1990. Soil testing and plant analysis. SSSA, Madison, Wisconsin, USA. 784p.
70. Yao, F.X., Arbestain, M.C., Virgel, S.F. Blanco, Arostegui, J.J., Macia-Agullo, A., and Macias, F. 2009. Simulated geochemical weathering of a mineral ash-rich biochar in a modified Soxhlet reactor. *Chemosphere*. 80:724-732
71. Yuan, J.H., Xu, R.K., Zhang, H., 2011. The forms of alkalis in the biochar produced from crop residues at different temperatures. *Bioresource Technology*. 102(3): 3488-3497.

72. Zahoor, R., Dong, H., Abid, M., Zhao, W., Wang, Y., and Zhou, Z. 2017. Potassium fertilizer improves drought stress alleviation potential in cotton by enhancing photosynthesis and carbohydrate metabolism. *Environmental and Experimental Botany*. 137: 73-83.
73. Zhang, M., Fan, C.H., Li, Q.L., Li, B., Zhu, Y.Y., and Xiong, Z.Q. 2015. A 2-yr field assessment of the effects of chemical and biological nitrification inhibitors on nitrous oxide emissions and nitrogen use efficiency in an intensively managed vegetable cropping system. *Agriculture, Ecosystems and Environment*. 201: 43-50
74. Zhang, M., Riaz, M., Liu, B., Xia, H., El-Desouki, Z., and Jiang, C. 2020. Two-year study of biochar: Achieving excellent capability of potassium supply via alter clay mineral composition and potassium-dissolving bacteria activity. *Science of the Total Environment*. 717: 1-12.
75. Zolfi Bavariani, M., Ronaghi, A., Karimian, N., Ghasemi, W., and Yatharbi, J. ۲۰۱۵. The effect of biochar prepared from chicken manure at different temperatures on the chemical characteristics of a calcareous soil. *Journal of Water and Soil Sciences*, ۲۰(۷۵):۷۳-۸۴